

1 기본 도형

1 점, 선, 면, 각

P. 8

필수 문제 1 (1) 교점: 4개, 교선: 6개
(2) 교점: 6개, 교선: 9개

1-1 (1) 13 (2) 20

P. 9

개념 확인 (1) \overline{PQ} (또는 \overline{QP}) (2) \overrightarrow{PQ}
(3) \overleftarrow{QP} (4) \overleftrightarrow{PQ} (또는 \overleftrightarrow{QP})

필수 문제 2 ③

2-1 (1) $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CA}$ (2) \overline{CA} (3) \overrightarrow{AC} (4) \overrightarrow{CB}

P. 10

개념 확인 (1) 4 cm (2) 6 cm

필수 문제 3 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 4 (3) 10, 5

3-1 ④

3-2 (1) 6 cm (2) 3 cm (3) 9 cm

P. 12

개념 확인 (1) $\angle BAC, \angle CAB, \angle DAC, \angle CAD$
(2) $\angle DCB, \angle BCD$

필수 문제 4 (1) $45^\circ, 60^\circ, 17^\circ$ (2) 90°
(3) $158^\circ, 120^\circ, 95^\circ$ (4) 180°

필수 문제 5 (1) 100° (2) 20°

5-1 (1) 35° (2) 30°

P. 13

개념 확인 (1) $\angle COD$ (2) $\angle AOB$
(3) $\angle AOE$ (4) $\angle AOC$

필수 문제 6 (1) $\angle x=60^\circ, \angle y=120^\circ$
(2) $\angle x=75^\circ, \angle y=40^\circ$

6-1 (1) 30 (2) 30

6-2 (1) 75 (2) 40

P. 14

개념 확인 (1) 5 cm (2) 90°

필수 문제 7 (1) \overline{AB} (2) 점 A (3) 4 cm

7-1 \neg, \perp

STEP 1 **쓱쓱 개념 익히기** **P. 11**

1 \perp, \parallel **2** ④ **3** 3개
4 3개, 6개, 3개 **5** 9 cm **6** 9 cm

STEP 1 **쓱쓱 개념 익히기** **P. 15**

1 $\angle x=40^\circ, \angle y=50^\circ$ **2** 30 **3** 70°
4 ④ **5** 90° **6** 45°

2 점, 직선, 평면의 위치 관계

P. 16

필수 문제 1 ㄴ, ㄷ

1-1 (1) 점 B, 점 C (2) \overline{AD} , \overline{CD}

필수 문제 2 (1) 점 A, 점 B, 점 E, 점 F
 (2) 면 ABCD, 면 BFGC, 면 CGHD

2-1 (1) 면 ABC, 면 ABD, 면 BCD
 (2) 면 ABD, 면 BCD
 (3) 점 D

P. 17

필수 문제 3 (1) \overline{AB} , \overline{CD} (2) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

3-1 ㄴ, ㄷ

3-2 (1) \overrightarrow{DE} (2) \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{CD} , \overrightarrow{EF} , \overrightarrow{FA}

P. 18

개념 확인 (1) 평행하다.
 (2) 한 점에서 만난다.
 (3) 꼬인 위치에 있다.

필수 문제 4 (1) \overline{AC} , \overline{AD} , \overline{BC} , \overline{BE}
 (2) \overline{DE}
 (3) \overline{CF} , \overline{DF} , \overline{EF}

4-1 ㄴ, ㄷ

4-2 2개

P. 19

필수 문제 5 (1) \overline{AE} , \overline{BF} , \overline{CG} , \overline{DH}
 (2) 면 ABCD, 면 ABFE
 (3) \overline{EF} , \overline{FG} , \overline{GH} , \overline{HE}

5-1 ㄱ, ㄷ

5-2 3cm

P. 20

필수 문제 6 (1) 면 ABFE, 면 BFGC, 면 CGHD,
 면 AEHD
 (2) 면 ABCD, 면 BFGC, 면 EFGH,
 면 AEHD
 (3) 면 ABCD

6-1 ㄱ, ㄴ, ㄷ

6-2 ①, ⑤

STEP

1 **쓱쓱 개념 익히기**

P. 21~22

1 ①, ③ **2** ⑤ **3** ㄱ, ㄷ **4** ②, ④
5 6
6 (1) \overline{CG} , \overline{DH} , \overline{EH} , \overline{FG} , \overline{GH} (2) \overline{AE} , \overline{BF}
7 $m \perp P$ **8** (1) \times (2) \times

3 동위각과 엇각

P. 24

필수 문제 1 (1) $\angle e$ (2) $\angle g$ (3) $\angle h$ (4) $\angle g$

1-1 (1) $\angle d$, 80° (2) $\angle f$, 100°

1-2 (1) $\angle f$, $\angle j$ (2) $\angle e$, $\angle i$

P. 25

개념 확인 (1) 100° (2) 100°

필수 문제 2 (1) $\angle x = 65^\circ$, $\angle y = 115^\circ$
 (2) $\angle x = 55^\circ$, $\angle y = 81^\circ$

2-1 (1) 30 (2) 60

필수 문제 3 (1) $\angle x = 30^\circ$, $\angle y = 60^\circ$ (2) $\angle x = 60^\circ$

3-1 (1) 35° (2) 65°

P. 26

개념 확인 (1) ○ (2) × (3) ○

필수 문제 4 \square, \square

4-1 ①, ⑤

4-2 $l // n, p // q$

2 작도와 합동

1 삼각형의 작도

P. 38

필수 문제 1 $\square \rightarrow \square \rightarrow \square$

1-1 ①

STEP 1 **쑥쑥 개념 익히기** **P. 27~28**

1 ⑤

2 (1) $\angle x = 85^\circ, \angle y = 130^\circ$ (2) $\angle x = 60^\circ, \angle y = 70^\circ$

3 40° **4** (1) 40° (2) 16°

5 (1) 100° (2) 120° **6** \square, \square

7 (1) $\angle ABC, \angle ACB$ (2) 80° **8** 110°

P. 39

필수 문제 2 $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square$

2-1 ①, ④

2-2 (1) $\square, \square, \square$
 (2) 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때, 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.

STEP 2 **탄탄 단원 다지기** **P. 29~31**

1 19 **2** ④ **3** ② **4** 2 cm **5** ③

6 60° **7** ④ **8** ③ **9** 0

10 $\square, \square, \square$ **11** ②, ④ **12** ② **13** 9

14 ④ **15** ④ **16** 면 A, 면 C, 면 E, 면 F

17 ②, ③ **18** ④ **19** 35°

STEP 1 **쑥쑥 개념 익히기** **P. 40**

1 ② **2** (가) \overline{AB} (나) \overline{BC} (다) 정삼각형

3 ②, ⑤ **4** ④

STEP 3 **쑥쑥 서술형 완성하기** **P. 32~33**

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 **유제 1** 24 cm
유제 2 70°

연습해 보자 **1** 4개, 10개, 6개 **2** 50°
3 (1) $\overline{BE}, \overline{CE}, \overline{EH}$
 (2) 면 AHJ, 면 BEC, 면 ABEH
4 132°

P. 41

개념 확인 (1) \overline{BC} (2) \overline{AC} (3) \overline{AB}
 (4) $\angle C$ (5) $\angle A$ (6) $\angle B$

필수 문제 3 ③

3-1 ④

생활 속 수학 **P. 34**

답 54

P. 42

필수 문제 4 $\text{㉔} \rightarrow \text{㉕} \rightarrow \text{㉖}$

4-1 ⑤

P. 43

필수 문제 5 ③, ④

5-1 ③

STEP

1 **쓱쓱** 개념 익히기

P. 44~45

- 1 ④ 2 ⑤ 3 ④, ⑤
 4 (가) $\angle B$ (나) c (다) a 5 \neg, \sqcup 6 ⑤
 7 ② 8 1개

2 삼각형의 합동

P. 46~47

개념 확인 (1) \overline{PQ} (2) \overline{QR} (3) \overline{RP}
(4) $\angle P$ (5) $\angle Q$ (6) $\angle R$

필수 문제 1 (1) 80° (2) 5 cm

1-1 \neg, \sqcup

필수 문제 2 $\triangle ABC \equiv \triangle DFE$, ASA 합동

2-1 ④

2-2 $\neg, \sqcup, \text{㉖}$

STEP

2 **탄탄** 단원 다지기

P. 49~51

- 1 눈금 없는 자: \neg, \sqcup , 컴퍼스: \neg, \sqcup
 2 $\text{㉔} \rightarrow \text{㉕} \rightarrow \text{㉖}$ 3 ⑤ 4 ④ 5 5개
 6 ⑤ 7 ④ 8 ④ 9 ③ 10 ③
 11 \neg, \sqcup 12 ③, ⑤ 13 ①, ⑤ 14 ② 15 ③
 16 \neg, \sqcup, \sqcup 17 (1) $\triangle BCE \equiv \triangle DCF$ (2) 20 cm

STEP

3 **쓱쓱** 서술형 완성하기

P. 52~53

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 유제 1 \overline{AC} 의 길이, $\angle B$ 의 크기, $\angle C$ 의 크기

유제 2 SAS 합동

- 연습해 보자 1 (1) $\text{㉕} \rightarrow \text{㉖} \rightarrow \text{㉗} \rightarrow \text{㉘} \rightarrow \text{㉙} \rightarrow \text{㉚}$
 (2) 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.
 2 2개
 3 $\triangle DCE$, SAS 합동
 4 500 m

문학 속 수학

P. 54

답 $\text{㉕} \rightarrow \text{㉖} \rightarrow \text{㉗} \rightarrow \text{㉘}$

STEP

1 **쓱쓱** 개념 익히기

P. 48

- 1 ① 2 ①, ⑤ 3 ②, ⑤
 4 (1) (가) \overline{CD} (나) \overline{AC} (다) SSS (2) 70°

3 다각형

1 다각형

P. 58

개념 확인 ②, ④

필수 문제 1 (1) 50° (2) 120°

1-1 (1) 55° (2) 80°

필수 문제 2 (1) 정육각형 (2) 정팔각형

P. 59

개념 확인

다각형				...	n 각형
꼭짓점의 개수	4개	5개	6개	...	n 개
한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수	1개	2개	3개	...	$(n-3)$ 개
대각선의 개수	2개	5개	9개	...	$\frac{n(n-3)}{2}$ 개

필수 문제 3 (1) 20개 (2) 27개 (3) 44개

3-1 (1) 십오각형 (2) 90개

3-2 54개

STEP

1 **씩씩 개념 익히기**

P. 60

1 135°

2 ④, ⑤

3 108

4 15개

5 ②

6 정십각형

2 삼각형의 내각과 외각

P. 61

필수 문제 1 (1) 35° (2) 100° (3) 30°

1-1 20

1-2 $\angle A=40^\circ, \angle B=60^\circ, \angle C=80^\circ$

P. 62

필수 문제 2 (1) 25° (2) 110°

2-1 (1) 45° (2) 40°

2-2 (1) 60 (2) 30

STEP

1 **씩씩 개념 익히기**

P. 63

1 (1) 40 (2) 60

2 (1) 100° (2) 35°

3 80°

4 (1) 50° (2) 75°

5 90°

3 다각형의 내각과 외각

P. 64

필수 문제 1 (1) 1080° (2) 1620° (3) 2340°

1-1 70°

필수 문제 2 칠각형

2-1 12개

P. 65

필수 문제 3 (1) 80° (2) 110°

3-1 (1) 100° (2) 70°

3-2 128°

P. 66

필수 문제 4 (1) $135^\circ, 45^\circ$ (2) $140^\circ, 40^\circ$ (3) $150^\circ, 30^\circ$

4-1 60°

4-2 (1) 정십팔각형 (2) 정십오각형

STEP

1

씩씩 개념 익히기

P. 67~68

1 1448 2 6개

3 (1) 80° (2) 90° (3) 40° 4 8

5 ⑤ 6 ②

7 $\angle x = 72^\circ, \angle y = 36^\circ$

8 (1) 120° (2) 정삼각형 9 정구각형

STEP

2

탄탄 단원 다지기

P. 69~71

1 ④ 2 ①, ④ 3 35개 4 (1) 7쌍 (2) 14쌍

5 ⑤ 6 80° 7 80° 8 ④

9 $\angle x = 65^\circ, \angle y = 110^\circ$ 10 ⑤ 11 ④

12 30° 13 55° 14 ① 15 36° 16 360°

17 ① 18 ③ 19 ④ 20 (1) 36° (2) 36°

STEP

3

씩씩 서술형 완성하기

P. 72~73

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 유제 1 50° 유제 2 3240°

연습해 보자 1 22° 2 75°

3 160° 4 105°

건축 속 수학

P. 74


답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 원과 부채꼴

1 원과 부채꼴

P. 78

필수 문제 1



1-1 ㄱ, ㄷ

1-2 180°

P. 79

필수 문제 2 (1) 16 (2) 100

2-1 (1) 9 (2) 50

2-2 150°

P. 80

개념 확인 반지름, $\angle COD$, \cong , SAS, \overline{CD}

필수 문제 3 (1) 8 (2) 35

3-1 90°

3-2 ㄱ, ㄴ, ㄷ

STEP

1

씩씩 개념 익히기

P. 81~82

1 ④ 2 10 cm 3 40 4 9cm^2

5 80° 6 30 cm 7 ②, ④ 8 36°

9 ④

2 부채꼴의 호의 길이와 넓이

P. 83

필수 문제 1 (1) 8π cm, 16π cm² (2) 14π cm, 21π cm²

1-1 (1) $(5\pi + 10)$ cm, $\frac{25}{2}\pi$ cm²
 (2) 18π cm, 27π cm²

P. 84

개념 확인 (1) 4, 45 , π (2) 4, 45 , 2π

필수 문제 2 (1) 5π cm, 15π cm² (2) 12π cm, 54π cm²

2-1 2π cm, 12π cm²

2-2 (1) $(4\pi + 8)$ cm, 8π cm²
 (2) $(3\pi + 12)$ cm, $(36 - 9\pi)$ cm²

P. 85

개념 확인 2π , 6π

필수 문제 3 (1) 10π cm² (2) 40π cm²

3-1 (1) 6π cm² (2) 120π cm²

3-2 5π cm

STEP

1 **쓱쓱 개념 익히기**

P. 87~88

1 (1) 7 cm (2) 9π cm²

2 (1) 24π cm, 18π cm² (2) $(4\pi + 8)$ cm, $(16 - 4\pi)$ cm²

3 $\frac{10}{3}\pi$ cm, $\frac{25}{3}\pi$ cm² **4** ③ **5** 30π cm²

6 (1) 12 cm (2) 225°

7 (1) $\frac{160}{3}\pi$ cm² (2) $(\pi - 2)$ cm²

8 6π cm, $(18\pi - 36)$ cm²

9 32π cm² **10** 450 cm²

STEP

2 **탄탄 단원 다지기**

P. 89~91

1 ③, ⑤ **2** 60° **3** 27 cm **4** ③ **5** ④

6 30 **7** 48π cm² **8** ⑤ **9** ①, ③

10 12 π cm, 12π cm² **11** ④ **12** ⑤

13 ④ **14** ② **15** $(200\pi - 400)$ cm²

16 $(36 - 6\pi)$ cm² **17** 9 π cm, $(9\pi - 18)$ cm²

18 18π cm² **19** ①

STEP

3 **쓱쓱 서술형 완성하기**

P. 92~93

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 **유제 1** 160° **유제 2** $(6\pi + 16)$ cm

연습해 보자 **1** 28 cm **2** $\frac{27}{2}\pi$ cm²

3 6 cm² **4** 113π m²

스포츠 속 수학

P. 94

답 540π m²

5 다면체와 회전체

1 다면체

P. 98

필수 문제 1 ㄱ, ㄷ, ㄹ

1-1 ④

1-2 칠면체

P. 99

개념 확인

겨냥도			
이름	오각기둥	오각뿔	오각뿔대
옆면의 모양	직사각형	삼각형	사다리꼴
꼭짓점의 개수	10개	6개	10개
모서리의 개수	15개	10개	15개
면의 개수	7개	6개	7개

필수 문제 2 ④

2-1 ③

STEP

1 쓱쓱 개념 익히기

P. 100

1 5개

2 ①, ③

3 ⑤

4 (1) 각뿔대 (2) 육각뿔대

5 ②

2 정다면체

P. 101


필수 문제 1 (1) ㄱ, ㄷ, ㄹ (2) ㄹ
(3) ㄱ, ㄴ, ㄹ (4) ㄷ

1-1 정팔면체

1-2 30

P. 102

개념 확인



(1) 정육면체 (2) M, \overline{ED}

필수 문제 2 (1) 정팔면체 (2) 점 I (3) \overline{GF}
(4) \overline{ED} (또는 \overline{EF})

2-1 (1) 정사면체 (2) \overline{CF}

STEP

1 쓱쓱 개념 익히기

P. 104

1 ③

2 ③, ⑤

3 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 모두 같지 않다.


4 ④

3 회전체

P. 105

필수 문제 1 ㄱ, ㄷ, ㄹ

1-1 ㄴ, ㄹ, ①



P. 106

개념 확인 (1) × (2) ○ (3) ×

필수 문제 2 ③

2-1 원기둥

2-2 ④

P. 107

개념 확인 (1) $a=9, b=4$ (2) $a=5, b=3$

필수 문제 3 $a=6, b=11, c=18\pi$

3-1 10π cm

STEP

1 **쑥쑥 개념 익히기**

P. 108

- 1** ③, ④ **2** ③ **3** ③ **4** 32 cm^2
5 12 cm

STEP

2 **탄탄 단원 다지기**

P. 109~111

- 1** ③ **2** 10 **3** ③ **4** ④ **5** 십각뿔
6 ②, ④ **7** 정이십면체 **8** ②, ④ **9** ④
10 ③ **11** ③ **12** ② **13** ④ **14** ⑤
15 $16\pi\text{ cm}^2$ **16** ③ **17** $\frac{8}{3}\text{ cm}$ **18** ①, ③

STEP


3 **쑥쑥 서술형 완성하기**

P. 112~113

〈과정은 풀이 참조〉

따라 해보자 **유제 1** 50 **유제 2** $\frac{16}{9}\pi\text{ cm}^2$

연습해 보자 **1** 육면체 **2** 36
3 $21\pi\text{ cm}^2$



4 $(20\pi + 14)\text{ cm}$

역사 속 수학

P. 114

답 정육면체

6 **입체도형의 겉넓이와 부피**

1 **기둥의 겉넓이와 부피**

P. 118

개념 확인 (1) ㉠ 4 ㉡ 10 ㉢ 8π (2) $16\pi\text{ cm}^2$
(3) $80\pi\text{ cm}^2$ (4) $112\pi\text{ cm}^2$

필수 문제 1 (1) 78 cm^2 (2) $54\pi\text{ cm}^2$

1-1 (1) 360 cm^2 (2) 296 cm^2

P. 119

개념 확인 (1) $4\pi\text{ cm}^2$ (2) 4 cm (3) $16\pi\text{ cm}^3$

필수 문제 2 (1) 240 cm^3 (2) 336 cm^3 (3) $72\pi\text{ cm}^3$

2-1 $60\pi\text{ cm}^3$

STEP

1 **쑥쑥 개념 익히기**

P. 120

- 1** 184 cm^2 **2** 4 cm **3** $(56\pi + 80)\text{ cm}^2$
4 180 cm^3 **5** ③ **6** $(900 - 40\pi)\text{ cm}^3$

2 **뿔의 겉넓이와 부피**

P. 121~122

개념 확인 (1) ㉠ 9 ㉡ 3 ㉢ 6π (2) $9\pi\text{ cm}^2$
(3) $27\pi\text{ cm}^2$ (4) $36\pi\text{ cm}^2$

필수 문제 1 (1) 340 cm^2 (2) $224\pi\text{ cm}^2$

1-1 (1) 120 cm^2 (2) $216\pi\text{ cm}^2$

필수 문제 2 (1) $9\pi\text{ cm}^2$ (2) $36\pi\text{ cm}^2$
(3) $63\pi\text{ cm}^2$ (4) $108\pi\text{ cm}^2$

2-1 ④

P. 122~123

필수 문제 3 (1) 80 cm^3 (2) $8\pi\text{ cm}^3$

3-1 8

3-2 3 cm

필수 문제 4 (1) 384 cm^3 (2) 48 cm^3 (3) 336 cm^3

4-1 $28\pi\text{ cm}^3$

STEP

1 **쓱쓱 개념 익히기**

P. 124

1 256 cm^2 **2** (1) $2\pi\text{ cm}$ (2) 1 cm (3) $4\pi\text{ cm}^2$

3 (1) 216 cm^3 (2) 36 cm^3 (3) 180 cm^3

4 $192\pi\text{ cm}^2, 228\pi\text{ cm}^3$ **5** ②

STEP

1 **쓱쓱 개념 익히기**

P. 127

1 6 cm **2** $57\pi\text{ cm}^2$ **3** $105\pi\text{ cm}^2$

4 $\frac{224}{3}\pi\text{ cm}^3$ **5** $72\pi\text{ cm}^3$

STEP

2 **탄탄 단원 다지기**

P. 129~131

1 ③ **2** $(64\pi + 120)\text{ cm}^2$ **3** $72\pi\text{ cm}^3$

4 264 cm^2 **5** ⑤ **6** $63\pi\text{ cm}^2$

7 302 cm^2 **8** ③ **9** 576 cm^3

10 ④ **11** $312\pi\text{ cm}^3$ **12** ③ **13** ④

14 ③ **15** $\frac{49}{2}\pi\text{ cm}^2$ **16** $162\pi\text{ cm}^3$

17 ④ **18** ③ **19** 2 : 3 **20** ⑤

STEP

3 **쓱쓱 서술형 완성하기**

P. 132~133

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 **유제 1** $168\pi\text{ cm}^3$ **유제 2** $96\pi\text{ cm}^2$

연습해 보자 **1** 224 cm^2 **2** 120°

3 $12\pi\text{ cm}^3$ **4** $550\pi\text{ cm}^3$

3 구의 겹넓이와 부피

P. 125

개념 확인 $2r, 4$

필수 문제 1 (1) $16\pi\text{ cm}^2$ (2) $75\pi\text{ cm}^2$

1-1 $64\pi\text{ cm}^2$

P. 126

개념 확인 (1) $54\pi\text{ cm}^3$ (2) $36\pi\text{ cm}^3$ (3) 3 : 2

필수 문제 2 (1) $\frac{32}{3}\pi\text{ cm}^3$ (2) $144\pi\text{ cm}^3$

2-1 $30\pi\text{ cm}^3$

생활 속 수학

P. 134

답 A 캔

7 자료의 정리와 해석

1 줄기와 잎 그림, 도수분포표

P. 138~139

개념 확인 (1) 4, 7 (2) 4

필수 문제 1

가방 무게
(115는 1.5 kg)

줄기	잎
1	5 8
2	4 6 7
3	2 3 4 4 6
4	0 9

(1) 4, 6, 7 (2) 3

1-1

1분당 맥박 수
(6|7은 67회)

줄기	잎
6	7 8 8 9 9 9
7	1 2 3 3 4 6 9 9
8	0 2 3 4
9	0 1

(1) 0, 2, 3, 4 (2) 9 (3) 91회, 67회

필수 문제 2 (1) 20명 (2) 166 cm (3) 4명

2-1 (1) 24명 (2) 31세 (3) 6명 (4) 25%

P. 140~141

개념 확인

책의 수(권)	학생 수(명)
5이상~10미만	/// 3
10 ~ 15	//// 5
15 ~ 20	///// 4
20 ~ 25	/// 3
합계	15

필수 문제 3

가슴둘레(cm)	학생 수(명)
60이상~65미만	2
65 ~ 70	6
70 ~ 75	8
75 ~ 80	4
합계	20

(1) 4개 (2) 5 cm (3) 6명

3-1 (1)

나이(세)	참가자 수(명)
10이상~20미만	3
20 ~ 30	5
30 ~ 40	7
40 ~ 50	3
합계	18

(2) 30세 이상 40세 미만 (3) 5명

필수 문제 4

(1) 9 (2) 10개
(3) 500 kcal 이상 600 kcal 미만

4-1 나, 르

STEP

1 쓱쓱 개념 익히기

P. 142

1 나, 모


2 (1) 25 (2) 30분 이상 60분 미만 (3) 40%

3 나, 르

2 히스토그램과 도수분포다각형

P. 143

개념 확인




필수 문제 1 (1) 2점 (2) 21명 (3) 74

1-1 (1) 5개 (2) 30명 (3) 120

P. 144

개념 확인



필수 문제 2 (1) 4개 이상 6개 미만 (2) 28%

2-1 (1) 12회 이상 15회 미만 (2) 120

STEP 1 | **쓱쓱 개념 익히기** P. 145~146

1 (1) 6개 (2) 8명 (3) 24% (4) 40m 이상 45m 미만
2 70 **3** (1) ③ (2) 30% (3) 300
4 ㄷ, ㄹ **5** (1) 7명 (2) 28%
6 12.5%

STEP 1 | **쓱쓱 개념 익히기** P. 150~151

1 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) ×
2 0.36 **3** 40명 **4** (1) 55% (2) 6개
5 (1) 50명 (2) $A=20, B=0.2, C=8, D=0.16, E=1$
6 (1) 32명 (2) 0.16
7 (1) 350명 (2) 0.4 (3) 140명
8 여학생 **9** ㄱ, ㄷ

3 상대도수와 그 그래프

P. 147

개념 확인 (차레로) 5, 0.25, 0.5, 0.1, 1

필수 문제 1 (1) $A=0.1, B=12, C=10, D=0.2, E=1$
 (2) 0.15

1-1 (1) $A=0.15, B=100, C=0.3, D=80, E=1$
 (2) 40%

STEP 2 | **탄탄 단원 다지기** P. 152~155

1 ④ **2** (1) 남학생 (2) 많은 편
3 (1) 90분 이상 110분 미만 (2) 30% **4** 4
5 9명 **6** ⑤ **7** (1) 25명 (2) 8명 **8** ㄴ, ㄷ
9 ③ **10** 0.225 **11** ⑤ **12** 6마리
13 (1) 40명 (2) 0.3 **14** ② **15** 15명
16 (1) B 제품 (2) 30세 이상 40세 미만 **17** 5:2
18 ㄴ, ㄷ

P. 148

개념 확인

필수 문제 2 (1) 12세 이상 16세 미만 (2) 16명

2-1 (1) 0.4 (2) 12편

STEP 3 | **쓱쓱 서술형 완성하기** P. 156~157

〈과정은 풀이 참조〉

따라 해보자 **유제 1** 12일 **유제 2** 10명

연습해 보자 **1** 22명, 47 kg **2** 8권
3 30%
4 (1) 볼링 동호회 (2) 볼링 동호회

P. 149

개념 확인 (1)

아은키(cm)	여학생		남학생	
	학생 수(명)	상대 도수	학생 수(명)	상대 도수
75 이상 ~ 80 미만	6	0.15	4	0.16
80 ~ 85	8	0.2	5	0.2
85 ~ 90	16	0.4	7	0.28
90 ~ 95	10	0.25	9	0.36
합계	40	1	25	1

(2) 여학생

필수 문제 3 (1) 12명 (2) A 중학교 (3) B 중학교

3-1 (1) 3개 (2) A 정류장

생활 속 수학 P. 158

답 60곳

1 점, 선, 면, 각

P. 8

- 필수 문제 1** (1) 교점: 4개, 교선: 6개
 (2) 교점: 6개, 교선: 9개

1-1 (1) 13 (2) 20

- (1) 교점의 개수는 5개이므로 $a=5$
 교선의 개수는 8개이므로 $b=8$
 $\therefore a+b=5+8=13$
 (2) 교점의 개수는 8개이므로 $a=8$
 교선의 개수는 12개이므로 $b=12$
 $\therefore a+b=8+12=20$

P. 9

- 개념 확인** (1) \overrightarrow{PQ} (또는 \overrightarrow{QP}) (2) \overrightarrow{PQ}
 (3) \overrightarrow{QP} (4) \overrightarrow{PQ} (또는 \overrightarrow{QP})

필수 문제 2 ③

- ③ \overrightarrow{BD} 와 \overrightarrow{DB} 는 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 다르므로 서로 다른 반직선이다.


2-1 (1) \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{AC} , \overrightarrow{CA} (2) \overrightarrow{CA} (3) \overrightarrow{AC} (4) \overrightarrow{CB}

P. 10

개념 확인 (1) 4 cm (2) 6 cm

- (1) (두 점 A, B 사이의 거리) $=\overline{AB}=4$ cm
 (2) (두 점 B, C 사이의 거리) $=\overline{BC}=6$ cm

필수 문제 3 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 4 (3) 10, 5



- (1) 점 B는 \overline{AC} 의 중점이므로 $\overline{AB}=\overline{BC}$
 $\therefore \overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{AC}$
 (2) 점 C는 \overline{AD} 의 중점이므로 $\overline{AC}=\overline{CD}$
 $\therefore \overline{AD}=2\overline{AC}=2 \times 2\overline{AB}=\boxed{4}\overline{AB}$
 (3) $\overline{AC}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2} \times 20=\boxed{10}$ (cm)
 $\overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2} \times 10=\boxed{5}$ (cm)


3-1 ④



- ① 점 M은 \overline{AB} 의 중점이므로 $\overline{AM}=\overline{MB}$
 $\therefore \overline{AB}=2\overline{AM}$
 ② $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}$ 이므로 $\overline{AD}=3\overline{AB}$
 ③ $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}$ 이므로 $\overline{BC}=\frac{1}{3}\overline{AD}$
 ④ $\overline{AC}=2\overline{AB}=2 \times 2\overline{AM}=4\overline{AM}$
 ⑤ $\overline{BD}=2\overline{CD}$, $\overline{AD}=3\overline{CD}$ 이므로
 $\overline{BD}=2\overline{CD}=2 \times \frac{1}{3}\overline{AD}=\frac{2}{3}\overline{AD}$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

3-2 (1) 6 cm (2) 3 cm (3) 9 cm



- (1) 점 M은 \overline{AB} 의 중점이므로
 $\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2} \times 12=6$ (cm)
 (2) $\overline{MB}=\overline{AM}=6$ cm이고 점 N은 \overline{MB} 의 중점이므로
 $\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{MB}=\frac{1}{2} \times 6=3$ (cm)
 (3) $\overline{AN}=\overline{AM}+\overline{MN}=6+3=9$ (cm)

STEP

1 쓱쓱 개념 익히기

P. 11

- | | | | | | |
|---|------------|---|------|---|------|
| 1 | ㄴ, ㄹ | 2 | ④ | 3 | 3개 |
| 4 | 3개, 6개, 3개 | 5 | 9 cm | 6 | 9 cm |

- 1 ㄴ. 교점은 선과 선 또는 선과 면이 만나는 경우에 생긴다.
 ㄹ. 직육면체에서 교선의 개수는 모서리의 개수와 같다.
- 2 점 A를 지나는 교선의 개수는 각각 다음과 같다.
 ① 3개 ② 3개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 3개
 따라서 나머지 넷과 다른 하나는 ④이다.
- 3 \overline{AB} 를 포함하는 반직선은 \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{BA} , \overrightarrow{DB} 의 3개이다.
- 4 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선은
 \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{CA} 의 3개이고,
 서로 다른 반직선은
 \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} , \overrightarrow{BA} , \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{CA} , \overrightarrow{CB} 의 6개이고,

서로 다른 선분은

\overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CA} 의 3개이다.

다른 풀이 반직선, 선분의 개수 구하기

세 점이 한 직선 위에 있지 않으므로
(반직선의 개수)=(직선의 개수) \times 2
 $=3\times 2=6$ (개)

(선분의 개수)=(직선의 개수)=3개

참고 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 두 점을 이어서 만들 수 있는 직선, 반직선, 선분 사이의 관계

\Rightarrow • (직선의 개수)=(선분의 개수)
• (반직선의 개수)=(직선의 개수) \times 2
 $\hookrightarrow \overline{AB} \neq \overline{BA}$ $\hookrightarrow \overline{AB} = \overline{BA}$


5 두 점 B, C가 각각 \overline{AC} , \overline{BD} 의

중점이므로

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$$

이때 $\overline{AB} = \frac{1}{2} \overline{AC} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ (cm)이므로

$$\overline{AD} = 3\overline{AB} = 3 \times 3 = 9$$
(cm)



6 두 점 M, N이 각각 \overline{AC} , \overline{CB} 의

중점이므로


$$\overline{MC} = \frac{1}{2} \overline{AC}, \quad \overline{CN} = \frac{1}{2} \overline{CB}$$

$$\therefore \overline{MN} = \overline{MC} + \overline{CN} = \frac{1}{2} \overline{AC} + \frac{1}{2} \overline{CB}$$

$$= \frac{1}{2} (\overline{AC} + \overline{CB})$$

$$= \frac{1}{2} \overline{AB}$$

$$= \frac{1}{2} \times 18 = 9$$
(cm)



P. 12

개념 확인 (1) $\angle BAC$, $\angle CAB$, $\angle DAC$, $\angle CAD$

(2) $\angle DCB$, $\angle BCD$

필수 문제 4 (1) 45° , 60° , 17° (2) 90°
(3) 158° , 120° , 95° (4) 180°

필수 문제 5 (1) 100° (2) 20°
(1) $\angle x + 80^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 100^\circ$
(2) $\angle x + 70^\circ = 90^\circ \quad \therefore \angle x = 20^\circ$


5-1 (1) 35° (2) 30°
(1) $55^\circ + 90^\circ + \angle x = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 35^\circ$
(2) $\angle x + 2\angle x = 90^\circ, 3\angle x = 90^\circ \quad \therefore \angle x = 30^\circ$

P. 13

개념 확인 (1) $\angle COD$ (2) $\angle AOB$
(3) $\angle AOE$ (4) $\angle AOC$

필수 문제 6 (1) $\angle x = 60^\circ, \angle y = 120^\circ$
(2) $\angle x = 75^\circ, \angle y = 40^\circ$
(1) $\angle x = 60^\circ$ (맞꼭지각)
 $\angle y + 60^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle y = 120^\circ$
(2) $\angle y = 40^\circ$ (맞꼭지각)
 $65^\circ + \angle y + \angle x = 180^\circ$ 에서
 $65^\circ + 40^\circ + \angle x = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 75^\circ$

6-1 (1) 30 (2) 30
(1) 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $x + 10 = 3x - 50$
 $2x = 60 \quad \therefore x = 30$
(2) 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $(3x - 10) + 70 + x = 180$
 $4x = 120$
 $\therefore x = 30$



6-2 (1) 75 (2) 40
(1) 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $x + 55 = 130 \quad \therefore x = 75$
(2) 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $(x + 5) + 90 = 3x + 15$
 $2x = 80 \quad \therefore x = 40$

P. 14

개념 확인 (1) 5 cm (2) 90°
(1) $\overline{AO} = \overline{BO}$ 이므로
 $\overline{AO} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 10 = 5$ (cm)
(2) $\overline{AB} \perp \overline{PO}$ 이므로 $\angle AOP = 90^\circ$


필수 문제 7 (1) \overline{AB} (2) 점 A (3) 4 cm
(3) (점 A와 \overline{BC} 사이의 거리) = $\overline{AB} = 4$ cm

7-1 ㄱ, ㄴ
ㄴ. 점 A와 \overline{BC} 사이의 거리는 \overline{AD} 의 길이와 같으므로 12 cm이다.
ㄷ. \overline{AB} 와 \overline{AC} 가 서로 수직이 아니므로 점 C와 \overline{AB} 사이의 거리는 \overline{AC} 의 길이인 13 cm보다 짧다.
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

- 1 $\angle x=40^\circ, \angle y=50^\circ$ 2 30 3 70°
 4 ④ 5 90° 6 45°

1 $50^\circ + \angle x = 90^\circ \quad \therefore \angle x = 40^\circ$
 $\angle x + \angle y = 90^\circ$ 에서
 $40^\circ + \angle y = 90^\circ \quad \therefore \angle y = 50^\circ$


2 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $(3x-10) + 2x + (x+10) = 180$
 $6x = 180 \quad \therefore x = 30$




3 $\angle a = \angle c$ (맞꼭지각)이므로
 $\angle a + \angle c = 2\angle a = 220^\circ \quad \therefore \angle a = 110^\circ$
 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ 에서
 $110^\circ + \angle b = 180^\circ \quad \therefore \angle b = 70^\circ$

4 ④ 점 B에서 \overleftrightarrow{PQ} 에 내린 수선의 발은 점 H이다.

5 $\angle AOB = \angle BOC = \angle x,$
 $\angle COD = \angle DOE = \angle y$ 라고 하면
 $2\angle x + 2\angle y = 180^\circ$ 이므로
 $\angle x + \angle y = 90^\circ$
 $\therefore \angle BOD = \angle x + \angle y = 90^\circ$



6 $\angle AOB = 3\angle BOC,$
 $\angle DOE = 3\angle COD$ 이므로
 $\angle BOC = \angle x, \angle COD = \angle y$ 라고 하면
 $\angle AOB = 3\angle x, \angle DOE = 3\angle y$
 즉, $3\angle x + \angle x + \angle y + 3\angle y = 180^\circ$ 이므로
 $4\angle x + 4\angle y = 180^\circ, \angle x + \angle y = 45^\circ$
 $\therefore \angle BOD = \angle x + \angle y = 45^\circ$



2 점, 직선, 평면의 위치 관계

필수 문제 1 ㄴ, ㄷ

- ㄱ. 점 A는 직선 l 위에 있지 않다.
 ㄷ. 직선 l 은 점 B를 지난다.
 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

1-1 (1) 점 B, 점 C (2) $\overline{AD}, \overline{CD}$

필수 문제 2 (1) 점 A, 점 B, 점 E, 점 F
 (2) 면 ABCD, 면 BFGC, 면 CGHD

2-1 (1) 면 ABC, 면 ABD, 면 BCD
 (2) 면 ABD, 면 BCD (3) 점 D


필수 문제 3 (1) $\overline{AB}, \overline{CD}$ (2) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$

3-1 ㄴ, ㄷ

- ㄱ. \overline{AB} 와 \overline{CD} 는 평행하지 않다.
 ㄷ. \overline{AB} 와 \overline{BC} 의 교점은 점 B이다.
 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

3-2 (1) \overline{DE} (2) $\overline{BC}, \overline{CD}, \overline{EF}, \overline{FA}$

- (1) \overline{AB} 와 평행한, 즉 만나지 않는 직선은 \overline{DE} 이다.
 (2) \overline{AB} 와 한 점에서 만나는 직선은 $\overline{BC}, \overline{CD}, \overline{EF}, \overline{FA}$ 이다.



개념 확인

- (1) 평행하다.
 (2) 한 점에서 만난다.
 (3) 꼬인 위치에 있다.

필수 문제 4 (1) $\overline{AC}, \overline{AD}, \overline{BC}, \overline{BE}$

- (2) \overline{DE}
 (3) $\overline{CF}, \overline{DF}, \overline{EF}$

4-1 ㄴ, ㄷ

- ㄴ. 모서리 AD와 모서리 FG는 평행하다.
 ㄷ. 모서리 CD와 한 점에서 만나는 모서리는 $\overline{BC}, \overline{CG}, \overline{AD}, \overline{DH}$ 의 4개이다.
 ㄷ. 모서리 EH와 평행한 모서리는 $\overline{AD}, \overline{BC}, \overline{FG}$ 의 3개이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

4-2 2개

모서리 AE와 한 점에서 만나는 모서리는 $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{BE}, \overline{DE}$ 의 5개이고,
 모서리 AE와 평행한 모서리는 없으므로
 모서리 AE와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{BC}, \overline{CD}$ 의 2개이다.

- 필수 문제 5** (1) $\overline{AE}, \overline{BF}, \overline{CG}, \overline{DH}$
 (2) 면 $ABCD$, 면 $ABFE$
 (3) $\overline{EF}, \overline{FG}, \overline{GH}, \overline{HE}$

- 5-1** 가, 라
 나. 면 $ABFE$ 와 모서리 DH 는 평행하므로 만나지 않는다.
 다. 면 $AEHD$ 와 평행한 모서리는 $\overline{BC}, \overline{BF}, \overline{FG}, \overline{CG}$ 의 4개이다.
 라. 면 $EFGH$ 와 수직인 모서리는 $\overline{AE}, \overline{BF}, \overline{CG}, \overline{DH}$ 의 4개이다.
 따라서 옳은 것은 가, 라이다.

- 5-2** 3 cm
 점 A와 면 $CBEF$ 사이의 거리는 \overline{AC} 의 길이와 같으므로 $\overline{AC} = \overline{DF} = 3\text{ cm}$

- 필수 문제 6** (1) 면 $ABFE$, 면 $BFGC$, 면 $CGHD$, 면 $AEHD$
 (2) 면 $ABCD$, 면 $BFGC$, 면 $EFGH$, 면 $AEHD$
 (3) 면 $ABCD$

- 6-1** 가, 나, 다
 가. 면 DEF 와 면 $BEFC$ 는 \overline{EF} 에서 만난다.
 다. 면 ABC 와 평행한 면은 면 DEF 의 1개이다.
 라. 면 ABC 와 수직인 면은 면 $ABED$, 면 $BEFC$, 면 $ADFC$ 의 3개이다.
 따라서 옳은 것은 가, 나, 다이다.

- 6-2** ①, ⑤
 면 $AEGC$ 와 수직인 면은 면 $ABCD$, 면 $EFGH$ 이다.

1 **쑥쑥 개념 익히기**

- 1 ①, ③ 2 ⑤ 3 가, 라 4 ②, ④
 5 6
 6 (1) $\overline{CG}, \overline{DH}, \overline{EH}, \overline{FG}, \overline{GH}$ (2) $\overline{AE}, \overline{BF}$
 7 $m \perp P$ 8 (1) \times (2) \times


- 1** ② 점 B는 직선 l 위에 있다.
 ④ 직선 l 은 점 C를 지나지 않는다.
 ⑤ 평면 P 는 점 D를 포함한다.
 따라서 옳은 것은 ①, ③이다.

- 2** ⑤ 한 평면 위의 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않은 경우는 없다.

참고 ④ 직교한다는 것은 한 점에서 만나는 경우 중 하나이다.

- 3** 나. \overline{AD} 와 \overline{DH} 는 한 점 D에서 만난다.
 다. \overline{CD} 와 \overline{EF} 는 평행하다.
 라. \overline{FG} 와 \overline{BC} 는 평행하다.
 바. \overline{GH} 와 \overline{EH} 는 한 점 H에서 만난다.
 따라서 바르게 짝 지은 것은 가, 라이다.


- 4** ② \overline{GF} 와 \overline{HI} 는 한 점에서 만난다.
 ④ 면 $DIJE$ 와 \overline{FJ} 는 한 점에서 만나지만 수직이 아니다.




- 5** 면 ABC 와 평행한 모서리는 $\overline{DE}, \overline{EF}, \overline{DF}$ 의 3개이므로 $a=3$
 면 $ADEB$ 와 수직인 면은 면 ABC , 면 $BEFC$, 면 DEF 의 3개이므로 $b=3$
 $\therefore a+b=3+3=6$

- 6** (1) \overline{AB} 와 한 점에서 만나는 직선은 $\overline{AD}, \overline{AE}, \overline{BC}, \overline{BF}, \overline{CD}$
 \overline{AB} 와 평행한 직선은 \overline{EF}
 따라서 \overline{AB} 와 꼬인 위치에 있는 직선은 $\overline{CG}, \overline{DH}, \overline{EH}, \overline{FG}, \overline{GH}$
 (2) 면 $CGHD$ 와 평행한 직선은 $\overline{AE}, \overline{BF}$


- 7** $l \parallel m, l \perp P$ 이면 오른쪽 그림과 같이 $m \perp P$ 이다.




- 8** (1) $l \perp P, l \perp Q$ 이면 오른쪽 그림과 같이 $P \parallel Q$ 이다.



- (2) $l \perp m, m \parallel P$ 이면 직선 l 과 평면 P 는 다음 그림과 같이 평행하거나 한 점에서 만날 수 있다.



평행하다.



한 점에서 만난다.

3 동위각과 엇각

P. 24

필수 문제 1 (1) $\angle e$ (2) $\angle g$ (3) $\angle h$ (4) $\angle g$

- 1-1** (1) $\angle d, 80^\circ$ (2) $\angle f, 100^\circ$
 (1) $\angle a$ 의 동위각은 $\angle d$ 이다.
 $\angle d = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$
 (2) $\angle b$ 의 엇각은 $\angle f$ 이다.
 $\angle f = 100^\circ$ (맞꼭지각)

- 1-2** (1) $\angle f, \angle j$
 (2) $\angle e, \angle i$


P. 25

- 개념 확인** (1) 100° (2) 100°
 (1) $l \parallel m$ 이고 $\angle a$ 의 동위각의 크기가 100° 이므로
 $\angle a = 100^\circ$
 (2) $l \parallel m$ 이고 $\angle b$ 의 엇각의 크기가 100° 이므로
 $\angle b = 100^\circ$


- 필수 문제 2** (1) $\angle x = 65^\circ, \angle y = 115^\circ$
 (2) $\angle x = 55^\circ, \angle y = 81^\circ$
 (1) $l \parallel m$ 이고 $\angle x$ 의 동위각의 크기가 65° 이므로
 $\angle x = 65^\circ$
 $\angle x + \angle y = 180^\circ$ 에서
 $65^\circ + \angle y = 180^\circ \quad \therefore \angle y = 115^\circ$
 (2) $l \parallel m$ 이고 $\angle x$ 의 엇각의 크기가 55° 이므로
 $\angle x = 55^\circ$
 또 $\angle y$ 의 동위각의 크기가 81° 이므로
 $\angle y = 81^\circ$

- 2-1** (1) 30 (2) 60

- (1) 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이므로
 $2x + (x + 90) = 180$
 $3x = 90 \quad \therefore x = 30$




- (2) 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이므로
 $50 + x + 70 = 180$
 $\therefore x = 60$





필수 문제 3 (1) $\angle x = 30^\circ, \angle y = 60^\circ$ (2) $\angle x = 60^\circ$

- (1) $l \parallel n$ 이므로 $\angle x = 30^\circ$ (엇각)
 $n \parallel m$ 이므로 $\angle y = 60^\circ$ (엇각)
 (2) 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 40^\circ + 20^\circ = 60^\circ$



3-1 (1) 35° (2) 65°



- (1) 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 90^\circ - 55^\circ = 35^\circ$
 (2) 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 30^\circ + 35^\circ = 65^\circ$





P. 26

개념 확인 (1) ○ (2) × (3) ○



필수 문제 4 ㄷ, ㄹ



⇒ 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.



⇒ 엇각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.



⇒ 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다. 따라서 두 직선 l, m 이 평행한 것은 ㄷ, ㄹ이다.

4-1 ①, ⑤


- ②, ④ 동위각의 크기가 같으면 $l \parallel m$ 이다.
 ③ 엇각의 크기가 같으면 $l \parallel m$ 이다.
 따라서 $l \parallel m$ 이 되게 하는 조건이 아닌 것은 ①, ⑤이다.

개념편

4-2 $l \parallel n, p \parallel q$

오른쪽 그림의 두 직선 l, n 에서 엇각의 크기가 75° 로 같으므로 $l \parallel n$ 이다.

또 두 직선 p, q 에서 동위각의 크기가 75° 로 같으므로 $p \parallel q$ 이다.




STEP 1 **쓱쓱 개념 익히기** P. 27~28


1 ⑤
2 (1) $\angle x = 85^\circ, \angle y = 130^\circ$
 (2) $\angle x = 60^\circ, \angle y = 70^\circ$
3 40° **4** (1) 40° (2) 16°
5 (1) 100° (2) 120° **6** \perp, \parallel
7 (1) $\angle ABC, \angle ACB$ (2) 80° **8** 110°

- 1** ④ $\angle a + \angle d = 180^\circ$ 에서
 $110^\circ + \angle d = 180^\circ \quad \therefore \angle d = 70^\circ$
 ⑤ $l \parallel m$ 인 경우에만 $\angle e = \angle a = 110^\circ$ (동위각)이다.


- 2** (1) $l \parallel m$ 이므로
 $\angle x = 85^\circ$ (동위각), $\angle y = 130^\circ$ (엇각)
 (2) 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이므로
 $120^\circ + \angle x = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 60^\circ$
 $50^\circ + \angle y + \angle x = 180^\circ$ 에서
 $50^\circ + \angle y + 60^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle y = 70^\circ$




- 3** 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이므로
 $\angle x = 80^\circ$ (동위각)
 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180° 이므로
 $\angle y + 60^\circ + \angle x = 180^\circ$ 에서
 $\angle y + 60^\circ + 80^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle y = 40^\circ$
 $\therefore \angle x - \angle y = 80^\circ - 40^\circ = 40^\circ$




- 4** (1) 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 70^\circ - 30^\circ = 40^\circ$



- (2) 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x + 4\angle x = 80^\circ$
 $5\angle x = 80^\circ \quad \therefore \angle x = 16^\circ$



- 5** (1) 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면
 $\angle x = 65^\circ + 35^\circ = 100^\circ$
 (2) 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면
 $\angle x = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$




- 6** \perp .


 \Rightarrow 동위각의 크기가 같으므로 $l \parallel m$ 이다.
 \parallel .

 \Rightarrow 엇각의 크기가 같으므로 $l \parallel m$ 이다.


- 7** (1) 오른쪽 그림에서
 $\angle ABC = \angle CBD = 50^\circ$ (접은 각)
 $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ 이므로
 $\angle ACB = \angle CBD = 50^\circ$ (엇각)
 따라서 $\angle CBD$ 와 크기가 같은 각은 $\angle ABC, \angle ACB$ 이다.
 (2) $\angle ABC = \angle ACB = 50^\circ$ 이므로
 삼각형 ABC 에서
 $\angle x + 50^\circ + 50^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 80^\circ$








- 8** 오른쪽 그림에서
 $\angle DEG = \angle FEG = 35^\circ$ (접은 각)
 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로
 $\angle EGF = \angle DEG = 35^\circ$ (엇각)
 따라서 삼각형 EFG 에서
 $35^\circ + \angle x + 35^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 110^\circ$




- 1 19 2 ④ 3 ② 4 2cm 5 ③
 6 60° 7 ④ 8 ③ 9 0
 10 ㄱ, ㄴ, ㄹ 11 ②, ④ 12 ② 13 9
 14 ④ 15 ④ 16 면 A, 면 C, 면 E, 면 F
 17 ②, ③ 18 ④ 19 35°

- 1 교점의 개수는 7개이므로 $a=7$
 교선의 개수는 12개이므로 $b=12$
 $\therefore a+b=7+12=19$
- 2 ④ \overrightarrow{CB} 와 \overrightarrow{CD} 는 시작점은 같으나 뻗어 나가는 방향이 다르므로 서로 다른 반직선이다.
- 3 두 점을 지나는 서로 다른 직선은 \overline{AB} , \overline{AC} , \overline{AD} , \overline{AE} , \overline{BC} , \overline{BD} , \overline{BE} , \overline{CD} , \overline{CE} , \overline{DE} 의 10개이다.
- 4 두 점 M, N이 각각 \overline{AB} , \overline{BC} 의 중점이므로
 $\overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 20 = 10(\text{cm})$
 $\overline{BN} = \frac{1}{2} \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 12 = 6(\text{cm})$
- 
- 이때 $\overline{MN} = \overline{MB} + \overline{BN} = 10 + 6 = 16(\text{cm})$ 이고
 점 P는 \overline{MN} 의 중점이므로
 $\overline{PN} = \frac{1}{2} \overline{MN} = \frac{1}{2} \times 16 = 8(\text{cm})$
 $\therefore \overline{PB} = \overline{PN} - \overline{BN} = 8 - 6 = 2(\text{cm})$
- 5 $2x+90+(x+30)=180$
 $3x=60 \quad \therefore x=20$
- 6 $\angle y = 180^\circ \times \frac{3}{2+3+4} = 60^\circ$
- 7 두 직선 AB와 CD, AB와 EF, CD와 EF가 각각 만날 때 맞꼭지각이 2쌍씩 생기므로 모두 $2 \times 3 = 6(\text{쌍})$ 이다.
다른 풀이
 $\angle AOF$ 와 $\angle BOE$, $\angle AOC$ 와 $\angle BOD$, $\angle COE$ 와 $\angle DOF$,
 $\angle AOD$ 와 $\angle BOC$, $\angle COF$ 와 $\angle DOE$, $\angle AOE$ 와 $\angle BOF$
 의 6쌍이다.
- 8 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $(3x-12) + (x+24) + 2x = 180$
 $6x = 168 \quad \therefore x = 28$



- 9 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $x+30=25+90 \quad \therefore x=85$
 $25+90+(y-20)=180 \quad \therefore y=85$
 $\therefore x-y=85-85=0$
- 10 ㄷ. 점 C에서 \overline{AB} 에 내린 수선의 발은 점 B이다.
 ㄹ. 점 C와 \overline{AB} 사이의 거리는 \overline{BC} 의 길이와 같으므로 8cm이다.
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.
- 11 ① 점 A는 직선 l 위에 있지 않다.
 ③ 직선 m 은 점 B를 지난다.
 ④ 두 점 B, E는 직선 l 위에 있다.
 ⑤ 점 C는 직선 m 위에 있다.
 따라서 옳은 것은 ②, ④이다.
- 12 \overline{CG} 와 평행한 모서리는 \overline{AE} , \overline{BF} , \overline{DH} 이고,
 이 중 \overline{BD} 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 \overline{AE} 이다.
- 13 면 ABCDEF와 평행한 모서리는 \overline{GH} , \overline{HI} , \overline{IJ} , \overline{JK} , \overline{KL} , \overline{GL} 의 6개이므로 $x=6$
 \overline{AB} 와 평행한 모서리는 \overline{DE} , \overline{GH} , \overline{JK} 의 3개이므로 $y=3$
 $\therefore x+y=6+3=9$
- 14 ① 한 직선 l 에 평행한 서로 다른 두 직선 m, n 은 오른쪽 그림과 같이 평행하다.
- 
- ② 한 직선 l 에 수직인 서로 다른 두 직선 m, n 은 다음 그림과 같이 평행하거나 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있을 수 있다.
- 
- 평행하다. 한 점에서 만난다. 꼬인 위치에 있다.
- ③ 한 평면 P 에 평행한 서로 다른 두 직선 l, m 은 다음 그림과 같이 평행하거나 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있을 수 있다.
- 
- 평행하다. 한 점에서 만난다. 꼬인 위치에 있다.
- ④ 한 평면 P 에 수직인 서로 다른 두 직선 l, m 은 오른쪽 그림과 같이 평행하다.
- 

⑤ 서로 만나지 않는 두 직선 l, m 은 다음 그림과 같이 평행하거나 꼬인 위치에 있을 수 있다.




따라서 옳은 것은 ④이다.

참고 항상 평행한 위치 관계

- 한 직선에 평행한 서로 다른 모든 직선은 평행하다.
- 한 평면에 평행한 서로 다른 모든 평면은 평행하다.
- 한 직선에 수직인 서로 다른 모든 평면은 평행하다.
- 한 평면에 수직인 서로 다른 모든 직선은 평행하다.


- 15 ④ 모서리 AB와 한 점에서 만나는 면은 면 AED, 면 ADGC, 면 BEF, 면 BFGC의 4개이다.
 ⑤ 모서리 BE와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AC}, \overline{AD}, \overline{CG}, \overline{DG}, \overline{FG}$ 의 5개이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

- 16 주어진 전개도로 만들어지는 정육면체는 오른쪽 그림과 같으므로 면 B와 수직인 면은 면 A, 면 C, 면 E, 면 F이다.




- 17 ① $\angle a$ 의 동위각은 $\angle e, \angle l$ 이다.
 ④ $\angle d$ 의 엇각은 $\angle i$ 이다.
 ⑤ $\angle d$ 의 크기와 $\angle j$ 의 크기는 같을지 알 수 없다.
 따라서 옳은 것은 ②, ③이다.


참고 삼각형을 이루는 세 직선에서 동위각과 엇각을 찾을 때는 다음 그림과 같이 직선의 일부를 지워서 생각하면 편리하다.



- 18 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이므로
 $\angle x + 65^\circ + (\angle x - 15^\circ) = 180^\circ$
 $2\angle x = 130^\circ$
 $\therefore \angle x = 65^\circ$



- 19 오른쪽 그림과 같이 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면
 $\angle x = 35^\circ$ (엇각)



STEP 3 **씩씩 서술형 완성하기** P. 32~33

〈과정은 풀이 참조〉

따라 해보자 **유제 1** 24 cm
유제 2 70°

연습해 보자 **1** 4개, 10개, 6개 **2** 50°
3 (1) $\overline{BE}, \overline{CE}, \overline{EH}$
 (2) 면 AHJ, 면 BEC, 면 ABEH
4 132°

따라 해보자

유제 1 **1단계** 점 M이 \overline{AB} 의 중점이므로 $\overline{AB} = 2\overline{MB}$
 점 N이 \overline{BC} 의 중점이므로 $\overline{BC} = 2\overline{BN}$... (i)
2단계 $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 2\overline{MB} + 2\overline{BN}$
 $= 2(\overline{MB} + \overline{BN}) = 2\overline{MN}$
 $= 2 \times 12 = 24(\text{cm})$... (ii)

채점 기준	비율
(i) AB, BC의 길이를 각각 MB, BN을 사용하여 나타내기	40%
(ii) AC의 길이 구하기	60%

유제 2 **1단계** 오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m 에 평행한 직선 n 을 그자. ... (i)

2단계 $l \parallel n$ 이므로 $\angle a = 30^\circ$ (동위각)
 $n \parallel m$ 이므로 $\angle b = 40^\circ$ (엇각) ... (ii)

3단계 $\angle x = \angle a + \angle b$
 $= 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$... (iii)


채점 기준	비율
(i) $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 그기	30%
(ii) $\angle a, \angle b$ 의 크기 구하기	40%
(iii) $\angle x$ 의 크기 구하기	30%

연습해 보자

1 네 점 A, B, C, P 중 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선은 $\overline{AB}, \overline{PA}, \overline{PB}, \overline{PC}$ 의 4개이고, ... (i)
 서로 다른 반직선은 $\overline{AB}, \overline{BA}, \overline{BC}, \overline{CB}, \overline{PA}, \overline{AP}, \overline{PB}, \overline{BP}, \overline{PC}, \overline{CP}$ 의 10개이고, ... (ii)
 서로 다른 선분은 $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{BC}, \overline{PA}, \overline{PB}, \overline{PC}$ 의 6개이다. ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 서로 다른 직선의 개수 구하기	30%
(ii) 서로 다른 반직선의 개수 구하기	40%
(iii) 서로 다른 선분의 개수 구하기	30%

- 2 $\angle BOC = \angle x$, $\angle COD = \angle y$ 라고 하면
 $\angle AOB = 2\angle x$, $\angle DOE = 3\angle y$
 즉, $\angle DOE = 3\angle y = 90^\circ$ 이므로
 $\angle y = 30^\circ$... (i)
 이때 $\angle AOC = 3\angle x = 90^\circ - \angle y$ 에서
 $3\angle x = 60^\circ \quad \therefore \angle x = 20^\circ$... (ii)
 $\therefore \angle BOD = \angle x + \angle y = 20^\circ + 30^\circ = 50^\circ$... (iii)




다른 풀이

- $\angle COE = 4\angle COD$ 이고 $\angle DOE = 90^\circ$ 이므로
 $\angle COD = \frac{1}{3}\angle DOE = \frac{1}{3} \times 90^\circ = 30^\circ$... (i)
 $\angle AOC = 90^\circ - \angle COD = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 이고
 $\angle AOB = 2\angle BOC$ 이므로
 $\angle BOC = \frac{1}{3}\angle AOC = \frac{1}{3} \times 60^\circ = 20^\circ$... (ii)
 $\therefore \angle BOD = \angle BOC + \angle COD = 20^\circ + 30^\circ = 50^\circ$... (iii)


채점 기준	비율
(i) $\angle COD$ 의 크기 구하기	40%
(ii) $\angle BOC$ 의 크기 구하기	40%
(iii) $\angle BOD$ 의 크기 구하기	20%

- 3 (1) 주어진 전개도로 만들어지는 입체도
 형은 오른쪽 그림과 같으므로 ... (i)
 \overline{AJ} 와 \overline{CO} 인 위치에 있는 모서리는
 \overline{BE} , \overline{CE} , \overline{EH} 이다. ... (ii)
 (2) 면 $ABCJ$ 와 수직인 면은
 면 AHJ , 면 BEC , 면 $ABEH$ 이다. ... (iii)



채점 기준	비율
(i) 입체도형의 겨냥도 그리기	30%
(ii) \overline{AJ} 와 \overline{CO} 인 위치에 있는 모서리 구하기	40%
(iii) 면 $ABCJ$ 와 수직인 면 구하기	30%

- 4 오른쪽 그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로
 $\angle GFC = \angle EGF = 66^\circ$ (엇각) ... (i)
 $\angle EFG = \angle GFC = 66^\circ$ (접은 각) ... (ii)



- 삼각형 EFG 에서
 $\angle GEF + 66^\circ + 66^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle GEF = 48^\circ$
 $\therefore \angle x = 180^\circ - \angle GEF = 180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$... (iii)

다른 풀이

- $\angle EFC = \angle EFG + \angle GFC = 66^\circ + 66^\circ = 132^\circ$ 이므로
 $\angle x = \angle EFC = 132^\circ$ (엇각) ... (iii)

채점 기준	비율
(i) $\angle GFC$ 의 크기 구하기	30%
(ii) $\angle EFG$ 의 크기 구하기	30%
(iii) $\angle x$ 의 크기 구하기	40%

답 54

- $l \parallel m$ 이므로 $y = 2x - 30$ (엇각)
 즉, $(3x + 70) + y = 180$ 에서
 $(3x + 70) + (2x - 30) = 180$ 이므로
 $5x = 140 \quad \therefore x = 28$
 $\therefore y = 2x - 30 = 2 \times 28 - 30 = 26$
 $\therefore x + y = 28 + 26 = 54$

1 삼각형의 작도

P. 38

필수 문제 1 ㉠ → ㉡ → ㉢


- 1-1 ① 선분 AC를 작도할 때는 직선 l 위에서 \overline{AB} 의 길이를 한 번 옮기면 되므로 컴퍼스를 사용한다.

P. 39

필수 문제 2 ㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉣ → ㉤

- 2-1 ①, ④
 ① 작도 순서는 ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉤이다.
 ②, ③ 두 점 O, P를 중심으로 반지름의 길이가 같은 원을 각각 그리므로
 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{PC} = \overline{PD}$
 따라서 옳지 않은 것은 ①, ④이다.

- 2-2 (1) ㉣, ㉢, ㉤
 (2) 서로 다른 두 직선이 한 직선과 만날 때, 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.
 (1) 작도 순서는 다음과 같다.
 ㉣ 점 P를 지나는 직선을 그어 직선 l과의 교점을 Q라고 한다.
 ㉡ 점 Q를 중심으로 원을 그려 \overline{PQ} , 직선 l과의 교점을 각각 A, B라고 한다.
 ㉢ 점 P를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{QA} 인 원을 그려 \overline{PQ} 와의 교점을 C라고 한다.
 ㉤ \overline{AB} 의 길이를 잴다.
 ㉣ 점 C를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{AB} 인 원을 그려 ㉣의 원과의 교점을 D라고 한다.
 ㉠ 두 점 P, D를 지나는 \overline{PD} 를 그으면 $l \parallel \overline{PD}$ 이다.
 따라서 작도 순서는 ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉤ → ㉠ → ㉠이다.



- 1 ② 눈금 없는 자로는 길이를 잴 수 없으므로 작도에서 두 선분의 길이를 비교할 때는 컴퍼스를 사용한다.
 3 두 점 O, P를 중심으로 반지름의 길이가 같은 원을 각각 그리므로
 $\overline{OX} = \overline{OY} = \overline{PC} = \overline{PD}$
 점 C를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{XY} 인 원을 그리므로
 $\overline{XY} = \overline{CD}$
 따라서 \overline{OX} 와 길이가 같은 선분이 아닌 것은 ②, ⑤이다.
 4 ①, ⑤ $\angle BAC = \angle QPR$ 이므로 동위각의 크기가 같다.
 $\therefore l \parallel \overline{PR}$
 ② 두 점 A, P를 중심으로 반지름의 길이가 같은 원을 각각 그리므로
 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{PQ} = \overline{PR}$
 ③ 점 Q를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{BC} 인 원을 그리므로
 $\overline{BC} = \overline{QR}$
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

P. 41

개념 확인 (1) \overline{BC} (2) \overline{AC} (3) \overline{AB}
 (4) $\angle C$ (5) $\angle A$ (6) $\angle B$

- 필수 문제 3 ③
 ① $6 < 2 + 5$
 ② $7 < 3 + 6$
 ③ $9 = 4 + 5$
 ④ $10 < 6 + 8$
 ⑤ $17 < 7 + 15$
 따라서 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은 ③이다.

- 3-1 ④
 ① $11 > 5 + 4$
 ② $11 > 5 + 5$
 ③ $11 = 5 + 6$
 ④ $11 < 5 + 9$
 ⑤ $17 > 5 + 11$
 따라서 a의 값이 될 수 있는 것은 ④이다.

STEP 1 **속속 개념 익히기** P. 40

1 ② 2 (가) \overline{AB} (나) \overline{BC} (다) 정삼각형
 3 ②, ⑤ 4 ④

P. 42

필수 문제 4 ⊕ → ⊖ → ⊕

4-1 ⑤

한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우 한 변을 작도한 후 그 양 끝 각을 작도하거나 한 각을 작도한 후 한 변을 작도하고 다른 한 각을 작도해야 한다.

P. 43

필수 문제 5 ③, ④

- ① 세 변의 길이가 주어진 경우이지만 $6 > 2 + 3$ 이므로 삼각형이 그려지지 않는다.
 - ② $\angle A$ 는 \overline{AB} 와 \overline{BC} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 - ③ 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
 - ④ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
 - ⑤ 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.
- 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 ③, ④이다.

5-1 ③

- ① 세 변의 길이가 주어진 경우이고, 이때 $7 < 3 + 5$ 이므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 - ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
 - ③ $\angle B$ 는 \overline{AC} 와 \overline{BC} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 - ④ $\angle C = 180^\circ - (95^\circ + 40^\circ) = 45^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우와 같다.
 - ⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
- 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것은 ③이다.

1 ④ $\overline{BC} < \overline{AB} + \overline{CA}$

- 2 ① $5 < 3 + 4$
 ② $7 < 4 + 7$
 ③ $10 < 4 + 8$
 ④ $9 < 5 + 6$
 ⑤ $12 = 5 + 7$

따라서 삼각형을 그릴 수 없는 것은 ⑤이다.

3 $x, x+4, x+9$ 에 주어진 x 의 값을 각각 대입하면

- ① $3, 7, 12 \Rightarrow 12 > 3 + 7$ (×)
- ② $4, 8, 13 \Rightarrow 13 > 4 + 8$ (×)
- ③ $5, 9, 14 \Rightarrow 14 = 5 + 9$ (×)
- ④ $6, 10, 15 \Rightarrow 15 < 6 + 10$ (○)
- ⑤ $7, 11, 16 \Rightarrow 16 < 7 + 11$ (○)

따라서 x 의 값이 될 수 있는 것은 ④, ⑤이다.

5 두 변의 길이가 주어졌으므로 나머지 한 변인 \overline{CA} 의 길이 또는 그 끼인각인 $\angle B$ 의 크기가 주어지면 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해진다.

6 ① 세 변의 길이가 주어진 경우이고, 이때 $6 < 4 + 5$ 이므로 삼각형이 하나로 정해진다.

- ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
- ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
- ④ $\angle A = 180^\circ - (50^\circ + 80^\circ) = 50^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우와 같다.
- ⑤ 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.

따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것은 ⑤이다.

7 3 cm, 4 cm, 5 cm인 경우 $\Rightarrow 5 < 3 + 4$ (○)

3 cm, 4 cm, 7 cm인 경우 $\Rightarrow 7 = 3 + 4$ (×)

3 cm, 5 cm, 7 cm인 경우 $\Rightarrow 7 < 3 + 5$ (○)

4 cm, 5 cm, 7 cm인 경우 $\Rightarrow 7 < 4 + 5$ (○)

따라서 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는 3개이다.

8 1 cm, 2 cm, 3 cm인 경우 $\Rightarrow 3 = 1 + 2$ (×)

1 cm, 2 cm, 4 cm인 경우 $\Rightarrow 4 > 1 + 2$ (×)

1 cm, 3 cm, 4 cm인 경우 $\Rightarrow 4 = 1 + 3$ (×)

2 cm, 3 cm, 4 cm인 경우 $\Rightarrow 4 < 2 + 3$ (○)

따라서 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는 1개이다.

STEP 1 **쓱쓱 개념 익히기** P. 44~45

1 ④	2 ⑤	3 ④, ⑤
4 (가) $\angle B$ (나) c (다) a	5 \sphericalangle , \square	6 ⑤
7 ②	8 1개	

2 삼각형의 합동

P. 46

개념 확인 (1) \overline{PQ} (2) \overline{QR} (3) \overline{RP}
(4) $\angle P$ (5) $\angle Q$ (6) $\angle R$

필수 문제 1 (1) 80° (2) 5 cm

- (1) $\angle A = \angle E = 80^\circ$
(2) $\overline{BC} = \overline{FG} = 5\text{ cm}$

1-1 가, 다

- 가. $\angle B = \angle E = 40^\circ$
나. $\angle D = \angle A = 65^\circ$
다. $\angle F = 180^\circ - (40^\circ + 65^\circ) = 75^\circ$
르, 브. 알 수 없다.
미. $\overline{EF} = \overline{BC} = 8\text{ cm}$
따라서 옳은 것은 가, 다이다.

P. 47

필수 문제 2 $\triangle ABC \equiv \triangle DFE$, ASA 합동

$\triangle ABC$ 에서
 $\angle B = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ$
 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DFE$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{DF} = 8\text{ cm}$, $\angle A = \angle D = 75^\circ$, $\angle B = \angle F = 45^\circ$
 $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DFE$ (ASA 합동)

2-1 ④

보기의 삼각형에서 나머지 한 각의 크기는
 $180^\circ - (90^\circ + 30^\circ) = 60^\circ$ 이므로 ④의 삼각형과 SAS 합동이다.

2-2 가, 미, 브

- 가. $\overline{AC} = \overline{DF}$ 이면 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 SAS 합동이다.
미. $\angle B = \angle E$ 이면 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 ASA 합동이다.
브. $\angle C = \angle F$ 이면 $\angle B = \angle E$ 이다.
따라서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 ASA 합동이다.

STEP

1 **쑥쑥 개념 익히기**


P. 48

- 1 ① 2 ①, ⑤ 3 ②, ⑤
4 (1) 가, \overline{CD} (나) \overline{AC} (다) SSS (2) 70°

- 1 ① \overline{AC} 의 대응변은 \overline{FD} 이다.
② $\overline{DE} = \overline{CB} = a$
④ $\angle D = \angle C = 180^\circ - (55^\circ + 80^\circ) = 45^\circ$
⑤ $\angle F = \angle A = 55^\circ$
따라서 옳지 않은 것은 ①이다.

- 2 가에서 나머지 한 각의 크기는 $180^\circ - (50^\circ + 100^\circ) = 30^\circ$ 이므로 가과 다은 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 ASA 합동이다.
미에서 나머지 한 각의 크기는 $180^\circ - (110^\circ + 40^\circ) = 30^\circ$ 이므로 미과 브은 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로 SAS 합동이다.

- 3 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ 이므로
 $\overline{AC} = \overline{DF}$ 이면 SSS 합동이고,
 $\angle B = \angle E$ 이면 SAS 합동이다.



- 4 (2) 합동인 두 삼각형에서 대응각의 크기는 서로 같으므로
 $\angle D = \angle B = 70^\circ$

STEP


2 **탄탄 단원 다지기**

P. 49~51

- 1 눈금 없는 자: 나, 다, 컴퍼스: 가, 르
2 ㉠ → ㉡ → ㉢ 3 ⑤ 4 ④ 5 5개
6 ⑤ 7 ④ 8 ④ 9 ③ 10 ③
11 나, 르 12 ③, ⑤ 13 ①, ⑤ 14 ② 15 ③
16 가, 나, 미 17 (1) $\triangle BCE \equiv \triangle DCF$ (2) 20 cm

- 2 ㉠ \overline{AB} 를 점 B의 방향으로 연장한다.
㉡ 컴퍼스를 사용하여 \overline{AB} 의 길이를 잰다.
㉢ 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 \overline{AB} 인 원을 그려 \overline{AB} 와 만나는 점을 C라고 한다.
따라서 작도 순서는 ㉠ → ㉡ → ㉢이다.

- 3 크기가 같은 각의 작도를 이용하여 $\angle AQB$ 와 크기가 같은 $\angle CPD$ 를 작도한 것으로 $\angle AQD = \angle CPD$ (동위각)이면 $l \parallel m$ 임을 이용한 것이다. 따라서 작도에서 이용한 성질은 ⑤이다.



- 4 ① $4 < 2 + 3$
 ② $8 < 4 + 6$
 ③ $9 < 5 + 5$
 ④ $12 = 5 + 7$
 ⑤ $10 < 10 + 10$

따라서 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은 ④이다.


- 5 (i) 가장 긴 변의 길이가 a cm일 때, 즉 $a \geq 5$ 일 때 $a < 3 + 5$, 즉 $a < 8$ 이므로 a 의 값이 될 수 있는 자연수는 5, 6, 7이다.
 (ii) 가장 긴 변의 길이가 5cm일 때, 즉 $a \leq 5$ 일 때 $5 < 3 + a$ 이므로 a 의 값이 될 수 있는 자연수는 3, 4, 5이다.
 따라서 (i), (ii)에 의해 a 의 값이 될 수 있는 자연수는 3, 4, 5, 6, 7의 5개이다.

- 6 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우 한 각을 작도하고 두 변을 작도하거나 한 변을 작도한 후 한 각을 작도하고 다른 한 변을 작도해야 한다.

- 7 ① 세 변의 길이가 주어진 경우이지만 $8 > 3 + 4$ 이므로 삼각형이 그려지지 않는다.
 ② $\angle C$ 는 \overline{AB} 와 \overline{BC} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 ③ $\angle C$ 는 \overline{AB} 와 \overline{CA} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 ④ $\angle A = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우와 같다.
 ⑤ 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.
 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 ④이다.

- 8 ② $\angle C = 180^\circ - (\angle A + \angle B)$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우와 같다.
 ④ $\angle A$ 는 \overline{AB} 와 \overline{BC} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.

- 9 ① 오른쪽 그림의 두 이등변삼각형은 한 변의 길이가 각각 3으로 같지만 합동은 아니다.
 ② 오른쪽 그림의 두 마름모는 한 변의 길이가 각각 7로 같지만 합동은 아니다.
 ④ 오른쪽 그림의 두 직사각형은 둘레의 길이가 각각 8로 같지만 합동은 아니다.
 ⑤ 오른쪽 그림의 두 삼각형은 세 각의 크기가 같지만 합동은 아니다.




따라서 두 도형이 항상 합동인 것은 ③이다.

참고 항상 합동인 두 도형

- (1) 한 변의 길이가 같은 두 정다각형
 둘레의 길이가 같은 두 정다각형
 넓이가 같은 두 정다각형
 (2) 반지름의 길이가 같은 두 원
 넓이가 같은 두 원


- 10 ① $\overline{AB} = \overline{EF} = 4$ cm
 ② $\overline{GH} = \overline{CD}$ 이지만 \overline{GH} 의 길이는 알 수 없다.
 ③ $\angle B = \angle F = 70^\circ$ 이므로 $\angle C = 360^\circ - (105^\circ + 120^\circ + 70^\circ) = 65^\circ$
 ④ $\angle E = \angle A = 105^\circ$
 ⑤ $\angle H = \angle D = 120^\circ$
 따라서 옳은 것은 ③이다.



- 12 ① SSS 합동
 ② SAS 합동
 ④ ASA 합동

- 13 $\angle B = \angle F$, $\angle C = \angle E$ 이면 $\angle A = \angle D$ 이므로 두 삼각형이 한 쌍의 대응변의 길이가 같으면 ASA 합동이 된다.
 ②, ④ 대응변이 아니다.
 따라서 조건이 될 수 있는 것은 ①, ⑤이다.

- 15 $\triangle ABD$ 와 $\triangle CBD$ 에서
 $\overline{AB}=\overline{CB}$, $\overline{AD}=\overline{CD}$, \overline{BD} 는 공통
 따라서 $\triangle ABD \equiv \triangle CBD$ (SSS 합동) ⑤
 이므로 $\angle ADB = \angle CDB$ ②,
 $\angle BAD = \angle BCD$ ①
 $\angle ABD = \angle CBD$ 이므로
 $\angle ABC = 2\angle DBC$ ④
 ③ $\angle ABD = \angle BDC$ 인지는 알 수 없다.
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.



- 16 $\triangle ABM$ 과 $\triangle DCM$ 에서
 $\overline{AM}=\overline{DM}$, $\angle AMB = \angle DMC$ (맞꼭지각),
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이므로 $\angle BAM = \angle CDM$ (엇각) ①
 따라서 $\triangle ABM \equiv \triangle DCM$ (ASA 합동) 이므로
 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ②, $\overline{BM} = \overline{CM}$ ③

- 17 (1) $\triangle BCE$ 와 $\triangle DCF$ 에서
 사각형 ABCD가 정사각형이므로 $\overline{BC} = \overline{DC}$,
 사각형 ECFG가 정사각형이므로 $\overline{CE} = \overline{CF}$,
 $\angle BCE = \angle DCF = 90^\circ$
 $\therefore \triangle BCE \equiv \triangle DCF$ (SAS 합동)
 (2) 합동인 두 삼각형에서 대응변의 길이는 서로 같으므로
 $\overline{BE} = \overline{DF} = 20 \text{ cm}$

- 2단계 $\angle B$ 의 크기를 추가하면 한 변의 길이와 그 양 끝
 각의 크기가 주어진 경우가 되므로 $\triangle ABC$ 를 하나로
 작도할 수 있고, $\angle C$ 의 크기를 추가하면
 $\angle B = 180^\circ - (\angle A + \angle C)$ 에서 $\angle B$ 의 크기를 알
 수 있으므로 이 경우에도 $\triangle ABC$ 를 하나로 작도할
 수 있다. ... (ii)

- 3단계 따라서 추가할 수 있는 조건은 \overline{AC} 의 길이 또는
 $\angle B$ 의 크기 또는 $\angle C$ 의 크기이다. ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 변의 길이에 대한 조건 구하기	40%
(ii) 각의 크기에 대한 조건 구하기	50%
(iii) 추가할 수 있는 조건 모두 구하기	10%

- 유제 2 1단계 $\triangle BCE$ 와 $\triangle CDF$ 에서
 $\overline{CE} = \overline{DF}$ 이고,
 사각형 ABCD가 정사각형이므로
 $\overline{BC} = \overline{CD}$, $\angle BCE = \angle CDF = 90^\circ$... (i)
 2단계 따라서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼
 인각의 크기가 같으므로
 $\triangle BCE \equiv \triangle CDF$ (SAS 합동) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) $\triangle BCE$ 와 $\triangle CDF$ 가 합동인 이유 설명하기	60%
(ii) 합동 조건 말하기	40%


연습해 보자

- 1 (1) 작도 순서를 바르게 나열하면
 $\text{㉠} \rightarrow \text{㉡} \rightarrow \text{㉢} \rightarrow \text{㉣} \rightarrow \text{㉤} \rightarrow \text{㉥}$... (i)
 (2) '서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 엇각의 크
 기가 같으면 두 직선은 평행하다.'는 성질을 이용한 것이
 다. ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 작도 순서 바르게 나열하기	50%
(ii) 작도에 이용한 평행선의 성질 말하기	50%

참고 작도 순서는 다음과 같다.

- ㉠ 점 P를 지나는 직선을 그어 직
 선 l과의 교점을 Q라고 한다.
 ㉡ 점 Q를 중심으로 원을 그려
 \overline{PQ} , 직선 l과의 교점을 각각
 A, B라고 한다.
 ㉢ 점 P를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{QA} 인 원을 그려 \overline{PQ} 와
 의 교점을 C라고 한다.
 ㉣ \overline{AB} 의 길이를 잰다.
 ㉤ 점 C를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{AB} 인 원을 그려 ㉡의
 원과의 교점을 D라고 한다.
 ㉥ \overline{PD} 를 그으면 $l \parallel m$ 이다.
 따라서 작도 순서는 ㉠ \rightarrow ㉡ \rightarrow ㉢ \rightarrow ㉣ \rightarrow ㉤ \rightarrow ㉥이다.



STEP 3 **썩썩 서술형 완성하기** P. 52~53

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 유제 1 \overline{AC} 의 길이, $\angle B$ 의 크기, $\angle C$ 의 크기
 유제 2 SAS 합동

연습해 보자 1 (1) ㉠ \rightarrow ㉡ \rightarrow ㉢ \rightarrow ㉣ \rightarrow ㉤ \rightarrow ㉥
 (2) 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날
 때, 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행
 하다.
 2 2개 3 $\triangle DCE$, SAS 합동
 4 500 m

- 따라 해보자 유제 1 1단계 \overline{AC} 의 길이를 추가하면 두 변의 길이와 그 끼인각
 의 크기가 주어진 경우가 되므로 $\triangle ABC$ 를 하나로
 작도할 수 있다. ... (i)

- 2 3개의 막대를 골라 삼각형을 만들 때, 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 한다. ... (i)
 2 cm, 6 cm, 8 cm인 경우 $\Rightarrow 8 = 2 + 6$ (×)
 2 cm, 6 cm, 9 cm인 경우 $\Rightarrow 9 > 2 + 6$ (×)
 2 cm, 8 cm, 9 cm인 경우 $\Rightarrow 9 < 2 + 8$ (○)
 6 cm, 8 cm, 9 cm인 경우 $\Rightarrow 9 < 6 + 8$ (○) ... (ii)
 따라서 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는 2개이다. ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 세 변의 길이 사이의 관계 설명하기	30 %
(ii) 각 경우의 세 변의 길이 비교하기	50 %
(iii) 삼각형의 개수 구하기	20 %

- 3 $\triangle ABE$ 와 $\triangle DCE$ 에서
 사각형 ABCD가 직사각형이므로
 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\angle ABE = \angle DCE = 90^\circ$, ... (i)
 점 E가 \overline{BC} 의 중점이므로 $\overline{BE} = \overline{CE}$... (i)
 따라서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같으므로
 $\triangle ABE \cong \triangle DCE$ (SAS 합동) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) $\triangle ABE$ 와 $\triangle DCE$ 가 합동인 이유 설명하기	60 %
(ii) 합동 조건 말하기	40 %

- 4 $\triangle ABO$ 와 $\triangle CDO$ 에서
 $\overline{BO} = \overline{DO} = 600$ m,
 $\angle ABO = \angle CDO = 50^\circ$,
 $\angle AOB = \angle COD$ (맞꼭지각)이므로
 $\triangle ABO \cong \triangle CDO$ (ASA 합동) ... (i)
 즉, 합동인 두 삼각형에서 대응변의 길이는 서로 같으므로
 $\overline{AB} = \overline{CD} = 500$ m
 따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 500 m이다. ... (ii)

채점 기준	비율
(i) $\triangle ABO \cong \triangle CDO$ 임을 설명하기	60 %
(ii) 두 지점 A, B 사이의 거리 구하기	40 %

문학 속 수학

P. 54

답 ㉠ \rightarrow ㉡ \rightarrow ㉢ \rightarrow ㉣

1 다각형

P. 58

개념 확인 ②, ④

- ② 곡선으로 이루어져 있으므로 다각형이 아니다.
- ④ 평면도형이 아니므로 다각형이 아니다.

필수 문제 1 (1) 50° (2) 120°

다각형의 한 꼭짓점에서
(내각의 크기)+(외각의 크기)=180°이므로
(1) $\angle B = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$
(2) $(\angle C \text{의 외각의 크기}) = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

1-1 (1) 55° (2) 80°

다각형의 한 꼭짓점에서
(내각의 크기)+(외각의 크기)=180°이므로
(1) $(\angle A \text{의 외각의 크기}) = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$
(2) $\angle C = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$

필수 문제 2 (1) 정육각형 (2) 정팔각형

- (1) (가)에서 육각형이고, (나)에서 정다각형이므로
주어진 다각형은 정육각형이다.
- (2) (가), (나)에서 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같으므로 정다각형이다.
(나)에서 8개의 내각으로 이루어져 있으므로 팔각형이다.
따라서 주어진 다각형은 정팔각형이다.

P. 59

개념 확인

다각형				...	n각형
꼭짓점의 개수	4개	5개	6개	...	n개
한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수	1개	2개	3개	...	(n-3)개
대각선의 개수	2개	5개	9개	...	$\frac{n(n-3)}{2}$ 개

필수 문제 3 (1) 20개 (2) 27개 (3) 44개

(1) $\frac{8 \times (8-3)}{2} = 20(\text{개})$ (2) $\frac{9 \times (9-3)}{2} = 27(\text{개})$
(3) $\frac{11 \times (11-3)}{2} = 44(\text{개})$

3-1 (1) 십오각형 (2) 90개

- (1) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 12개인
다각형을 n각형이라고 하면
 $n-3=12 \quad \therefore n=15$
따라서 주어진 다각형은 십오각형이다.
- (2) 십오각형의 대각선의 개수는
 $\frac{15 \times (15-3)}{2} = 90(\text{개})$

3-2 54개


- 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수가 10개인 다각형을 n각형이라고 하면
 $n-2=10 \quad \therefore n=12$
따라서 십이각형의 대각선의 개수는
 $\frac{12 \times (12-3)}{2} = 54(\text{개})$

STEP 1 **쑥쑥 개념 익히기** P. 60

1 135°	2 ④, ⑤	3 108
4 15개	5 ②	6 정십각형

- 1 $(\angle A \text{의 외각의 크기}) = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$
 $(\angle D \text{의 외각의 크기}) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
따라서 구하는 합은
 $75^\circ + 60^\circ = 135^\circ$

- 2 ④ 오른쪽 그림의 정팔각형에서 두 대각선의 길이는 다르다.



- ⑤ 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 크기의 합은 180°이다.

- 3 칠각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는
 $7-3=4(\text{개}) \quad \therefore a=4$
십육각형의 대각선의 개수는
 $\frac{16 \times (16-3)}{2} = 104(\text{개}) \quad \therefore b=104$
 $\therefore a+b=4+104=108$

- 4 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수가 13개인 다각형을 n각형이라고 하면
 $n-2=13 \quad \therefore n=15$
따라서 십오각형의 변의 개수는 15개이다.

5 대각선의 개수가 14개인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$\frac{n(n-3)}{2} = 14$$

$$n(n-3) = 28 = 7 \times 4 \quad \rightarrow \text{차가 3인 두 수를 찾는다.} \quad \therefore n = 7$$

따라서 구하는 정다각형은 정칠각형이다.

다른 풀이

주어진 정다각형의 대각선의 개수를 각각 구하면

- ① $\frac{6 \times (6-3)}{2} = 9(\text{개})$
- ② $\frac{7 \times (7-3)}{2} = 14(\text{개})$
- ③ $\frac{8 \times (8-3)}{2} = 20(\text{개})$
- ④ $\frac{12 \times (12-3)}{2} = 54(\text{개})$
- ⑤ $\frac{14 \times (14-3)}{2} = 77(\text{개})$

따라서 구하는 정다각형은 ② 정칠각형이다.

6 (가)에서 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형은 정다각형이다.

(나)에서 대각선의 개수가 35개인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$\frac{n(n-3)}{2} = 35, \quad n(n-3) = 70 = 10 \times 7$$

$$\therefore n = 10$$

따라서 주어진 다각형은 정십각형이다.

2 삼각형의 내각과 외각

P. 61

필수 문제 1 (1) 35° (2) 100° (3) 30°

- (1) $\angle x + 120^\circ + 25^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 35^\circ$
- (2) $\angle x + 30^\circ + 50^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 100^\circ$
- (3) $90^\circ + (\angle x + 30^\circ) + \angle x = 180^\circ$
 $2\angle x = 60^\circ \quad \therefore \angle x = 30^\circ$

1-1 20

$$2x + (x + 45) + (3x + 15) = 180$$

$$6x = 120 \quad \therefore x = 20$$

1-2 $\angle A = 40^\circ, \angle B = 60^\circ, \angle C = 80^\circ$

$$\angle A = 180^\circ \times \frac{2}{2+3+4} = 180^\circ \times \frac{2}{9} = 40^\circ$$


$$\angle B = 180^\circ \times \frac{3}{2+3+4} = 180^\circ \times \frac{3}{9} = 60^\circ$$

$$\angle C = 180^\circ \times \frac{4}{2+3+4} = 180^\circ \times \frac{4}{9} = 80^\circ$$

P. 62


필수 문제 2 (1) 25° (2) 110°

- (1) $\angle x + 45^\circ = 70^\circ \quad \therefore \angle x = 25^\circ$
- (2) 오른쪽 그림에서
 $\angle x = 60^\circ + 50^\circ = 110^\circ$




2-1 (1) 45° (2) 40°

- (1) $\angle x + 50^\circ = 95^\circ \quad \therefore \angle x = 45^\circ$
- (2) 오른쪽 그림에서
 $60^\circ + \angle x = 100^\circ$
 $\therefore \angle x = 40^\circ$



2-2 (1) 60 (2) 30

- (1) 오른쪽 그림에서
 $2x + 10 = 100 + 30$
 $2x = 120 \quad \therefore x = 60$
- (2) 오른쪽 그림에서
 $3x + 25 = 45 + 70$
 $3x = 90 \quad \therefore x = 30$



STEP 1


쑥쑥 개념 익히기

P. 63

- 1** (1) 40 (2) 60 **2** (1) 100° (2) 35° **3** 80°
- 4** (1) 50° (2) 75° **5** 90°


- 1** (1) $(x+20) + (2x-10) + 50 = 180$
 $3x = 120 \quad \therefore x = 40$
- (2) $35 + (x-5) = 90$
 $\therefore x = 60$

- 2** (1) $60^\circ + (180^\circ - \angle x) = \angle x + 40^\circ$
 $2\angle x = 200^\circ \quad \therefore \angle x = 100^\circ$
- (2) 오른쪽 그림에서
 $\angle a = 25^\circ + 50^\circ = 75^\circ$
즉, $\angle x + 40^\circ = \angle a$ 이므로
 $\angle x + 40^\circ = 75^\circ \quad \therefore \angle x = 35^\circ$




다른 풀이

- 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $25^\circ + 50^\circ + \cancel{\angle} = \angle x + 40^\circ + \cancel{\angle}$
 $\therefore \angle x = 35^\circ$



3 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle ACB = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ$
 $\therefore \angle DCB = \frac{1}{2} \angle ACB$
 $= \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ$




따라서 $\triangle DBC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (70^\circ + 30^\circ) = 80^\circ$


다른 풀이

$\angle ACD = \frac{1}{2} \angle ACB = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ$ 이므로
 $\triangle ADC$ 에서
 $\angle x = \angle CAD + \angle ACD = 50^\circ + 30^\circ = 80^\circ$

4 (1) $\triangle ABC$ 가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ACB = \angle ABC = 25^\circ$
 $\therefore \angle DAC = 25^\circ + 25^\circ = 50^\circ$
 (2) $\triangle ACD$ 가 $\overline{AC} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ADC = \angle DAC = 50^\circ$
 따라서 $\triangle BCD$ 에서
 $\angle x = 25^\circ + 50^\circ = 75^\circ$



5 $\triangle ABD$ 가 $\overline{AB} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ADB = \angle DAB = 30^\circ$
 $\therefore \angle DBC = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$
 $\triangle DBC$ 가 $\overline{BD} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle DCB = \angle DBC = 60^\circ$
 따라서 $\triangle ACD$ 에서
 $\angle x = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$



3 다각형의 내각과 외각

P. 64

필수 문제 1 (1) 1080° (2) 1620° (3) 2340°

- (1) $180^\circ \times (8-2) = 1080^\circ$
- (2) $180^\circ \times (11-2) = 1620^\circ$
- (3) $180^\circ \times (15-2) = 2340^\circ$

1-1 70°

오각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ 이므로
 $\angle x + 100^\circ + 110^\circ + 120^\circ + 140^\circ = 540^\circ$
 $\angle x + 470^\circ = 540^\circ \quad \therefore \angle x = 70^\circ$

필수 문제 2 칠각형

주어진 다각형을 n 각형이라고 하면
 $180^\circ \times (n-2) = 900^\circ, n-2=5 \quad \therefore n=7$
 따라서 주어진 다각형은 칠각형이다.

2-1 12개

주어진 다각형을 n 각형이라고 하면
 $180^\circ \times (n-2) = 1800^\circ, n-2=10 \quad \therefore n=12$
 따라서 십이각형의 꼭짓점의 개수는 12개이다.

P. 65

필수 문제 3 (1) 80° (2) 110°


- (1) $\angle x + 130^\circ + 150^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 280^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 80^\circ$
- (2) $80^\circ + \angle x + 100^\circ + 70^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 250^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 110^\circ$

3-1 (1) 100° (2) 70°

- (1) $80^\circ + 75^\circ + \angle x + 105^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 260^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 100^\circ$
- (2) $\angle x + 77^\circ + 63^\circ + 55^\circ + 95^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 290^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 70^\circ$

3-2 128°

- $(180^\circ - \angle x) + 60^\circ + 63^\circ + 75^\circ$
 $+ 60^\circ + 50^\circ = 360^\circ$
 $488^\circ - \angle x = 360^\circ$
 $\therefore \angle x = 128^\circ$



P. 66

필수 문제 4 (1) $135^\circ, 45^\circ$ (2) $140^\circ, 40^\circ$ (3) $150^\circ, 30^\circ$

- (1) (한 내각의 크기) $= \frac{180^\circ \times (8-2)}{8} = 135^\circ$
 (한 외각의 크기) $= \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$
- (2) (한 내각의 크기) $= \frac{180^\circ \times (9-2)}{9} = 140^\circ$
 (한 외각의 크기) $= \frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$
- (3) (한 내각의 크기) $= \frac{180^\circ \times (12-2)}{12} = 150^\circ$
 (한 외각의 크기) $= \frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$

다른 풀이

- (1) 정팔각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$ 이므로
 한 내각의 크기는 $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

- (2) 정구각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{9}=40^\circ$ 이므로
한 내각의 크기는 $180^\circ-40^\circ=140^\circ$
- (3) 정십이각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{12}=30^\circ$ 이므로
한 내각의 크기는 $180^\circ-30^\circ=150^\circ$

4-1 60°

주어진 정다각형은 정육각형이므로
 $\angle a = \frac{180^\circ \times (6-2)}{6} = 120^\circ$, $\angle b = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$
 $\therefore \angle a - \angle b = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$

4-2 (1) 정십팔각형 (2) 정십오각형

주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 (1) $\frac{360^\circ}{n} = 20^\circ \quad \therefore n = 18$
 따라서 주어진 정다각형은 정십팔각형이다.
 (2) $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 156^\circ$
 $180^\circ \times n - 360^\circ = 156^\circ \times n$
 $24^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n = 15$
 따라서 주어진 정다각형은 정십오각형이다.
다른 풀이
 한 외각의 크기는 $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$ 이므로
 $\frac{360^\circ}{n} = 24^\circ \quad \therefore n = 15$
 따라서 주어진 정다각형은 정십오각형이다.

STEP 1 **속속 개념 익히기** P. 67~68

1	1448	2	6개
3	(1) 80° (2) 90° (3) 40°	4	8
5	⑤	6	②
7	$\angle x = 72^\circ$, $\angle y = 36^\circ$		
8	(1) 120° (2) 정삼각형	9	정구각형

- 1 십각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수는
 $10-2=8(\text{개}) \quad \therefore a=8$
 십각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (10-2) = 1440^\circ \quad \therefore b=1440$
 $\therefore a+b=8+1440=1448$
- 2 내각의 크기의 합이 1260°인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $180^\circ \times (n-2) = 1260^\circ$, $n-2=7 \quad \therefore n=9$
 따라서 구각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는
 $9-3=6(\text{개})$

- 3 (1) 사각형의 내각의 크기의 합은 360°이므로
 $80^\circ + 140^\circ + \angle x + (180^\circ - 120^\circ) = 360^\circ$
 $\angle x + 280^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 80^\circ$
- (2) 오각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ 이므로
 $\angle x + (180^\circ - 55^\circ) + 90^\circ + (180^\circ - 75^\circ) + 130^\circ = 540^\circ$
 $\angle x + 450^\circ = 540^\circ \quad \therefore \angle x = 90^\circ$
- (3) 육각형의 외각의 크기의 합은 360°이므로
 $40^\circ + (180^\circ - 95^\circ) + 65^\circ + (180^\circ - 110^\circ) + \angle x + 60^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 320^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 40^\circ$

4 n 각형의 내각의 크기와 외각의 크기의 총합이 1440°이고 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 크기의 합은 180°이므로
 $180^\circ \times n = 1440^\circ \quad \therefore n = 8$

- 5 ① 정오각형의 한 내각의 크기는
 $\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$
- ② 정십각형의 한 외각의 크기는
 $\frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$
- ③ 정사각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기는 모두 90°로 같다.
- ④ 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 합은 항상 180°이다.
- ⑤ 정육각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (6-2) = 720^\circ$
 정오각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$
 따라서 정육각형의 내각의 크기의 합은 정오각형의 내각의 크기의 합보다 $720^\circ - 540^\circ = 180^\circ$ 만큼 더 크다.
 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.


참고 ⑤ 다각형의 내각의 크기의 합의 규칙은 다음과 같다.

삼각형	사각형	오각형	육각형	...
180°	360°	540°	720°	...

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{+180^\circ} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{+180^\circ} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{+180^\circ} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{+180^\circ}$

6 한 외각의 크기가 60°인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{360^\circ}{n} = 60^\circ \quad \therefore n = 6$
 따라서 정육각형의 대각선의 개수는
 $\frac{6 \times (6-3)}{2} = 9(\text{개})$

7 정오각형의 한 외각의 크기는
 $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$ 이므로
 $\angle x = \angle FBC = 72^\circ$
 따라서 $\triangle BFC$ 에서
 $\angle y = 180^\circ - (72^\circ + 72^\circ) = 36^\circ$



- 8 (1) 정다각형에서
 (한 내각의 크기)+(한 외각의 크기)= 180° 이고
 (한 내각의 크기):(한 외각의 크기)= $1:2$ 이므로
 (한 외각의 크기)= $180^\circ \times \frac{2}{1+2} = 180^\circ \times \frac{2}{3} = 120^\circ$

(2) 주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$\frac{360^\circ}{n} = 120^\circ \quad \therefore n = 3$$

따라서 주어진 정다각형은 정삼각형이다.

참고 다음과 같이 한 내각의 크기를 이용하여 주어진 정다각형을 구할 수도 있지만 한 외각의 크기를 이용하는 것이 편리하다.

$$\Leftrightarrow (\text{한 내각의 크기}) = 180^\circ \times \frac{1}{1+2} = 180^\circ \times \frac{1}{3} = 60^\circ$$

주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 60^\circ, \quad 180^\circ \times n - 360^\circ = 60^\circ \times n$$

$$120^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n = 3, \text{ 즉 정삼각형}$$

- 9 정다각형에서
 (한 내각의 크기)+(한 외각의 크기)= 180° 이고
 (한 내각의 크기):(한 외각의 크기)= $7:2$ 이므로
 (한 외각의 크기)= $180^\circ \times \frac{2}{7+2} = 180^\circ \times \frac{2}{9} = 40^\circ$

주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$\frac{360^\circ}{n} = 40^\circ \quad \therefore n = 9$$

따라서 주어진 정다각형은 정구각형이다.

- 3 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수가 8개인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $n-2=8 \quad \therefore n=10$

따라서 십각형의 대각선의 개수는

$$\frac{10 \times (10-3)}{2} = 35(\text{개})$$

- 4 (1) 7명의 학생이 양옆에 앉은 학생과 각각 악수하는 것은 7개의 점을 서로 이웃하는 것끼리 연결하는 것, 즉 칠각형을 그리는 것으로 생각할 수 있으므로

$$(\text{악수를 하는 학생의 쌍의 수}) = (\text{칠각형의 변의 개수}) = 7(\text{쌍})$$

- (2) 7명의 학생이 악수하지 않은 학생과 각각 눈인사하는 것은 칠각형의 대각선을 그리는 것으로 생각할 수 있으므로 (눈인사를 하는 학생의 쌍의 수)

$$= (\text{칠각형의 대각선의 개수}) = \frac{7 \times (7-3)}{2} = 14(\text{쌍})$$

- 5 (가)에서 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형은 정다각형이다.

(나)에서 대각선의 개수가 54개인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$\frac{n(n-3)}{2} = 54, \quad n(n-3) = 108 = 12 \times 9 \quad \therefore n = 12$$

따라서 주어진 다각형은 정십이각형이다.

- 6 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ 이므로
 $2\angle C + 60^\circ + \angle C = 180^\circ$
 $3\angle C = 120^\circ \quad \therefore \angle C = 40^\circ$
 $\therefore \angle A = 2\angle C = 2 \times 40^\circ = 80^\circ$

- 7 $\triangle IBC$ 에서 $\angle BIC = 130^\circ$ 이므로
 $\angle IBC + \angle ICB = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$
 $\therefore \angle B + \angle C = 2\angle IBC + 2\angle ICB$
 $= 2(\angle IBC + \angle ICB)$
 $= 2 \times 50^\circ = 100^\circ$

따라서 $\triangle ABC$ 에서

$$\angle x = 180^\circ - (\angle B + \angle C) = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$$



- 8 오른쪽 그림에서
 $\angle a = 25^\circ + 80^\circ = 105^\circ$
 즉, $\angle x + 40^\circ = \angle a$ 이므로
 $\angle x + 40^\circ = 105^\circ \quad \therefore \angle x = 65^\circ$

다른 풀이

오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로

$$80^\circ + 25^\circ + \sphericalangle = \angle x + 40^\circ + \sphericalangle$$

$$\therefore \angle x = 65^\circ$$



STEP 2 단원 다지기 P. 69~71


1 ④	2 ①, ④	3 35개	4 (1) 7쌍 (2) 14쌍
5 ⑤	6 80°	7 80°	8 ④
9 $\angle x = 65^\circ, \angle y = 110^\circ$	10 ⑤	11 ④	
12 30°	13 55°	14 ①	15 36°
16 360°			
17 ①	18 ③	19 ④	20 (1) 36° (2) 36°

- 1 $\angle x = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ, \angle y = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$
 $\therefore \angle x + \angle y = 95^\circ + 75^\circ = 170^\circ$

- 2 ② 다각형의 한 꼭짓점에 대하여 외각은 2개가 있고, 그 크기는 서로 같다.
 ③ 정다각형은 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형이다.
 ⑤ 정삼각형의 한 내각의 크기는 60° , 한 외각의 크기는 120° 로 같지 않다.
 따라서 옳은 것은 ①, ④이다.

9 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle x = 40^\circ + 25^\circ = 65^\circ$
 따라서 $\triangle ECD$ 에서
 $\angle y = \angle x + 45^\circ$
 $= 65^\circ + 45^\circ = 110^\circ$

10 $\angle ACD = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
 $\angle BAC = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$
 $\therefore \angle DAC = \frac{1}{2} \angle BAC$
 $= \frac{1}{2} \times 50^\circ = 25^\circ$



따라서 $\triangle ADC$ 에서
 $\angle x = 25^\circ + 60^\circ = 85^\circ$

11 $\triangle ABD$ 는 $\overline{AD} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle DBA = \angle DAB = \angle x$
 $\triangle ABD$ 에서
 $\angle BDC = \angle x + \angle x = 2\angle x$
 $\triangle BCD$ 는 $\overline{BC} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $2\angle x = 70^\circ \quad \therefore \angle x = 35^\circ$


12 $\triangle AGD$ 에서 $\angle FGB = 50^\circ + 40^\circ = 90^\circ$
 $\triangle FCE$ 에서 $\angle GFB = 35^\circ + 25^\circ = 60^\circ$
 따라서 $\triangle BGF$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (\angle FGB + \angle GFB)$
 $= 180^\circ - (90^\circ + 60^\circ) = 30^\circ$

13 오각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ 이므로
 $2\angle x + 135^\circ + 2\angle x + 130^\circ + \angle x = 540^\circ$
 $5\angle x + 265^\circ = 540^\circ$
 $5\angle x = 275^\circ \quad \therefore \angle x = 55^\circ$


14 육각형의 외각의 크기의 합은 360° 이므로
 $60^\circ + (180^\circ - 100^\circ) + \angle x + 70^\circ + 40^\circ + (180^\circ - 3\angle x)$
 $= 360^\circ$
 $430^\circ - 2\angle x = 360^\circ$
 $2\angle x = 70^\circ \quad \therefore \angle x = 35^\circ$

15 (한 내각의 크기) = $180^\circ -$ (그와 이웃하는 외각의 크기)이므로 크기가 가장 큰 외각과 이웃하는 내각의 크기가 가장 작다. 사각형의 외각의 크기의 합은 360° 이므로 가장 큰 외각의 크기는
 $360^\circ \times \frac{4}{1+4+2+3} = 360^\circ \times \frac{4}{10} = 144^\circ$
 따라서 가장 작은 내각의 크기는
 $180^\circ - 144^\circ = 36^\circ$

16 오른쪽 그림과 같이 보조선을 그으면
 $\angle e + \angle f = \angle g + \angle h$ 이고, 사각형의 내각의 크기의 합은 360° 이므로
 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f$
 $= \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle g + \angle h$
 $= 360^\circ$



참고 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $\angle e + \angle f = 180^\circ$
 $\angle g + \angle h = 180^\circ$
 $\therefore \angle e + \angle f = \angle g + \angle h$



17 내각의 크기의 합이 2340° 인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $180^\circ \times (n-2) = 2340^\circ$
 $n-2 = 13 \quad \therefore n = 15$
 따라서 정십오각형의 한 외각의 크기는
 $\frac{360^\circ}{15} = 24^\circ$

18 정다각형에서
 (한 내각의 크기) + (한 외각의 크기) = 180° 이고
 (한 내각의 크기) : (한 외각의 크기) = 4 : 1이므로
 (한 외각의 크기) = $180^\circ \times \frac{1}{4+1} = 180^\circ \times \frac{1}{5} = 36^\circ$
 주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{360^\circ}{n} = 36^\circ \quad \therefore n = 10$
 따라서 정십각형의 꼭짓점의 개수는 10개이다.

다른 풀이 한 외각의 크기 구하기
 주어진 정다각형의 한 외각의 크기를 $\angle a$ 라고 하면
 한 내각의 크기는 $4\angle a$ 이므로
 $\angle a + 4\angle a = 180^\circ$
 $5\angle a = 180^\circ \quad \therefore \angle a = 36^\circ$
 즉, 한 외각의 크기는 36° 이다.

19 ① 한 내각의 크기가 140° 인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 140^\circ, 180^\circ \times n - 360^\circ = 140^\circ \times n$
 $40^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n = 9$, 즉 정구각형

다른 풀이
 한 외각의 크기는 $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$ 이므로
 $\frac{360^\circ}{n} = 40^\circ \quad \therefore n = 9$, 즉 정구각형

② 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는
 $9-3=6$ (개)
 ③ 대각선의 개수는 $\frac{9 \times (9-3)}{2} = 27$ (개)
 ④ 내각의 크기의 합은 $140^\circ \times 9 = 1260^\circ$
 ⑤ 한 외각의 크기는 $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$ 이므로
 $140^\circ : 40^\circ = 7 : 2$
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

20 (1) 정오각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ \text{이므로}$$

$$\angle B = 108^\circ$$


$\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\begin{aligned} \angle BAC &= \frac{1}{2} \times (180^\circ - 108^\circ) \\ &= 36^\circ \end{aligned}$$

(2) 같은 방법으로 하면

$$\triangle ADE \text{에서 } \angle DAE = 36^\circ$$

$$\begin{aligned} \therefore \angle x &= \angle BAE - \angle BAC - \angle DAE \\ &= 108^\circ - 36^\circ - 36^\circ \\ &= 36^\circ \end{aligned}$$



유제 2 (1단계) 한 외각의 크기가 18° 인 정다각형을 정 n 각형이라고

하면

$$\frac{360^\circ}{n} = 18^\circ \quad \therefore n = 20, \text{ 즉 정이십각형} \quad \dots (i)$$

(2단계) 따라서 정이십각형의 내각의 크기의 합은

$$180^\circ \times (20-2) = 3240^\circ \quad \dots (ii)$$

채점 기준	비율
(i) 한 외각의 크기가 18° 인 정다각형 구하기	50%
(ii) 정다각형의 내각의 크기의 합 구하기	50%

연습해 보자

1 $\triangle BAC$ 가 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle BCA = \angle BAC = \angle a$$

$$\therefore \angle DBC = \angle a + \angle a = 2\angle a \quad \dots (i)$$

$\triangle BCD$ 가 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로

$$\angle BDC = \angle DBC = 2\angle a \quad \dots (ii)$$

따라서 $\triangle DAC$ 에서 $\angle a + 2\angle a = 66^\circ$

$$3\angle a = 66^\circ \quad \therefore \angle a = 22^\circ \quad \dots (iii)$$

채점 기준	비율
(i) $\angle DBC$ 의 크기를 $\angle a$ 를 사용하여 나타내기	40%
(ii) $\angle BDC$ 의 크기를 $\angle a$ 를 사용하여 나타내기	30%
(iii) $\angle a$ 의 크기 구하기	30%

2 사각형 ABCD에서 내각의 크기의 합은 360° 이므로

$$\begin{aligned} \angle B + \angle C &= 360^\circ - (\angle A + \angle D) \\ &= 360^\circ - 150^\circ = 210^\circ \quad \dots (i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \angle IBC + \angle ICB &= \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) \\ &= \frac{1}{2} \times 210^\circ = 105^\circ \quad \dots (ii) \end{aligned}$$

따라서 $\triangle IBC$ 에서

$$\begin{aligned} \angle BIC &= 180^\circ - (\angle IBC + \angle ICB) \\ &= 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ \quad \dots (iii) \end{aligned}$$

채점 기준	비율
(i) $\angle B + \angle C$ 의 크기 구하기	40%
(ii) $\angle IBC + \angle ICB$ 의 크기 구하기	30%
(iii) $\angle BIC$ 의 크기 구하기	30%

3 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 15개인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면

$$n - 3 = 15 \quad \therefore n = 18 \quad \dots (i)$$

따라서 정십팔각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (18-2)}{18} = 160^\circ \quad \dots (ii)$$

채점 기준	비율
(i) 정다각형 구하기	50%
(ii) 정다각형의 한 내각의 크기 구하기	50%

STEP 3 **씩씩 서술형 완성하기** P. 72~73

〈과정은 풀이 참조〉

따라 해보자	유제 1 50°	유제 2 3240°
연습해 보자	1 22°	2 75°
	3 160°	4 105°

따라 해보자

유제 1 (1단계) $\angle ABD = \angle DBC = \angle a$,

$\angle ACD = \angle DCE = \angle b$ 라고 하면

$\triangle ABC$ 에서

$$2\angle b = \angle x + 2\angle a \text{이므로}$$

$$\angle b = \frac{1}{2}\angle x + \angle a \quad \dots \textcircled{1} \quad \dots (i)$$

(2단계) $\triangle DBC$ 에서

$$\angle b = 25^\circ + \angle a \quad \dots \textcircled{2} \quad \dots (ii)$$

(3단계) $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서 $\frac{1}{2}\angle x = 25^\circ$

$$\therefore \angle x = 50^\circ \quad \dots (iii)$$

채점 기준	비율
(i) $\triangle ABC$ 에서 식 세우기	40%
(ii) $\triangle DBC$ 에서 식 세우기	30%
(iii) $\angle x$ 의 크기 구하기	30%

4 정육각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (6-2)}{6} = 120^\circ,$$

정팔각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (8-2)}{8} = 135^\circ \text{이므로} \quad \dots (i)$$

위의 그림에서

$$120^\circ + \angle x + 135^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 105^\circ \quad \dots (ii)$$

다른 풀이

오른쪽 그림과 같이 두 정다각형이



붙어 있는 변의 연장선을 그으면

정육각형의 한 외각의 크기는

$$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ,$$

$$\text{정팔각형의 한 외각의 크기는 } \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ \text{이므로} \quad \dots (i)$$

$$\angle x = 60^\circ + 45^\circ = 105^\circ \quad \dots (ii)$$




채점 기준	비율
(i) 정육각형, 정팔각형의 한 내각(외각)의 크기 구하기	60 %
(ii) $\angle x$ 의 크기 구하기	40 %

답 ㄱ, ㄴ, ㄷ


서로 합동인 것을 겹치지 않게 번끼리 붙였을 때 평면을 빈틈 없이 채우려면 한 꼭짓점에 모인 정다각형의 내각의 크기의 합이 360° 이어야 한다. 즉, 360° 가 정다각형의 한 내각의 크기로 나누어떨어져야 한다.

ㄱ.




$$60^\circ \times 6 = 360^\circ$$

ㄴ.



$$90^\circ \times 4 = 360^\circ$$

ㄷ.



$$120^\circ \times 3 = 360^\circ$$


따라서 구하는 정다각형은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

참고 정다각형으로 평면을 빈틈없이 채우려면 360° 가 그 정다각형의 한 내각의 크기로 나누어떨어져야 한다. 즉, 정다각형의 한 내각의 크기가 360° 의 약수이어야 하므로 평면을 빈틈없이 채울 수 있는 정다각형은 정삼각형, 정사각형, 정육각형뿐이다.

1 원과 부채꼴

P. 78

필수 문제 1




1-1 ㄱ, ㄴ

- ㄴ. \widehat{BC} 에 대한 중심각은 $\angle BOC$ 이다.
- ㄷ. \widehat{AB} 와 \widehat{CD} 로 둘러싸인 도형은 활꼴이다.
- ㄹ. \widehat{AB} 와 두 반지름 OA, OB로 둘러싸인 도형은 부채꼴이다.

1-2 180°

한 원에서 부채꼴과 활꼴이 같을 때는 오른쪽 그림과 같이 활꼴의 현이 지름인 경우, 즉 부채꼴이 반원인 경우이므로 부채꼴의 중심각의 크기는 180°이다.



P. 79

필수 문제 2 (1) 16 (2) 100

- (1) $4 : x = 20^\circ : 80^\circ$
 $20x = 320 \quad \therefore x = 16$
- (2) $15 : 6 = x^\circ : 40^\circ$
 $6x = 600 \quad \therefore x = 100$

2-1 (1) 9 (2) 50

- (1) $3 : x = 40^\circ : 120^\circ$
 $40x = 360 \quad \therefore x = 9$
- (2) $12 : 30 = x^\circ : (2x^\circ + 25^\circ)$
 $30x = 12(2x + 25)$
 $30x = 24x + 300$
 $6x = 300 \quad \therefore x = 50$

2-2 150°

$\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$ 이므로
 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 4 : 5$
 $\therefore \angle AOC = 360^\circ \times \frac{5}{3+4+5}$
 $= 360^\circ \times \frac{5}{12} = 150^\circ$

P. 80

개념 확인 반지름, $\angle COD$, \equiv , SAS, \overline{CD}

필수 문제 3 (1) 8 (2) 35

- (1) $\angle AOB = \angle COD$ 이므로
 $\overline{CD} = \overline{AB} = 8 \text{ cm}$
 $\therefore x = 8$
- (2) $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이므로
 $\angle AOB = \angle COD = 35^\circ$
 $\therefore x = 35$

3-1 90°

$\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 이므로
 $\angle AOB = \angle COD = \angle DOE = 45^\circ$
 $\therefore \angle COE = \angle COD + \angle DOE$
 $= 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$

3-2 ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ㄹ. 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.


STEP

1 쏙쏙 개념 익히기

P. 81~82

- | | | | |
|-------|---------|--------|---------------------|
| 1 ④ | 2 10 cm | 3 40 | 4 9 cm ² |
| 5 80° | 6 30 cm | 7 ②, ④ | 8 36° |
| 9 ④ | | | |

- 1 ④ \widehat{AE} , \widehat{AE} 로 이루어진 활꼴은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같다.




- 2 원에서 길이가 가장 긴 현은 원의 지름이므로 그 길이는 $5 \times 2 = 10(\text{cm})$

- 3 $6 : 30 = x^\circ : 150^\circ, 30x = 900 \quad \therefore x = 30$
 $y : 30 = 50^\circ : 150^\circ, 150y = 1500 \quad \therefore y = 10$
 $\therefore x + y = 30 + 10 = 40$


4 부채꼴 AOB의 넓이를 $x \text{ cm}^2$ 라고 하면
 $27 : x = 90^\circ : 30^\circ$
 $90x = 810 \quad \therefore x = 9$
 따라서 부채꼴 AOB의 넓이는 9 cm^2 이다.

5 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 5 : 4$ 이므로
 $\angle AOB : \angle BOC = 5 : 4$
 이때 $\angle AOC = 180^\circ$ 이므로
 $\angle BOC = 180^\circ \times \frac{4}{5+4} = 180^\circ \times \frac{4}{9} = 80^\circ$


6 오른쪽 그림과 같이 \widehat{OC} 를 그으면
 $\widehat{AC} = \widehat{BC}$ 이므로 $\angle AOC = \angle BOC$
 즉, $\widehat{BC} = \widehat{AC} = 7 \text{ cm}$
 따라서 색칠한 부분의 둘레의 길이는
 $(8+7) \times 2 = 30(\text{cm})$




7 ② $\widehat{AB} = \widehat{ED} < 2\widehat{CD}$
 ④ $2 \times (\triangle ODC \text{의 넓이})$
 $= (\triangle ODC \text{의 넓이})$
 $+ (\triangle OCE \text{의 넓이})$
 $= (\triangle ODE \text{의 넓이})$
 $+ (\triangle EDC \text{의 넓이})$
 $= (\triangle OAB \text{의 넓이}) + (\triangle EDC \text{의 넓이})$
 $\therefore (\triangle OAB \text{의 넓이}) < 2 \times (\triangle ODC \text{의 넓이})$



8 $\widehat{AO} \parallel \widehat{BC}$ 이므로
 $\angle OBC = \angle AOB = \angle x$ (엇각)
 이때 $\triangle OBC$ 가 $\widehat{OB} = \widehat{OC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle OCB = \angle OBC = \angle x$
 또 $\widehat{BC} = 3\widehat{AB}$ 이므로
 $\angle BOC = 3\angle AOB = 3\angle x$
 따라서 $\triangle OBC$ 에서
 $3\angle x + \angle x + \angle x = 180^\circ$
 $5\angle x = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 36^\circ$



9 $\widehat{OC} \parallel \widehat{AB}$ 이므로
 $\angle OBA = \angle COB = \angle x$ (엇각)
 이때 $\triangle OAB$ 가 $\widehat{OA} = \widehat{OB}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle OAB = \angle OBA = \angle x$
 또 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 2 : 1$ 이므로
 $\angle AOB : \angle BOC = 2 : 1 \quad \therefore \angle AOB = 2\angle x$
 따라서 $\triangle OAB$ 에서
 $2\angle x + \angle x + \angle x = 180^\circ$
 $4\angle x = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 45^\circ$



2 부채꼴의 호의 길이와 넓이

P. 83

필수 문제 1 (1) $8\pi \text{ cm}$, $16\pi \text{ cm}^2$ (2) $14\pi \text{ cm}$, $21\pi \text{ cm}^2$

- (1) 반지름의 길이가 4 cm 이므로
 (원의 둘레의 길이) $= 2\pi \times 4 = 8\pi(\text{cm})$
 (원의 넓이) $= \pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$
 (2) (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= 2\pi \times 5 + 2\pi \times 2$
 $= 14\pi(\text{cm})$
 (색칠한 부분의 넓이) $= \pi \times 5^2 - \pi \times 2^2$
 $= 21\pi(\text{cm}^2)$

1-1 (1) $(5\pi + 10) \text{ cm}$, $\frac{25}{2}\pi \text{ cm}^2$ (2) $18\pi \text{ cm}$, $27\pi \text{ cm}^2$

- (1) 반지름의 길이가 5 cm 이므로
 (반원의 둘레의 길이) $= (2\pi \times 5) \times \frac{1}{2} + 10$
 $= 5\pi + 10(\text{cm})$
 (반원의 넓이) $= (\pi \times 5^2) \times \frac{1}{2} = \frac{25}{2}\pi(\text{cm}^2)$
 (2) (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= 2\pi \times 6 + 2\pi \times 3$
 $= 18\pi(\text{cm})$
 (색칠한 부분의 넓이) $= \pi \times 6^2 - \pi \times 3^2$
 $= 27\pi(\text{cm}^2)$

P. 84

개념 확인 (1) 4, 45, π (2) 4, 45, 2π

필수 문제 2 (1) $5\pi \text{ cm}$, $15\pi \text{ cm}^2$ (2) $12\pi \text{ cm}$, $54\pi \text{ cm}^2$


- (1) (호의 길이) $= 2\pi \times 6 \times \frac{150}{360} = 5\pi(\text{cm})$
 (넓이) $= \pi \times 6^2 \times \frac{150}{360} = 15\pi(\text{cm}^2)$
 (2) (호의 길이) $= 2\pi \times 9 \times \frac{240}{360} = 12\pi(\text{cm})$
 (넓이) $= \pi \times 9^2 \times \frac{240}{360} = 54\pi(\text{cm}^2)$

2-1 $2\pi \text{ cm}$, $12\pi \text{ cm}^2$

- (호의 길이) $= 2\pi \times 12 \times \frac{30}{360} = 2\pi(\text{cm})$
 (넓이) $= \pi \times 12^2 \times \frac{30}{360} = 12\pi(\text{cm}^2)$


2-2 (1) $(4\pi + 8) \text{ cm}$, $8\pi \text{ cm}^2$

- (2) $(3\pi + 12) \text{ cm}$, $(36 - 9\pi) \text{ cm}^2$
 (1) (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= 2\pi \times 8 \times \frac{60}{360} + 2\pi \times 4 \times \frac{60}{360} + 4 \times 2$
 $= \frac{8}{3}\pi + \frac{4}{3}\pi + 8 = 4\pi + 8(\text{cm})$



$$\begin{aligned} \therefore (\text{색칠한 부분의 넓이}) &= \pi \times 8^2 \times \frac{60}{360} - \pi \times 4^2 \times \frac{60}{360} \\ &= \frac{32}{3}\pi - \frac{8}{3}\pi = 8\pi (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{색칠한 부분의 둘레의 길이}) &= 2\pi \times 6 \times \frac{90}{360} + 6 + 6 \\ &= 3\pi + 12 (\text{cm}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \therefore (\text{색칠한 부분의 넓이}) &= 6 \times 6 - \pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} \\ &= 36 - 9\pi (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

P. 85

개념 확인 $2\pi, 6\pi$

필수 문제 3 (1) $10\pi \text{ cm}^2$ (2) $40\pi \text{ cm}^2$

$$(1) (\text{부채꼴의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 5 \times 4\pi = 10\pi (\text{cm}^2)$$

$$(2) (\text{부채꼴의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 8 \times 10\pi = 40\pi (\text{cm}^2)$$

3-1 (1) $6\pi \text{ cm}^2$ (2) $120\pi \text{ cm}^2$

$$(1) (\text{부채꼴의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 4 \times 3\pi = 6\pi (\text{cm}^2)$$

$$(2) (\text{부채꼴의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 12 \times 20\pi = 120\pi (\text{cm}^2)$$

3-2 $5\pi \text{ cm}$

부채꼴의 호의 길이를 $l \text{ cm}$ 라고 하면

$$\frac{1}{2} \times 6 \times l = 15\pi, 3l = 15\pi \quad \therefore l = 5\pi$$

따라서 부채꼴의 호의 길이는 $5\pi \text{ cm}$ 이다.

STEP

쓱쓱 개념 익히기

P. 87~88

1 (1) 7 cm (2) $9\pi \text{ cm}^2$

2 (1) $24\pi \text{ cm}, 18\pi \text{ cm}^2$ (2) $(4\pi + 8) \text{ cm}, (16 - 4\pi) \text{ cm}^2$

3 $\frac{10}{3}\pi \text{ cm}, \frac{25}{3}\pi \text{ cm}^2$ **4** ③ **5** $30\pi \text{ cm}^2$

6 (1) 12 cm (2) 225°

7 (1) $\frac{160}{3}\pi \text{ cm}^2$ (2) $(\pi - 2) \text{ cm}^2$

8 $6\pi \text{ cm}, (18\pi - 36) \text{ cm}^2$

9 $32\pi \text{ cm}^2$ **10** 450 cm^2

1 (1) 원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면

$$2\pi r = 14\pi \quad \therefore r = 7$$

따라서 원의 반지름의 길이는 7 cm 이다.

(2) 원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면

$$2\pi r = 6\pi \quad \therefore r = 3$$

따라서 원의 반지름의 길이는 3 cm 이므로

$$\text{원의 넓이는 } \pi \times 3^2 = 9\pi (\text{cm}^2)$$

2 (1) (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= 2\pi \times 6 + (2\pi \times 3) \times 2$
 $= 24\pi (\text{cm})$

$$\begin{aligned} (\text{색칠한 부분의 넓이}) &= \pi \times 6^2 - (\pi \times 3^2) \times 2 \\ &= 18\pi (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

(2) (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= 2\pi \times 2 + 4 \times 2$
 $= 4\pi + 8 (\text{cm})$

$$\begin{aligned} (\text{색칠한 부분의 넓이}) &= 4 \times 4 - \left\{ (\pi \times 2^2) \times \frac{1}{2} \right\} \times 2 \\ &= 16 - 4\pi (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

3 (호의 길이) $= 2\pi \times 5 \times \frac{120}{360} = \frac{10}{3}\pi (\text{cm})$

$$(\text{넓이}) = \pi \times 5^2 \times \frac{120}{360} = \frac{25}{3}\pi (\text{cm}^2)$$

4 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면

$$2\pi \times 24 \times \frac{x}{360} = 10\pi \quad \therefore x = 75$$

따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 75° 이다.

5 (부채꼴의 넓이) $= \frac{1}{2} \times 6 \times 10\pi = 30\pi (\text{cm}^2)$

6 (1) 부채꼴의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면

$$\frac{1}{2} \times r \times 15\pi = 90\pi \quad \therefore r = 12$$


따라서 부채꼴의 반지름의 길이는 12 cm 이다.

(2) 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면

$$2\pi \times 12 \times \frac{x}{360} = 15\pi \quad \therefore x = 225$$

따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 225° 이다.


7 (1) (색칠한 부분의 넓이) $= \pi \times 12^2 \times \frac{150}{360} - \pi \times 4^2 \times \frac{150}{360}$
 $= 60\pi - \frac{20}{3}\pi$
 $= \frac{160}{3}\pi (\text{cm}^2)$




$$\begin{aligned} \therefore (\text{색칠한 부분의 넓이}) &= \pi \times 2^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \\ &= \pi - 2 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

8 (색칠한 부분의 둘레의 길이) = $(2\pi \times 6 \times \frac{90}{360}) \times 2$
 $= 6\pi(\text{cm})$


오른쪽 그림과 같이 보조선을 그으면
 (색칠한 부분의 넓이)
 = (두 활꼴의 넓이의 합)
 $= (\pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 6 \times 6) \times 2$
 $= 18\pi - 36(\text{cm}^2)$




9 오른쪽 그림과 같이 색칠한 부분을 이동하면
 (색칠한 부분의 넓이)
 = (반원의 넓이)
 $= (\pi \times 8^2) \times \frac{1}{2} = 32\pi(\text{cm}^2)$



10 오른쪽 그림과 같이 색칠한 부분을 이동하면
 (색칠한 부분의 넓이)
 = (직각삼각형의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times 30 \times 30 = 450(\text{cm}^2)$



4 $\overline{AO} \parallel \overline{BC}$ 이므로
 $\angle OBC = \angle AOB = 50^\circ$ (엇각)
 이때 $\triangle OBC$ 가 $\overline{OB} = \overline{OC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle OCB = \angle OBC = 50^\circ$
 $\therefore \angle BOC = 180^\circ - (50^\circ + 50^\circ) = 80^\circ$
 $10 : \widehat{BC} = 50^\circ : 80^\circ$ 이므로
 $50\widehat{BC} = 800 \quad \therefore \widehat{BC} = 16(\text{cm})$




5 $\triangle DPO$ 가 $\overline{OD} = \overline{DP}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle DOP = \angle DPO = 25^\circ$
 $\therefore \angle ODC = \angle DOP + \angle DPO = 25^\circ + 25^\circ = 50^\circ$
 $\triangle OCD$ 가 $\overline{OC} = \overline{OD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle OCD = \angle ODC = 50^\circ$
 $\triangle OCP$ 에서
 $\angle AOC = \angle OCP + \angle OPC = 50^\circ + 25^\circ = 75^\circ$
 따라서 $\widehat{AC} : 6 = 75^\circ : 25^\circ$ 이므로
 $25\widehat{AC} = 450 \quad \therefore \widehat{AC} = 18(\text{cm})$

6 $6 : 18 = x^\circ : (2x^\circ + 30^\circ)$, $18x = 6(2x + 30)$
 $18x = 12x + 180$, $6x = 180 \quad \therefore x = 30$

7 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로
 (부채꼴 AOB의 넓이) = $144\pi \times \frac{6}{6+5+7}$
 $= 144\pi \times \frac{1}{3} = 48\pi(\text{cm}^2)$

8 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이므로 $\angle CAO = \angle DOB$ (동위각)
 오른쪽 그림과 같이 \overline{OC} 를 그으면
 $\triangle AOC$ 가 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle OCA = \angle OAC$
 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이므로
 $\angle COD = \angle OCA$ (엇각)
 따라서 $\angle BOD = \angle COD$ 이므로
 $\overline{BD} = \overline{CD} = 10 \text{ cm}$



9 ① 부채꼴의 넓이는 현의 길이에 정비례하지 않는다.
 ③ 크기가 같은 중심각에 대한 호의 길이와 현의 길이는 각각 같다.

10 (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= (2\pi \times 6) \times \frac{1}{2} + (2\pi \times 4) \times \frac{1}{2} + (2\pi \times 2) \times \frac{1}{2}$
 $= 6\pi + 4\pi + 2\pi = 12\pi(\text{cm})$
 (색칠한 부분의 넓이)
 $= (\pi \times 6^2) \times \frac{1}{2} - (\pi \times 4^2) \times \frac{1}{2} + (\pi \times 2^2) \times \frac{1}{2}$
 $= 18\pi - 8\pi + 2\pi = 12\pi(\text{cm}^2)$

STEP

2 탄탄 단원 다지기

P. 89~91

- | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----|
| 1 ③, ⑤ | 2 60° | 3 27 cm | 4 ③ | 5 ④ |
| 6 30 | 7 48π cm² | 8 ⑤ | 9 ①, ③ | |
| 10 12π cm, 12π cm² | 11 ④ | 12 ⑤ | | |
| 13 ④ | 14 ② | 15 (200π - 400) cm² | | |
| 16 (36 - 6π) cm² | 17 9π cm, (9π - 18) cm² | | | |
| 18 18π cm² | 19 ① | | | |


- 1 ① 반원은 활꼴이다.
 ② 원 위의 두 점을 이은 선분은 현이다.
 ④ 원에서 길이가 가장 긴 현은 원의 지름이므로 그 길이는 $3 \times 2 = 6(\text{cm})$
 따라서 옳은 것은 ③, ⑤이다.
- 2 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{AB}$ 이므로 $\triangle OAB$ 는 정삼각형이다.
 \therefore (호 AB에 대한 중심각의 크기) = $\angle AOB = 60^\circ$
- 3 $\angle COD = 180^\circ - (40^\circ + 20^\circ) = 120^\circ$ 이므로
 $9 : \widehat{CD} = 40^\circ : 120^\circ$, $40\widehat{CD} = 1080$
 $\therefore \widehat{CD} = 27(\text{cm})$

11 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면
 $\pi \times 8^2 \times \frac{x}{360} = \frac{64}{3}\pi \quad \therefore x=120$
 따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 120° 이다.

12 부채꼴의 호의 길이를 l cm라고 하면
 $\frac{1}{2} \times 9 \times l = 27\pi \quad \therefore l=6\pi$
 따라서 부채꼴의 호의 길이는 6π cm이므로
 (부채꼴의 둘레의 길이) = $6\pi + 9 + 9 = 6\pi + 18$ (cm)

13 정오각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$
 \therefore (색칠한 부분의 둘레의 길이) = $2\pi \times 20 \times \frac{108}{360} + 20 \times 3$
 $= 12\pi + 60$ (cm)


14 (색칠한 부분의 넓이) = $\pi \times 8^2 \times \frac{90}{360} - (\pi \times 4^2) \times \frac{1}{2}$
 $= 16\pi - 8\pi = 8\pi$ (cm²)



\therefore (색칠한 부분의 넓이)
 $= \left(\pi \times 10^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 10 \times 10 \right) \times 8$
 $= (25\pi - 50) \times 8 = 200\pi - 400$ (cm²)


16 $\overline{BE} = \overline{EC} = \overline{BC}$ (원의 반지름)이므로 $\triangle EBC$ 는 정삼각형이다.
 즉, $\angle EBC = 60^\circ$ 이므로 $\angle ABE = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$
 \therefore (색칠한 부분의 넓이)
 $=$ (사각형 ABCD의 넓이) - (부채꼴 ABE의 넓이) $\times 2$
 $= 6 \times 6 - \left(\pi \times 6^2 \times \frac{30}{360} \right) \times 2$
 $= 36 - 6\pi$ (cm²)

17 (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= 2\pi \times 6 \times \frac{90}{360} + \left\{ (2\pi \times 3) \times \frac{1}{2} \right\} \times 2$
 $= 3\pi + 6\pi = 9\pi$ (cm)
 오른쪽 그림과 같이 도형을 이동시키면 색칠한 부분의 넓이는 활꼴의 넓이와 같으므로
 (색칠한 부분의 넓이)
 $= \pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 6 \times 6$
 $= 9\pi - 18$ (cm²)



18
 \therefore (색칠한 부분의 넓이)
 $=$ (부채꼴 B'AB의 넓이)
 $= \pi \times 12^2 \times \frac{45}{360}$
 $= 18\pi$ (cm²)

19 오른쪽 그림과 같이 점 A가 움직인 거리는 반지름의 길이가 12, 중심각의 크기가 120° 인 부채꼴의 호의 길이와 같으므로
 (점 A가 움직인 거리)
 $= 2\pi \times 12 \times \frac{120}{360}$
 $= 8\pi$



STEP 3 쓱쓱 서술형 완성하기 P. 92~93

(과정은 풀이 참조)

따라 해보자 **유제 1** 160° **유제 2** $(6\pi + 16)$ cm

연습해 보자 **1** 28 cm **2** $\frac{27}{2}\pi$ cm²

3 6 cm² **4** 113π m²

따라 해보자

유제 1 **1단계** 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하고
 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 3 : 4$ 이므로
 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 2 : 3 : 4 \quad \dots (i)$

2단계 $\angle AOC = 360^\circ \times \frac{4}{2+3+4}$
 $= 360^\circ \times \frac{4}{9} = 160^\circ \quad \dots (ii)$

채점 기준	비율
(i) $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내기	50%
(ii) $\angle AOC$ 의 크기 구하기	50%

유제 2 **1단계** (큰 부채꼴의 호의 길이)
 $= 2\pi \times (8+8) \times \frac{45}{360}$
 $= 4\pi$ (cm) $\dots (i)$


2단계 (작은 부채꼴의 호의 길이)
 $= 2\pi \times 8 \times \frac{45}{360}$
 $= 2\pi$ (cm) ... (ii)

3단계 (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= 4\pi + 2\pi + 8 \times 2$
 $= 6\pi + 16$ (cm) ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 큰 부채꼴의 호의 길이 구하기	40%
(ii) 작은 부채꼴의 호의 길이 구하기	40%
(iii) 색칠한 부분의 둘레의 길이 구하기	20%

연습해 보자

1 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이므로
 $\angle OAC = \angle BOD = 20^\circ$ (동위각) ... (i)
 오른쪽 그림과 같이 \overline{OC} 를 그으면
 $\triangle AOC$ 가 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle OCA = \angle OAC = 20^\circ$... (ii)
 $\therefore \angle AOC = 180^\circ - (20^\circ + 20^\circ)$
 $= 140^\circ$... (iii)
 따라서 $\widehat{AC} : 4 = 140^\circ : 20^\circ$ 이므로
 $20\widehat{AC} = 560 \quad \therefore \widehat{AC} = 28$ (cm) ... (iv)



채점 기준	비율
(i) $\angle OAC$ 의 크기 구하기	20%
(ii) $\angle OCA$ 의 크기 구하기	20%
(iii) $\angle AOC$ 의 크기 구하기	20%
(iv) \widehat{AC} 의 길이 구하기	40%

2 부채꼴의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
 $2\pi r \times \frac{60}{360} = 3\pi \quad \therefore r = 9$
 따라서 부채꼴의 반지름의 길이가 9 cm이므로 ... (i)
 부채꼴의 넓이는
 $\pi \times 9^2 \times \frac{60}{360} = \frac{27}{2}\pi$ (cm²) ... (ii)

다른 풀이


부채꼴의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
 $2\pi r \times \frac{60}{360} = 3\pi \quad \therefore r = 9$
 따라서 부채꼴의 반지름의 길이가 9 cm이므로 ... (i)
 부채꼴의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 9 \times 3\pi = \frac{27}{2}\pi$ (cm²) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 부채꼴의 반지름의 길이 구하기	60%
(ii) 부채꼴의 넓이 구하기	40%

3 ... (i)
 $= \left\{ \pi \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 \right\} \times \frac{1}{2} + (\pi \times 2^2) \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 3 \times 4$
 $- \left\{ \pi \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 \right\} \times \frac{1}{2}$... (i)
 $= \frac{9}{8}\pi + 2\pi + 6 - \frac{25}{8}\pi = 6$ (cm²) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 색칠한 부분의 넓이를 구하는 식 세우기	75%
(ii) 색칠한 부분의 넓이 구하기	25%

4 강아지가 울타리 밖에서 최대한 움직일 수 있는 영역은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같다.
 따라서 구하는 넓이는
 $\pi \times 2^2 \times \frac{90}{360} + \pi \times 12^2 \times \frac{270}{360}$
 $+ \pi \times 4^2 \times \frac{90}{360}$... (i)
 $= \pi + 108\pi + 4\pi = 113\pi$ (m²) ... (ii)



채점 기준	비율
(i) 식 세우기	70%
(ii) 답 구하기	30%

스포츠 속 수학

P. 94

답 540π m²
 (색칠한 부분의 넓이)
 $=$ (반지름의 길이가 44 m이고 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 넓이)
 $-$ (반지름의 길이가 24 m이고 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 넓이)
 $+$ (반지름의 길이가 84 m이고 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 넓이)
 $-$ (반지름의 길이가 64 m이고 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 넓이)
 $= \pi \times 44^2 \times \frac{45}{360} - \pi \times 24^2 \times \frac{45}{360} + \pi \times 84^2 \times \frac{45}{360}$
 $- \pi \times 64^2 \times \frac{45}{360}$
 $= 242\pi - 72\pi + 882\pi - 512\pi$
 $= 540\pi$ (m²)

1 다면체

P. 98

필수 문제 1 가, 다, 르

나, 모. 다각형이 아닌 원이나 곡면으로 둘러싸여 있다.
따라서 다면체는 가, 다, 르이다.

1-1 ④

④ 모서리의 개수는 9개이다.

1-2 칠면체

주어진 다면체는 면의 개수가 7개이므로 칠면체이다.

P. 99

개념 확인

겨냥도			
이름	오각기둥	오각뿔	오각뿔대
옆면의 모양	직사각형	삼각형	사다리꼴
꼭짓점의 개수	10개	6개	10개
모서리의 개수	15개	10개	15개
면의 개수	7개	6개	7개

필수 문제 2 ④

면의 개수는 각각 다음과 같다.

- ① 삼각뿔대: 5개 $3 + 2$
- ② 오각기둥: 7개 $5 + 2$
- ③ 직육면체: 6개 6
- ④ 칠각뿔: 8개 $7 + 1$
- ⑤ 오각뿔대: 7개 $5 + 2$

따라서 면의 개수가 가장 많은 것은 ④이다.

2-1 ③

주어진 다면체의 면의 개수와 꼭짓점의 개수를 각각 구하면 다음과 같다.

다면체	① 사각뿔대	② 육각기둥	③ 육각뿔	④ 팔각뿔대	⑤ 구각기둥
면의 개수	$4 + 2 = 6(\text{개})$	$6 + 2 = 8(\text{개})$	$6 + 1 = 7(\text{개})$	$8 + 2 = 10(\text{개})$	$9 + 2 = 11(\text{개})$
꼭짓점의 개수	$4 \times 2 = 8(\text{개})$	$6 \times 2 = 12(\text{개})$	$6 + 1 = 7(\text{개})$	$8 \times 2 = 16(\text{개})$	$9 \times 2 = 18(\text{개})$

따라서 면의 개수와 꼭짓점의 개수가 같은 것은 ③이다.

P. 100

STEP 1 **쑥쑥 개념 익히기**

1 5개 2 ①, ③ 3 ⑤
 4 (1) 각뿔대 (2) 육각뿔대 5 ②

1 다면체, 즉 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형은 가, 나, 르, 사, 오의 5개이다.

2 면의 개수는 각각 다음과 같다.
 ① 사각기둥: 6개 $4 + 2$ ② 오각기둥: 7개 $5 + 2$
 ③ 오각뿔: 6개 $5 + 1$ ④ 육각뿔: 7개 $6 + 1$
 ⑤ 육각뿔대: 8개 $6 + 2$
 따라서 육면체는 ①, ③이다.

3 ⑤ 오각뿔 - 삼각형

4 (1) (가)에서 두 밑면이 서로 평행한 입체도형은 각기둥, 각뿔대이고, (나)에서 옆면의 모양이 직사각형이 아닌 사다리꼴인 입체도형은 각뿔대이다.
 (2) (다)에서 팔면체이므로 각뿔대의 밑면 2개를 빼면 6개의 옆면을 가진다. 즉, 밑면의 모양이 육각형이므로 구하는 입체도형은 육각뿔대이다.

5 (가), (나)에서 주어진 다면체는 각기둥이므로 n 각기둥이라고 하면
 (다)에서 $2n = 14 \quad \therefore n = 7$
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 칠각기둥이다.

2 정다면체

P. 101

필수 문제 1 (1) 가, 다, 모 (2) 르
(3) 가, 나, 르 (4) 다

1-1 정팔면체

(가), (나)에서 모든 면이 합동인 정다각형이고 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같으므로 정다면체이다.

(가) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
 \Rightarrow 정사면체, 정팔면체, 정이십면체

(나) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 4개이다.
 \Rightarrow 정팔면체

따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 정팔면체이다.

2-1 원기둥

회전체에 수직인 평면으로 자른 단면이 원, 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면이 직사각형인 회전체는 원기둥이다.

2-2 ④

구는 어떤 방향으로 자르더라도 그 단면이 항상 원이다.

P. 107

개념 확인

(1) $a=9, b=4$ (2) $a=5, b=3$

- (1) a cm는 원기둥의 모선의 길이이므로 $a=9$
 b cm는 밑면인 원의 반지름의 길이이므로 $b=4$
- (2) a cm는 원뿔의 모선의 길이이므로 $a=5$
 b cm는 밑면인 원의 반지름의 길이이므로 $b=3$


필수 문제 3 $a=6, b=11, c=18\pi$

옆면의 아래쪽 호의 길이는 두 밑면 중 큰 원의 둘레의 길이와 같으므로
 $c=2\pi \times 9=18\pi$

3-1 10π cm

옆면인 부채꼴의 호의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같으므로
 (호의 길이) = $2\pi \times 5=10\pi$ (cm)


4 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같은 원뿔대이다.



이 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 윗변의 길이가 $3+3=6$ (cm), 아랫변의 길이가 $5+5=10$ (cm), 높이가 4 cm인 사다리꼴이므로

(단면의 넓이) = $\frac{1}{2} \times (6+10) \times 4=32$ (cm²)

참고 [그림 1]을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 [그림 2]와 같고, 이 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 [그림 3]과 같다.



[그림 1] [그림 2] [그림 3]

[그림 1]의 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times a \times b = \frac{1}{2}ab$

[그림 3]의 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2a \times b = ab$

\therefore (회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 넓이) = (회전시키기 전 평면도형의 넓이) $\times 2$


5 밑면인 원의 둘레의 길이는 직사각형의 가로 길기와 같으므로 밑면인 원의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
 $2\pi r=24\pi \quad \therefore r=12$
 따라서 밑면인 원의 반지름의 길이는 12 cm이다.

STEP 1 **쓱쓱 개념 익히기** P. 108


1 ③, ④ 2 ③ 3 ③ 4 32 cm²
 5 12 cm

1 ③, ④ 다면체

2 직각삼각형 ABC를 변 AB를 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 다음 그림과 같다.



3 ③ 원뿔대를 회전축에 수직인 평면으로 자르면 그 단면은 오른쪽 그림과 같이 모두 원이지만, 그 크기는 서로 다르므로 합동이 아니다.



STEP 2 **탄탄 단원 다지기** P. 109~111

1 ③ 2 10 3 ③ 4 ④ 5 십각뿔
 6 ②, ④ 7 정이십면체 8 ②, ④ 9 ④
 10 ③ 11 ③ 12 ② 13 ④ 14 ⑤
 15 16π cm² 16 ③ 17 $\frac{8}{3}$ cm 18 ①, ③

1 면의 개수는 각각 다음과 같다.

- ① 사각뿔대: 6개 \Rightarrow 육면체
 $4 + 2$
- ② 칠각기둥: 9개 \Rightarrow 구면체
 $7 + 2$
- ③ 구각뿔: 10개 \Rightarrow 십면체
 $9 + 1$
- ④ 팔각기둥: 10개 \Rightarrow 십면체
 $8 + 2$
- ⑤ 십각뿔대: 12개 \Rightarrow 십이면체
 $10 + 2$

따라서 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은 ③이다.

2 사각기둥의 모서리의 개수는 $4 \times 3 = 12$ (개)이므로 $a = 12$
 오각뿔의 꼭짓점의 개수는 $5 + 1 = 6$ (개)이므로 $b = 6$
 육각뿔대의 면의 개수는 $6 + 2 = 8$ (개)이므로 $c = 8$
 $\therefore a + b - c = 12 + 6 - 8 = 10$

3 ① 사각뿔 - 삼각형 ② 삼각뿔대 - 사다리꼴
 ④ 오각기둥 - 직사각형 ⑤ 사각뿔대 - 사다리꼴
 따라서 바르게 짝 지은 것은 ③이다.

4 나. 팔각뿔의 모서리의 개수는 $8 \times 2 = 16$ (개)이다.
 다. 각뿔대의 두 밑면은 서로 평행하지만 합동은 아니다.
 따라서 옳은 것은 가, 다, 라이다.


5 (가), (나)에서 주어진 다면체는 각뿔이므로 n 각뿔이라고 하면
 (다)에서 $2n = 20 \quad \therefore n = 10$
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 십각뿔이다.

6 ② 정육면체의 면의 모양은 정사각형이다.
 ④ 정십이면체의 면의 모양은 정오각형이다.

7 (가), (나)에서 구하는 다면체는 정다면체이다.
 (나) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
 \Rightarrow 정사면체, 정팔면체, 정이십면체
 (다) 모서리의 개수는 30개이다.
 \Rightarrow 정십이면체, 정이십면체
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 정이십면체이다.


8 ② 정다면체의 면의 모양은 정삼각형, 정사각형, 정오각형뿐
 이다.
 ④ 정팔면체의 모서리의 개수는 12개이다.

9 주어진 전개도로 만들어지는 정다면체는 오른쪽 그림과 같은 정팔
 면체이다.
 이때 \overline{AJ} 와 꼬인 위치에 있는 모
 서리는 \overline{BC} (또는 \overline{HG}),
 \overline{CD} (또는 \overline{GF}), \overline{BE} (또는 \overline{HE}),
 \overline{DE} (또는 \overline{FE})이다.




10 주어진 전개도로 만들어지는 정다면체는 정십이면체이다.
 ③ 정팔면체의 모서리의 개수는 12개이고, 정십이면체의 모
 서리의 개수는 30개이다.


11 ③ 옆면의 모양이 직사각형인 입체도형: 가, 다




13 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자르면 그 단면의 경계
 는 항상 원이다.



15 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로
 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽
 그림과 같고 회전축에 수직인 평면으로
 자른 단면은 원이 된다.
 따라서 넓이가 가장 작은 단면은 반지름의
 길이가 4cm인 원이므로 그 넓이는
 $\pi \times 4^2 = 16\pi$ (cm^2)




16 변 BC를 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는
 회전체는 오른쪽 그림과 같다.
 따라서 이 회전체를 회전축을 포함하는 평면
 으로 자른 단면의 모양은 네 변의 길이가 같은
 사각형인 마름모이다.



17 원뿔대의 두 밑면 중 큰 원의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
 $2\pi \times 8 \times \frac{120}{360} = 2\pi r \quad \therefore r = \frac{8}{3}$
 따라서 큰 원의 반지름의 길이는 $\frac{8}{3}$ cm이다.

18 ①, ② 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 경
 계는 항상 원이지만 단면이 항상 합동인 것은 아니다.
 ③ 다음 그림과 같이 원뿔이 아닐 수도 있다.



⑤ 구의 중심을 지나는 직선은 모두 구의 회전축이 될 수 있다.
 따라서 옳지 않은 것은 ①, ③이다.

STEP 3 **씩씩 서술형 완성하기** P. 112~113

(과정은 풀이 참조)

따라 해보자	유제 1	50	유제 2	$\frac{16}{9}\pi \text{ cm}^2$
연습해 보자	1	육면체	2	36
	3	그림은 풀이 참조,		$21\pi \text{ cm}^2$
	4	$(20\pi + 14) \text{ cm}$		

따라 해보자

유제 1 [1단계] 꼭짓점의 개수가 24개인 각기둥을 n 각기둥이라고 하면

$$2n=24 \quad \therefore n=12, \text{ 즉 십이각기둥} \quad \dots (i)$$

[2단계] 십이각기둥의 면의 개수는 $12+2=14$ (개)이고, 모서리의 개수는 $12 \times 3=36$ (개)이므로

$$a=14, b=36 \quad \dots (ii)$$

[3단계] $a+b=14+36=50 \quad \dots (iii)$

채점 기준	비율
(i) 각기둥 구하기	40%
(ii) a, b 의 값 구하기	40%
(iii) $a+b$ 의 값 구하기	20%

유제 2 [1단계] 밑면인 원의 반지름의 길이를 r cm라고 하면 (부채꼴의 호의 길이)=(밑면인 원의 둘레의 길이)이므로

$$2\pi \times 8 \times \frac{60}{360} = 2\pi r$$

$$\frac{8}{3}\pi = 2\pi r \quad \therefore r = \frac{4}{3}$$

따라서 밑면인 원의 반지름의 길이는 $\frac{4}{3}$ cm이다. $\dots (i)$

[2단계] 전개도로 만든 원뿔의 밑면인 원의 넓이는 $\pi \times \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}\pi$ (cm²) $\dots (ii)$

채점 기준	비율
(i) 밑면인 원의 반지름의 길이 구하기	60%
(ii) 밑면인 원의 넓이 구하기	40%

연습해 보자


1 (나), (다)에서 주어진 다면체는 각뿔이다. 구하는 각뿔을 n 각뿔이라고 하면 밑면은 n 각형이므로 $\frac{n(n-3)}{2}=5, n(n-3)=10=5 \times 2$
 $\therefore n=5$, 즉 오각뿔 $\dots (i)$
 따라서 오각뿔의 면의 개수는 $5+1=6$ (개)이므로 육면체이다. $\dots (ii)$

채점 기준	비율
(i) 조건을 모두 만족시키는 다면체 구하기	70%
(ii) 조건을 모두 만족시키는 다면체는 몇 면체인지 구하기	30%

2 한 꼭짓점에 모인 면의 개수가 4개인 정다면체는 정팔면체이고, 정팔면체의 꼭짓점의 개수는 6개이므로 $x=6 \quad \dots (i)$
 면의 모양이 정오각형인 정다면체는 정십이면체이고, 정십이면체의 모서리의 개수는 30개이므로 $y=30 \quad \dots (ii)$
 $\therefore x+y=6+30=36 \quad \dots (iii)$


채점 기준	비율
(i) x 의 값 구하기	40%
(ii) y 의 값 구하기	40%
(iii) $x+y$ 의 값 구하기	20%

3 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 모양은 오른쪽 그림과 같다. $\dots (i)$
 \therefore (단면의 넓이) $= \pi \times 5^2 - \pi \times 2^2$
 $= 25\pi - 4\pi$
 $= 21\pi$ (cm²) $\dots (ii)$



채점 기준	비율
(i) 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 모양 그리기	50%
(ii) (i)의 단면의 넓이 구하기	50%

4 원뿔대의 전개도는 오른쪽 그림과 같으므로 작은 원의 둘레의 길이는 $2\pi \times 4 = 8\pi$ (cm) $\dots (i)$



큰 원의 둘레의 길이는 $2\pi \times 6 = 12\pi$ (cm) $\dots (ii)$
 따라서 옆면을 만드는 데 사용된 종이의 둘레의 길이는 $8\pi + 12\pi + 7 \times 2 = 20\pi + 14$ (cm) $\dots (iii)$

채점 기준	비율
(i) 전개도에서 작은 원의 둘레의 길이 구하기	40%
(ii) 전개도에서 큰 원의 둘레의 길이 구하기	40%
(iii) 옆면을 만드는 데 사용된 종이의 둘레의 길이 구하기	20%

역사 속 수학

P. 114

답 정육면체

정다면체의 각 면의 한가운데에 있는 점을 꼭짓점으로 하는 정다면체는 처음 정다면체의 면의 개수만큼 꼭짓점을 가진다. 따라서 구하는 정다면체는 꼭짓점의 개수가 정팔면체의 면의 개수와 같이 8개인 정육면체이다.

참고 정다면체의 각 면의 한가운데에 있는 점을 꼭짓점으로 하는 정다면체는 다음과 같다.

- ① 정사면체 \Leftrightarrow 정사면체 ② 정육면체 \Leftrightarrow 정팔면체
- ③ 정팔면체 \Leftrightarrow 정육면체 ④ 정십이면체 \Leftrightarrow 정이십면체
- ⑤ 정이십면체 \Leftrightarrow 정십이면체

1 기둥의 겹넓이와 부피

P. 118

- 개념 확인** (1) ㉠ 4 ㉡ 10 ㉢ 8π (2) $16\pi \text{ cm}^2$
 (3) $80\pi \text{ cm}^2$ (4) $112\pi \text{ cm}^2$
- (1) ㉢ $2\pi \times 4 = 8\pi$
 (2) (밑넓이) $= \pi \times 4^2 = 16\pi (\text{cm}^2)$
 (3) (옆넓이) $= 8\pi \times 10 = 80\pi (\text{cm}^2)$
 (4) (겉넓이) $= 16\pi \times 2 + 80\pi = 112\pi (\text{cm}^2)$

- 필수 문제 1** (1) 78 cm^2 (2) $54\pi \text{ cm}^2$
- (1) (밑넓이) $= 3 \times 3 = 9 (\text{cm}^2)$
 (옆넓이) $= (3+3+3+3) \times 5 = 60 (\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) $= 9 \times 2 + 60 = 78 (\text{cm}^2)$
- (2) (밑넓이) $= \pi \times 3^2 = 9\pi (\text{cm}^2)$
 (옆넓이) $= (2\pi \times 3) \times 6 = 36\pi (\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) $= 9\pi \times 2 + 36\pi = 54\pi (\text{cm}^2)$

- 1-1** (1) 360 cm^2 (2) 296 cm^2
- (1) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30 (\text{cm}^2)$
 (옆넓이) $= (5+12+13) \times 10 = 300 (\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) $= 30 \times 2 + 300 = 360 (\text{cm}^2)$
- (2) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times (6+12) \times 4 = 36 (\text{cm}^2)$
 (옆넓이) $= (6+5+12+5) \times 8 = 224 (\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) $= 36 \times 2 + 224 = 296 (\text{cm}^2)$

P. 119


- 개념 확인** (1) $4\pi \text{ cm}^2$ (2) 4 cm (3) $16\pi \text{ cm}^3$
- (1) (밑넓이) $= \pi \times 2^2 = 4\pi (\text{cm}^2)$
 (2) (높이) = 4 cm
 (3) (부피) $= 4\pi \times 4 = 16\pi (\text{cm}^3)$

- 필수 문제 2** (1) 240 cm^3 (2) 336 cm^3 (3) $72\pi \text{ cm}^3$
- (1) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24 (\text{cm}^2)$
 (높이) = 10 cm
 \therefore (부피) $= 24 \times 10 = 240 (\text{cm}^3)$
- (2) (밑넓이) $= 6 \times 7 = 42 (\text{cm}^2)$
 (높이) = 8 cm
 \therefore (부피) $= 42 \times 8 = 336 (\text{cm}^3)$
- (3) (밑넓이) $= \pi \times 3^2 = 9\pi (\text{cm}^2)$
 (높이) = 8 cm
 \therefore (부피) $= 9\pi \times 8 = 72\pi (\text{cm}^3)$

- 2-1** $60\pi \text{ cm}^3$
- (큰 원기둥의 부피) $= (\pi \times 4^2) \times 5 = 80\pi (\text{cm}^3)$
 (작은 원기둥의 부피) $= (\pi \times 2^2) \times 5 = 20\pi (\text{cm}^3)$
 \therefore (구멍이 뚫린 원기둥의 부피)
 $=$ (큰 원기둥의 부피) $-$ (작은 원기둥의 부피)
 $= 80\pi - 20\pi = 60\pi (\text{cm}^3)$

다른 풀이

주어진 입체도형에서 밑면은 오른쪽 그림의 색칠한 부분과 같으므로
 (부피) $=$ (밑넓이) \times (높이)
 $= (\pi \times 4^2 - \pi \times 2^2) \times 5$
 $= 60\pi (\text{cm}^3)$



STEP 1 **쓱쓱 개념 익히기** P. 120

1	184 cm^2	2	4 cm	3	$(56\pi + 80) \text{ cm}^2$
4	180 cm^3	5	㉢	6	$(900 - 40\pi) \text{ cm}^3$

- 1 (겉넓이) $= \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 4\right) \times 2 + (5+6+5) \times 10$
 $= 24 + 160 = 184 (\text{cm}^2)$
- 2 정육면체의 한 모서리의 길이를 $a \text{ cm}$ 라고 하면 정육면체의 겉넓이는 정사각형 6개의 넓이의 합과 같으므로 $(a \times a) \times 6 = 96$ 에서 $a^2 = 16 = 4^2$
 $\therefore a = 4$
 따라서 정육면체의 한 모서리의 길이는 4 cm이다.
- 3 (겉넓이) $= \left(\frac{1}{2} \times \pi \times 4^2\right) \times 2 + \left(\frac{1}{2} \times 2\pi \times 4 + 4 + 4\right) \times 10$
 $= 16\pi + 40\pi + 80$
 $= 56\pi + 80 (\text{cm}^2)$
- 4 (부피) $= 20 \times 9 = 180 (\text{cm}^3)$
- 5 사각기둥의 높이를 $h \text{ cm}$ 라고 하면 $\left(\frac{1}{2} \times 5 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4\right) \times h = 64$
 $16h = 64 \quad \therefore h = 4$
 따라서 사각기둥의 높이는 4 cm이다.
- 6 (구멍이 뚫린 입체도형의 부피)
 $=$ (사각기둥의 부피) $-$ (원기둥의 부피)
 $= (10 \times 9) \times 10 - (\pi \times 2^2) \times 10$
 $= 900 - 40\pi (\text{cm}^3)$

2 뿔의 겹넓이와 부피

P. 121~122

개념 확인 (1) ㉠ 9 ㉡ 3 ㉢ 6π (2) $9\pi \text{ cm}^2$

(3) $27\pi \text{ cm}^2$ (4) $36\pi \text{ cm}^2$

(1) ㉢ $2\pi \times 3 = 6\pi$

(2) (밑넓이) $= \pi \times 3^2 = 9\pi (\text{cm}^2)$

(3) (옆넓이) $= \frac{1}{2} \times 9 \times 6\pi = 27\pi (\text{cm}^2)$

(4) (겉넓이) $= 9\pi + 27\pi = 36\pi (\text{cm}^2)$

필수 문제 1 (1) 340 cm^2 (2) $224\pi \text{ cm}^2$

(1) (밑넓이) $= 10 \times 10 = 100 (\text{cm}^2)$

(옆넓이) $= \left(\frac{1}{2} \times 10 \times 12\right) \times 4 = 240 (\text{cm}^2)$

\therefore (겉넓이) $= 100 + 240 = 340 (\text{cm}^2)$

(2) (밑넓이) $= \pi \times 8^2 = 64\pi (\text{cm}^2)$

(옆넓이) $= \frac{1}{2} \times 20 \times (2\pi \times 8) = 160\pi (\text{cm}^2)$

\therefore (겉넓이) $= 64\pi + 160\pi = 224\pi (\text{cm}^2)$

1-1 (1) 120 cm^2 (2) $216\pi \text{ cm}^2$

(1) (겉넓이) $= 6 \times 6 + \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 7\right) \times 4$

$= 36 + 84$

$= 120 (\text{cm}^2)$

(2) (겉넓이) $= \pi \times 9^2 + \frac{1}{2} \times 15 \times (2\pi \times 9)$

$= 81\pi + 135\pi$

$= 216\pi (\text{cm}^2)$

필수 문제 2 (1) $9\pi \text{ cm}^2$ (2) $36\pi \text{ cm}^2$

(3) $63\pi \text{ cm}^2$ (4) $108\pi \text{ cm}^2$

(1) (작은 밑면의 넓이) $= \pi \times 3^2 = 9\pi (\text{cm}^2)$

(2) (큰 밑면의 넓이) $= \pi \times 6^2 = 36\pi (\text{cm}^2)$

(3) (옆넓이) $=$ (큰 부채꼴의 넓이) $-$ (작은 부채꼴의 넓이)

$= \frac{1}{2} \times 14 \times (2\pi \times 6) - \frac{1}{2} \times 7 \times (2\pi \times 3)$

$= 84\pi - 21\pi$

$= 63\pi (\text{cm}^2)$

(4) (겉넓이) $= 9\pi + 36\pi + 63\pi$

$= 108\pi (\text{cm}^2)$

2-1 ㉣

(두 밑면의 넓이의 합) $= 2 \times 2 + 5 \times 5$

$= 29 (\text{cm}^2)$

(옆넓이) $= \left\{ \frac{1}{2} \times (2+5) \times 4 \right\} \times 4$

$= 56 (\text{cm}^2)$

\therefore (겉넓이) $= 29 + 56 = 85 (\text{cm}^2)$

P. 122~123

필수 문제 3 (1) 80 cm^3 (2) $8\pi \text{ cm}^3$

(1) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24 (\text{cm}^2)$

(높이) $= 10 \text{ cm}$

\therefore (부피) $= \frac{1}{3} \times 24 \times 10 = 80 (\text{cm}^3)$

(2) (밑넓이) $= \pi \times 2^2 = 4\pi (\text{cm}^2)$

(높이) $= 6 \text{ cm}$

\therefore (부피) $= \frac{1}{3} \times 4\pi \times 6 = 8\pi (\text{cm}^3)$

3-1 8

$\frac{1}{3} \times (6 \times 7) \times h = 112$

$14h = 112$

$\therefore h = 8$

3-2 3 cm

(뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times$ (밑넓이) \times (높이) 이므로

$\frac{1}{3} \times$ (밑넓이) $\times 12 = 36\pi$ 에서

$4 \times$ (밑넓이) $= 36\pi$

\therefore (밑넓이) $= 9\pi (\text{cm}^2)$

이 원뿔의 밑면인 원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면

$\pi r^2 = 9\pi$ 에서 $r^2 = 9 = 3^2$

$\therefore r = 3$

따라서 밑면인 원의 반지름의 길이는 3 cm이다.

필수 문제 4 (1) 384 cm^3 (2) 48 cm^3 (3) 336 cm^3

(1) (큰 사각뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times (12 \times 12) \times (4+4)$

$= 384 (\text{cm}^3)$

(2) (작은 사각뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times (6 \times 6) \times 4$

$= 48 (\text{cm}^3)$

(3) (사각뿔대의 부피) $= 384 - 48$

$= 336 (\text{cm}^3)$

4-1 $28\pi \text{ cm}^3$

(원뿔대의 부피)

$=$ (큰 원뿔의 부피) $-$ (작은 원뿔의 부피)

$= \frac{1}{3} \times (\pi \times 4^2) \times (3+3) - \frac{1}{3} \times (\pi \times 2^2) \times 3$

$= 32\pi - 4\pi$

$= 28\pi (\text{cm}^3)$

STEP

1

속속 개념 익히기

P. 124

- 1 256 cm^2 2 (1) $2\pi\text{ cm}$ (2) 1 cm (3) $4\pi\text{ cm}^2$
 3 (1) 216 cm^3 (2) 36 cm^3 (3) 180 cm^3
 4 $192\pi\text{ cm}^2, 228\pi\text{ cm}^3$ 5 ②


1 (겉넓이) $= 8 \times 8 + \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 12\right) \times 4$
 $= 64 + 192 = 256(\text{cm}^2)$

2 (1) (옆면인 부채꼴의 호의 길이) $= 2\pi \times 3 \times \frac{120}{360}$
 $= 2\pi(\text{cm})$
 (2) 밑면인 원의 반지름의 길이를 $r\text{ cm}$ 라고 하면
 (밑면인 원의 둘레의 길이) $=$ (옆면인 부채꼴의 호의 길이)
 이므로
 $2\pi r = 2\pi \quad \therefore r = 1$
 따라서 밑면인 원의 반지름의 길이는 1 cm 이다.

(3) (겉넓이) $= \pi \times 1^2 + \frac{1}{2} \times 3 \times 2\pi$
 $= \pi + 3\pi$
 $= 4\pi(\text{cm}^2)$

- 3 (1) (처음 정육면체의 부피) $= 6 \times 6 \times 6$
 $= 216(\text{cm}^3)$
 (2) (잘라 낸 삼각뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 6\right) \times 6$
 $= 36(\text{cm}^3)$
 (3) (남은 입체도형의 부피) $= 216 - 36$
 $= 180(\text{cm}^3)$

- 4 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같으므로
 (두 밑면의 넓이의 합)
 $= \pi \times 6^2 + \pi \times 9^2$
 $= 117\pi(\text{cm}^2)$



(옆넓이) $= \frac{1}{2} \times (10 + 5) \times (2\pi \times 9) - \frac{1}{2} \times 10 \times (2\pi \times 6)$
 $= 135\pi - 60\pi$
 $= 75\pi(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) $= 117\pi + 75\pi$
 $= 192\pi(\text{cm}^2)$

(부피) $=$ (큰 원뿔의 부피) $-$ (작은 원뿔의 부피)
 $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 9^2) \times (4 + 8) - \frac{1}{3} \times (\pi \times 6^2) \times 8$
 $= 324\pi - 96\pi$
 $= 228\pi(\text{cm}^3)$

5 (그릇의 부피) $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 5^2) \times 18 = 150\pi(\text{cm}^3)$

따라서 1초에 $3\pi\text{ cm}^3$ 씩 물을 넣으면 $150\pi \div 3\pi = 50$ (초) 후에 처음으로 물이 가득 차게 된다.

3 구의 겉넓이와 부피

P. 125

개념 확인 $2r, 4$ 필수 문제 1 (1) $16\pi\text{ cm}^2$ (2) $75\pi\text{ cm}^2$

(1) (겉넓이) $= 4\pi \times 2^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$

(2) 반구의 반지름의 길이가 5 cm 이므로

(겉넓이) $= \frac{1}{2} \times (4\pi \times 5^2) + \pi \times 5^2$
 $= 50\pi + 25\pi = 75\pi(\text{cm}^2)$

1-1 $64\pi\text{ cm}^2$

잘라 낸 부분은 구의 $\frac{1}{4}$ 이므로 남아 있는 부분은 구의 $\frac{3}{4}$ 이다.

\therefore (겉넓이) $= \frac{3}{4} \times (4\pi \times 4^2) + \left\{ \frac{1}{2} \times (\pi \times 4^2) \right\} \times 2$
 $= 48\pi + 16\pi$
 $= 64\pi(\text{cm}^2)$

P. 126

개념 확인 (1) $54\pi\text{ cm}^3$ (2) $36\pi\text{ cm}^3$ (3) 3 : 2

(1) $(\pi \times 3^2) \times 6 = 54\pi(\text{cm}^3)$

(2) $\frac{4}{3} \pi \times 3^3 = 36\pi(\text{cm}^3)$

(3) (원기둥의 부피) : (구의 부피) $= 54\pi : 36\pi$
 $= 3 : 2$

필수 문제 2 (1) $\frac{32}{3}\pi\text{ cm}^3$ (2) $144\pi\text{ cm}^3$

(1) (부피) $= \frac{4}{3} \pi \times 2^3 = \frac{32}{3}\pi(\text{cm}^3)$

(2) 반구의 반지름의 길이가 6 cm 이므로

(부피) $= \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 6^3\right) = 144\pi(\text{cm}^3)$

2-1 $30\pi\text{ cm}^3$

(부피) $=$ (원뿔의 부피) $+ (반구의 부피)$
 $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 3^3\right)$
 $= 12\pi + 18\pi = 30\pi(\text{cm}^3)$

개념편

- 1 6 cm 2 $57\pi \text{ cm}^2$ 3 $105\pi \text{ cm}^2$
 4 $\frac{224}{3}\pi \text{ cm}^3$ 5 $72\pi \text{ cm}^3$

1 구의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면

$$4\pi r^2 = 144\pi \text{에서 } r^2 = 36 = 6^2$$

$$\therefore r = 6$$

따라서 구의 반지름의 길이는 6 cm 이다.

2 (겉넓이) $= \frac{1}{2} \times (4\pi \times 3^2) + (2\pi \times 3) \times 5 + \pi \times 3^2$
 $= 18\pi + 30\pi + 9\pi$
 $= 57\pi (\text{cm}^2)$

3 (밑넓이) $= (\text{큰 원의 넓이}) - (\text{작은 원의 넓이})$
 $= \pi \times 6^2 - \pi \times 3^2$
 $= 36\pi - 9\pi$
 $= 27\pi (\text{cm}^2)$

(원뿔의 옆넓이) $= \frac{1}{2} \times 10 \times (2\pi \times 6)$
 $= 60\pi (\text{cm}^2)$

(안쪽 부분의 겉넓이) $= \frac{1}{2} \times (4\pi \times 3^2)$
 $= 18\pi (\text{cm}^2)$

\therefore (입체도형의 겉넓이) $= 27\pi + 60\pi + 18\pi$
 $= 105\pi (\text{cm}^2)$

4 잘라 낸 부분은 구의 $\frac{1}{8}$ 이므로 남아 있는 부분은 구의 $\frac{7}{8}$ 이다.

$$\therefore (\text{부피}) = \frac{7}{8} \times \left(\frac{4}{3}\pi \times 4^3 \right)$$

$$= \frac{224}{3}\pi (\text{cm}^3)$$

5 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같으므로


(부피) $= (\text{원뿔의 부피}) + (\text{원기둥의 부피})$
 $+ (\text{반구의 부피})$

$$= \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 3$$

$$+ (\pi \times 3^2) \times 5 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3}\pi \times 3^3 \right)$$

$$= 9\pi + 45\pi + 18\pi$$

$$= 72\pi (\text{cm}^3)$$



- 1 ③ 2 $(64\pi + 120) \text{ cm}^2$ 3 $72\pi \text{ cm}^3$
 4 264 cm^2 5 ⑤ 6 $63\pi \text{ cm}^2$
 7 302 cm^2 8 ③ 9 576 cm^3
 10 ④ 11 $312\pi \text{ cm}^3$ 12 ③ 13 ④
 14 ③ 15 $\frac{49}{2}\pi \text{ cm}^2$ 16 $162\pi \text{ cm}^3$
 17 ④ 18 ③ 19 2 : 3 20 ⑤

1 삼각기둥의 높이를 $x \text{ cm}$ 라고 하면

$$\left(\frac{1}{2} \times 4 \times 3 \right) \times 2 + (4 + 3 + 5) \times x = 60$$

$$12 + 12x = 60, 12x = 48 \quad \therefore x = 4$$

따라서 삼각기둥의 높이는 4 cm 이다.

2 (밑넓이) $= \pi \times 6^2 \times \frac{120}{360} = 12\pi (\text{cm}^2)$

(옆넓이) $= \left(2\pi \times 6 \times \frac{120}{360} + 6 + 6 \right) \times 10$
 $= 40\pi + 120 (\text{cm}^2)$

\therefore (겉넓이) $= 12\pi \times 2 + 40\pi + 120$
 $= 64\pi + 120 (\text{cm}^2)$

3 밑면인 원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면

$$2\pi r = 6\pi \quad \therefore r = 3$$

따라서 밑면인 원의 반지름의 길이는 3 cm 이므로

(원기둥의 부피) $= (\pi \times 3^2) \times 8$
 $= 72\pi (\text{cm}^3)$

4 (겉넓이) $= \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 5 \right) \times 4 + (6 + 6 + 6 + 6) \times 7 + 6 \times 6$
 $= 60 + 168 + 36$
 $= 264 (\text{cm}^2)$

5 (겉넓이) $= (\text{큰 원뿔의 옆넓이}) + (\text{작은 원뿔의 옆넓이})$
 $= \frac{1}{2} \times 6 \times (2\pi \times 4) + \frac{1}{2} \times 5 \times (2\pi \times 4)$
 $= 24\pi + 20\pi$
 $= 44\pi (\text{cm}^2)$

6 주어진 원뿔의 모선의 길이를 $l \text{ cm}$ 라고 하면 원 O의 둘레의 길이는 원뿔의 밑면인 원의 둘레의 길이의 6배이므로

$$2\pi l = (2\pi \times 3) \times 6$$

$$2\pi l = 36\pi \quad \therefore l = 18$$

따라서 모선의 길이가 18 cm 이므로

(원뿔의 겉넓이) $= \pi \times 3^2 + \frac{1}{2} \times 18 \times (2\pi \times 3)$


$$= 9\pi + 54\pi$$

$$= 63\pi (\text{cm}^2)$$

7 (두 밑면의 넓이의 합) = $5 \times 5 + 9 \times 9$
 $= 106(\text{cm}^2)$
 (옆넓이) = $\left\{ \frac{1}{2} \times (5+9) \times 7 \right\} \times 4$
 $= 196(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) = $106 + 196 = 302(\text{cm}^2)$

8 $\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 9 \times 14 \right) \times x = 63$
 $21x = 63$
 $\therefore x = 3$

9 주어진 색종이를 접었을 때 만들어지는 삼각뿔은 오른쪽 그림과 같으므로
 (부피) = $\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 12 \right) \times 24$
 $= 576(\text{cm}^3)$



10 (잘라 낸 입체도형의 부피) = $\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) \times 4$
 $= \frac{32}{3}(\text{cm}^3)$


(남은 입체도형의 부피) = $4 \times 4 \times 4 - \frac{32}{3}$
 $= 64 - \frac{32}{3}$
 $= \frac{160}{3}(\text{cm}^3)$

따라서 구하는 부피의 비는 $\frac{32}{3} : \frac{160}{3} = 1 : 5$


11 (부피) = $\frac{1}{3} \times (\pi \times 9^2) \times (4+8) - \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4$
 $= 324\pi - 12\pi$
 $= 312\pi(\text{cm}^3)$

12 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같으므로

(부피) = (원뿔의 부피) + (원기둥의 부피)
 $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 2^2) \times 6$
 $+ (\pi \times 5^2) \times 6$
 $= 8\pi + 150\pi$
 $= 158\pi(\text{cm}^3)$




13 직각삼각형 ABC를 \overline{AC} 를 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같으므로
 (부피) = $\frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4$
 $= 12\pi(\text{cm}^3)$



직각삼각형 ABC를 \overline{BC} 를 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같으므로

(부피) = $\frac{1}{3} \times (\pi \times 4^2) \times 3$
 $= 16\pi(\text{cm}^3)$

따라서 구하는 부피의 비는
 $12\pi : 16\pi = 3 : 4$



14 (겉넓이) = $\frac{1}{2} \times (4\pi \times 7^2) + \pi \times 7^2$
 $= 98\pi + 49\pi = 147\pi(\text{cm}^2)$

15 가죽 두 조각의 넓이가 구의 겉넓이와 같으므로
 (한 조각의 넓이) = $\frac{1}{2} \times (\text{구의 겉넓이})$
 $= \frac{1}{2} \times \left\{ 4\pi \times \left(\frac{7}{2} \right)^2 \right\}$
 $= \frac{49}{2}\pi(\text{cm}^2)$

16 (작은 반구의 부피) = $\frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3}\pi \times 3^3 \right)$
 $= 18\pi(\text{cm}^3)$
 (큰 반구의 부피) = $\frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3}\pi \times 6^3 \right)$
 $= 144\pi(\text{cm}^3)$
 \therefore (부피) = $18\pi + 144\pi = 162\pi(\text{cm}^3)$

17 (A의 부피) = $\frac{4}{3}\pi \times r^3 = \frac{4}{3}\pi r^3(\text{cm}^3)$
 (B의 부피) = $\frac{4}{3}\pi \times (3r)^3 = 36\pi r^3(\text{cm}^3)$
 따라서 두 구 A, B의 부피의 비는
 $\frac{4}{3}\pi r^3 : 36\pi r^3 = 1 : 27$

18 원뿔 모양의 그릇에 담긴 물의 높이를 h cm라고 하면
 원뿔 모양의 그릇에 담긴 물의 부피와 구의 부피가 같으므로
 $\frac{1}{3} \times (\pi \times 8^2) \times h = \frac{4}{3}\pi \times 8^3$
 $\therefore h = 32$
 따라서 물의 높이는 32 cm이다.

19 (구의 부피) = $\frac{4}{3}\pi \times 2^3 = \frac{32}{3}\pi(\text{cm}^3)$
 (원기둥의 부피) = $(\pi \times 2^2) \times 4 = 16\pi(\text{cm}^3)$
 따라서 구와 원기둥의 부피의 비는
 $\frac{32}{3}\pi : 16\pi = 2 : 3$

20 구의 반지름의 길이를 r cm라고 하면 구 3개가 원기둥 모양의 통 안에 꼭 맞게 들어 있으므로
(통의 높이) = (구의 지름의 길이) \times 3
 $= 2r \times 3 = 6r$ (cm)

이때 통의 부피는 162π cm^3 이므로
 $\pi r^2 \times 6r = 162\pi, r^3 = 27 = 3^3 \quad \therefore r = 3$
따라서 구의 반지름의 길이는 3 cm이므로

(구 1개의 부피) = $\frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi$ (cm^3)

원기둥 모양의 통에서 구 3개를 제외한 빈 공간의 부피는
(통의 부피) - (구 3개의 부피) = $162\pi - 36\pi \times 3$
 $= 162\pi - 108\pi$
 $= 54\pi$ (cm^3)

STEP 3 **썩썩 서술형 완성하기** P. 132~133

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 유제 1 168π cm^3 유제 2 96π cm^2

연습해 보자 1 224 cm^2 2 120°

3 12π cm^3 4 550π cm^3

따라 해보자


유제 1 1단계 (큰 원기둥의 부피) = $(\pi \times 5^2) \times 8$
 $= 200\pi$ (cm^3) ... (i)

2단계 (작은 원기둥의 부피) = $(\pi \times 2^2) \times 8$
 $= 32\pi$ (cm^3) ... (ii)

3단계 (구멍이 뚫린 원기둥의 부피)
= (큰 원기둥의 부피) - (작은 원기둥의 부피)
 $= 200\pi - 32\pi = 168\pi$ (cm^3) ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 큰 원기둥의 부피 구하기	40%
(ii) 작은 원기둥의 부피 구하기	40%
(iii) 구멍이 뚫린 원기둥의 부피 구하기	20%

유제 2 1단계 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 오른쪽 그림과 같다. ... (i)



2단계 (겉넓이)
 $= \pi \times 4^2 + (2\pi \times 4) \times 6$
 $+ \frac{1}{2} \times (4\pi \times 4^2)$
 $= 16\pi + 48\pi + 32\pi$
 $= 96\pi$ (cm^2) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 입체도형의 겨냥도 그리기	40%
(ii) 입체도형의 겉넓이 구하기	60%

연습해 보자

1 (밑넓이) = $7 \times 6 - 2 \times 4 = 34$ (cm^2) ... (i)
(옆넓이) = $(5 + 4 + 2 + 2 + 7 + 6) \times 6$
 $= 156$ (cm^2) ... (ii)
 \therefore (겉넓이) = (밑넓이) \times 2 + (옆넓이)
 $= 34 \times 2 + 156$
 $= 224$ (cm^2) ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 입체도형의 밑넓이 구하기	40%
(ii) 입체도형의 옆넓이 구하기	40%
(iii) 입체도형의 겉넓이 구하기	20%

2 원뿔의 모선의 길이를 l cm라고 하면


$\pi \times 3^2 + \frac{1}{2} \times l \times (2\pi \times 3) = 36\pi$

$9\pi + 3l\pi = 36\pi$

$3l\pi = 27\pi \quad \therefore l = 9$

따라서 원뿔의 모선의 길이는 9 cm이다. ... (i)

이때 원뿔의 전개도는 오른쪽 그림과 같으므로 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면



$2\pi \times 9 \times \frac{x}{360} = 2\pi \times 3$

$\therefore x = 120$

따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 120° 이다. ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 원뿔의 모선의 길이 구하기	50%
(ii) 부채꼴의 중심각의 크기 구하기	50%

3 (밑넓이) = $\pi \times 4^2 \times \frac{60}{360} - \pi \times 2^2 \times \frac{60}{360}$
 $= \frac{8}{3}\pi - \frac{2}{3}\pi$
 $= 2\pi$ (cm^2) ... (i)
(높이) = 6 cm ... (ii)
 \therefore (부피) = (밑넓이) \times (높이)
 $= 2\pi \times 6$
 $= 12\pi$ (cm^3) ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 입체도형의 밑넓이 구하기	50%
(ii) 입체도형의 높이 구하기	10%
(iii) 입체도형의 부피 구하기	40%

- 4 (높이가 12 cm가 되도록 넣은 물의 부피)
 $= (\pi \times 5^2) \times 12$
 $= 300\pi (\text{cm}^3)$... (i)
 (거꾸로 한 병의 빈 공간의 부피) $= (\pi \times 5^2) \times 10$
 $= 250\pi (\text{cm}^3)$... (ii)
 가득 채운 물의 부피는 높이가 12 cm가 되도록 넣은 물의 부피와 거꾸로 한 병의 빈 공간의 부피의 합과 같으므로
 (가득 채운 물의 부피) $= 300\pi + 250\pi$
 $= 550\pi (\text{cm}^3)$... (iii)

채점 기준	비율
(i) 높이가 12 cm가 되도록 넣은 물의 부피 구하기	30 %
(ii) 거꾸로 한 병의 빈 공간의 부피 구하기	30 %
(iii) 가득 채운 물의 부피 구하기	40 %

답 A 캔

A, B 두 캔에 같은 양의 음료를 담을 수 있으므로 길넓이가 작은 캔을 만드는 것이 더 경제적이다.

$$\begin{aligned} \text{(A 캔의 길넓이)} &= (\pi \times 4^2) \times 2 + (2\pi \times 4) \times 4 \\ &= 32\pi + 32\pi \\ &= 64\pi (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(B 캔의 길넓이)} &= (\pi \times 2^2) \times 2 + (2\pi \times 2) \times 16 \\ &= 8\pi + 64\pi \\ &= 72\pi (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

따라서 A 캔의 길넓이가 B 캔의 길넓이보다 작으므로 A 캔이 B 캔보다 더 경제적이다.

1 줄기와 잎 그림, 도수분포표

P. 138~139

개념 확인 (1) 4, 7 (2) 4

필수 문제 1

가방 무게
(115는 1.5kg)

줄기	잎
1	5 8
2	4 6 7
3	2 3 4 4 6
4	0 9

(1) 4, 6, 7 (2) 3

(2) 잎이 가장 많은 줄기는 잎의 개수가 5개인 줄기 3이다.

1-1

1분당 맥박 수
(617은 67회)

줄기	잎
6	7 8 8 9 9 9
7	1 2 3 3 4 6 9 9
8	0 2 3 4
9	0 1

(1) 0, 2, 3, 4 (2) 9 (3) 91회, 67회

- (2) 잎이 가장 적은 줄기는 잎의 개수가 2개인 줄기 9이다.
 (3) 맥박 수가 가장 높은 학생의 맥박 수는 줄기가 9이고 잎이 1이므로 91회, 가장 낮은 학생의 맥박 수는 줄기가 6이고 잎이 7이므로 67회이다.

필수 문제 2 (1) 20명 (2) 166 cm (3) 4명

- (1) 전체 학생 수는 전체 잎의 개수와 같으므로 $4+8+6+2=20$ (명)
 (2) 키가 큰 학생의 키부터 차례로 나열하면 173 cm, 171 cm, 166 cm, ...이므로 키가 큰 쪽에서 3번째인 학생의 키는 166 cm이다.
 (3) 키가 150 cm 미만인 학생 수는 줄기 14에 해당하는 잎의 개수와 같은 4명이다.

2-1 (1) 24명 (2) 31세 (3) 6명 (4) 25%

- (1) 전체 회원 수는 전체 잎의 개수와 같으므로 $4+6+8+5+1=24$ (명)
 (2) 나이가 적은 회원의 나이부터 차례로 나열하면 23세, 25세, 28세, 29세, 31세, ...이므로 나이가 적은 쪽에서 5번째인 회원의 나이는 31세이다.
 (3) 나이가 50세 이상인 회원 수는 줄기 5, 6에 해당하는 잎의 개수와 같은 6명이다.
 (4) 나이가 50세 이상인 회원은 6명이므로 전체의 $\frac{6}{24} \times 100 = 25$ (%)이다.

P. 140~141

개념 확인

책의 수(권)	학생 수(명)	
5 ^{이상} ~10 ^{미만}	///	3
10 ~ 15	////	5
15 ~ 20	/////	4
20 ~ 25	///	3
합계	15	

필수 문제 3

가슴둘레(cm)	학생 수(명)
60 ^{이상} ~65 ^{미만}	2
65 ~ 70	6
70 ~ 75	8
75 ~ 80	4
합계	20

(1) 4개 (2) 5 cm (3) 6명

- (1) 계급의 개수는 60^{이상}~65^{미만}, 65~70, 70~75, 75~80의 4개이다.
 (2) (계급의 크기) = $65 - 60 = 70 - 65 = 75 - 70 = 80 - 75 = 5$ (cm)
 (3) 가슴둘레가 65 cm인 민수가 속하는 계급은 65 cm 이상 70 cm 미만이므로 이 계급의 도수는 6명이다.

3-1

(1)

나이(세)	참가자 수(명)
10 ^{이상} ~20 ^{미만}	3
20 ~ 30	5
30 ~ 40	7
40 ~ 50	3
합계	18

- (2) 30세 이상 40세 미만 (3) 5명
 (2) 도수가 가장 큰 계급은 도수가 7명인 30세 이상 40세 미만이다.
 (3) 나이가 21세인 참가자가 속하는 계급은 20세 이상 30세 미만이므로 이 계급의 도수는 5명이다.

필수 문제 4 (1) 9 (2) 10개 (3) 500 kcal 이상 600 kcal 미만

- (1) $4+7+A+10+8+2=40$ 에서 $A=40-(4+7+10+8+2)=9$
 (2) $8+2=10$ (개)
 (3) 열량이 600 kcal 이상인 식품은 2개, 500 kcal 이상인 식품은 $8+2=10$ (개)이므로 열량이 높은 쪽에서 8번째인 식품이 속하는 계급은 500 kcal 이상 600 kcal 미만이다.

4-1 나, 르

- ㄱ. (계급의 크기) = $20 - 0 = 40 - 20 = \dots = 120 - 100 = 20$ (분)
- 나. $1 + 3 + 10 + 14 + 5 + 2 = 35$ (명)
- ㄷ. 컴퓨터 사용 시간이 100분 이상인 학생은 2명, 80분 이상인 학생은 $5 + 2 = 7$ (명)이므로 컴퓨터 사용 시간이 긴 쪽에서 7번째인 학생이 속하는 계급은 80분 이상 100분 미만이다.
- 르. 컴퓨터 사용 시간이 80분 이상인 학생은 $5 + 2 = 7$ (명)이므로 전체의 $\frac{7}{35} \times 100 = 20$ (%)이다.
- 따라서 옳은 것은 나, 르이다.

STEP 1 **속속 개념 익히기** **P. 142**

1 나, 모

2 (1) 25 (2) 30분 이상 60분 미만 (3) 40%

3 나, 르

- 1 ㄱ. 앞이 가장 많은 줄기는 3이므로 학생 수가 가장 많은 점수대는 30점대이다.
- 나. 전체 학생 수는 전체 앞의 개수와 같으므로 $3 + 5 + 6 + 7 + 4 = 25$ (명)
- ㄷ. 점수가 10점 미만인 학생은 3명이므로 전체의 $\frac{3}{25} \times 100 = 12$ (%)이다.
- 르. 점수가 높은 학생의 점수부터 차례로 나열하면 46점, 42점, 41점, 40점, 38점, 37점, ...이므로 점수가 높은 쪽에서 6번째인 학생의 점수는 37점이다.
- ㅁ. 호진이보다 점수가 높은 학생 수는 35점, 37점, 38점, 40점, 41점, 42점, 46점의 7명이다.
- 따라서 옳지 않은 것은 ㄷ, 모이다.


- 2 (1) (계급의 크기) = $30 - 0 = 60 - 30 = \dots = 150 - 120 = 30$ (분)
- $\therefore a = 30$
- 계급의 개수는 0^{이상}~30^{미만}, 30~60, 60~90, 90~120, 120~150의 5개이다.
- $\therefore b = 5$
- $\therefore a - b = 30 - 5 = 25$
- (2) 독서 시간이 30분 미만인 학생은 2명, 60분 미만인 학생은 $2 + 4 = 6$ (명)이므로 독서 시간이 적은 쪽에서 6번째인 학생이 속하는 계급은 30분 이상 60분 미만이다.
- (3) 독서 시간이 90분 이상인 학생은 $5 + 3 = 8$ (명)이므로 전체의 $\frac{8}{20} \times 100 = 40$ (%)이다.

- 3 등산 횟수가 10회 이상 15회 미만인 회원 수는 $20 - (5 + 4 + 3 + 1) = 7$ (명)
- ㄱ. 도수가 가장 큰 계급은 도수가 7명인 10회 이상 15회 미만이다.
- 나. 등산 횟수가 가장 많은 회원의 정확한 등산 횟수는 알 수 없다.
- ㄷ. 등산 횟수가 25회 이상인 회원은 1명, 20회 이상인 회원은 $3 + 1 = 4$ (명)이므로 등산 횟수가 많은 쪽에서 4번째인 회원이 속하는 계급은 20회 이상 25회 미만이다.
- 르. 등산 횟수가 15회 미만인 회원은 $5 + 7 = 12$ (명)이므로 전체의 $\frac{12}{20} \times 100 = 60$ (%)이다.
- 따라서 옳지 않은 것은 나, 르이다.

2 히스토그램과 도수분포다각형

P. 143


개념 확인



- 필수 문제 1** (1) 2점 (2) 21명 (3) 74
- (1) (계급의 크기) = (직사각형의 가로 길이) = $12 - 10 = 14 - 12 = \dots = 20 - 18 = 2$ (점)
- (2) $9 + 12 = 21$ (명)
- (3) (모든 직사각형의 넓이의 합) = (계급의 크기) × (도수의 총합) = $2 \times (4 + 9 + 12 + 7 + 5) = 2 \times 37 = 74$

- 1-1** (1) 5개 (2) 30명 (3) 120
- (1) (계급의 개수) = (직사각형의 개수) = 5개
- (2) $8 + 10 + 9 + 2 + 1 = 30$ (명)
- (3) (모든 직사각형의 넓이의 합) = (계급의 크기) × (도수의 총합) = $4 \times 30 = 120$

개념 확인



필수 문제 2 (1) 4개 이상 6개 미만 (2) 28%

- (1) 도수가 가장 큰 계급은 도수가 8명인 4개 이상 6개 미만이다.
- (2) 전체 학생 수는 $4+8+6+5+2=25$ (명)
인형의 수가 8개 이상인 학생은 $5+2=7$ (명)이므로 전체의 $\frac{7}{25} \times 100 = 28$ (%)이다.

2-1 (1) 12회 이상 15회 미만 (2) 120

- (1) 탁걸이 횟수가 15회 이상인 학생은 5명, 12회 이상인 학생은 $9+5=14$ (명)이므로 탁걸이 횟수가 많은 쪽에서 7번째인 학생이 속하는 계급은 12회 이상 15회 미만이다.
- (2) (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이) = (히스토그램의 모든 직사각형의 넓이의 합) = (계급의 크기) × (도수의 총합) = $3 \times (4+10+12+9+5) = 3 \times 40 = 120$

- 2 계급의 크기는 5 mm,
도수가 가장 큰 계급의 도수는 12명,
도수가 가장 작은 계급의 도수는 2명이므로
구하는 직사각형의 넓이의 합은 $5 \times 12 + 5 \times 2 = 70$
- 3 (1) ③ 성적이 5번째로 좋은 학생의 정확한 점수는 알 수 없다.
(2) 반 전체 학생 수는 $4+6+10+9+1=30$ (명)이고,
수학 성적이 80점 이상 90점 미만인 학생은 9명이므로 전체의 $\frac{9}{30} \times 100 = 30$ (%)이다.
(3) (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이) = (히스토그램의 모든 직사각형의 넓이의 합) = (계급의 크기) × (도수의 총합) = $10 \times 30 = 300$

- 4 ㄱ. (1반 학생 수) = $3+7+9+4+2=25$ (명)
(2반 학생 수) = $1+2+5+8+6+3=25$ (명)
즉, 두 반의 학생 수는 같다.
ㄴ. 기록이 가장 좋은 학생은 18초 이상 19초 미만인 계급에 속하므로 2반에 있다.
ㄷ. 기록이 16초 이상 17초 미만인 계급에서 2반에 대한 그래프가 더 위쪽에 있으므로 이 계급에 속하는 학생은 2반이 더 많다.
ㄹ. 2반에 대한 그래프가 1반에 대한 그래프보다 전체적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 2반이 1반보다 기록이 대체적으로 더 좋은 편이다.
따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다.

- 5 (1) 독서량이 8권 이상 12권 미만인 학생 수는 $25 - (4+5+7+2) = 7$ (명)
(2) 독서량이 8권 이상 12권 미만인 학생은 전체의 $\frac{7}{25} \times 100 = 28$ (%)이다.

- 6 통학 시간이 30분 이상 35분 미만인 학생 수는 $40 - (2+5+8+10+9+1) = 5$ (명)
따라서 통학 시간이 30분 이상 35분 미만인 학생은 전체의 $\frac{5}{40} \times 100 = 12.5$ (%)이다.

STEP 1 **쓱쓱 개념 익히기** P. 145~146

- 1 (1) 6개 (2) 8명 (3) 24% (4) 40 m 이상 45 m 미만
- 2 70 3 (1) ③ (2) 30% (3) 300
- 4 ㄷ, ㄹ 5 (1) 7명 (2) 28%
- 6 12.5%

- 1 (2) 던지기 기록이 26m인 학생이 속하는 계급은 25m 이상 30m 미만이므로 이 계급의 도수는 8명이다.
(3) 던지기 기록이 30m 미만인 학생은 $4+8=12$ (명)이므로 전체의 $\frac{12}{50} \times 100 = 24$ (%)이다.
(4) 멀리 던진 계급부터 학생 수를 차례로 나열하면
45m 이상 50m 미만: 3명
40m 이상 45m 미만: 9명
따라서 10번째로 멀리 던진 학생이 속하는 계급은 40m 이상 45m 미만이다.

3 상대도수와 그 그래프

P. 147

개념 확인 (차례로) 5, 0.25, 0.5, 0.1, 1

필수 문제 1 (1) $A=0.1, B=12, C=10, D=0.2, E=1$
(2) 0.15

$$(1) A = \frac{4}{40} = 0.1$$

$$B = 40 \times 0.3 = 12$$

$$C = 40 \times 0.25 = 10$$

$$D = \frac{8}{40} = 0.2$$

$$E = 1$$

(2) 용돈이 2만 원 미만인 학생은 4명, 3만 원 미만인 학생은 $4+6=10$ (명)이므로 용돈이 적은 쪽에서 10번째인 학생이 속하는 계급은 2만 원 이상 3만 원 미만이다. 따라서 이 계급의 상대도수는 0.15이다.

1-1 (1) $A=0.15, B=100, C=0.3, D=80, E=1$
(2) 40%

$$(1) A = \frac{60}{400} = 0.15$$

$$B = 400 \times 0.25 = 100$$

$$C = \frac{120}{400} = 0.3$$


$$D = 400 \times 0.2 = 80$$

$$E = 1$$

(2) 키가 155 cm 미만인 계급의 상대도수의 합은 $0.15+0.25=0.4$
 $\therefore 0.4 \times 100 = 40(\%)$

P. 148

개념 확인



필수 문제 2 (1) 12세 이상 16세 미만 (2) 16명

(1) 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례하므로 도수가 가장 작은 계급은 상대도수가 0.05로 가장 작은 계급인 12세 이상 16세 미만이다.

(2) (나이가 20세 이상 24세 미만인 계급의 도수)
 $= (\text{도수의 총합}) \times (\text{그 계급의 상대도수})$
 $= 40 \times 0.4 = 16(\text{명})$

2-1 (1) 0.4 (2) 12편

(1) 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례하므로 도수가 가장 큰 계급은 상대도수가 0.4로 가장 큰 계급인 120분 이상 130분 미만이다.

(2) (어떤 계급의 도수)

$$= (\text{도수의 총합}) \times (\text{그 계급의 상대도수})$$

이고, 상영 시간이 110분 미만인 계급의 상대도수의 합은 $0.05+0.1=0.15$ 이므로 구하는 영화의 수는 $80 \times 0.15 = 12(\text{편})$

P. 149

개념 확인 (1) 풀이 참조 (2) 여학생

얇은키(cm)	여학생		남학생	
	학생 수(명)	상대도수	학생 수(명)	상대도수
75 ^{이상} ~ 80 ^{미만}	6	0.15	4	0.16
80 ~ 85	8	0.2	5	0.2
85 ~ 90	16	0.4	7	0.28
90 ~ 95	10	0.25	9	0.36
합계	40	1	25	1

(2) 얇은키가 75 cm 이상 80 cm 미만인 계급의 상대도수는 여학생: 0.15, 남학생: 0.16

따라서 얇은키가 75 cm 이상 80 cm 미만인 학생의 비율은 여학생이 더 높다.

필수 문제 3 (1) 12명 (2) A 중학교 (3) B 중학교

(1) 만족도가 50점 이상 60점 미만인 계급의 학생 수는
A 중학교: $100 \times 0.28 = 28(\text{명})$

B 중학교: $200 \times 0.2 = 40(\text{명})$

따라서 학생 수의 차는

$$40 - 28 = 12(\text{명})$$

(2) 만족도가 60점 미만인 계급들의 상대도수는 모두 A 중학교가 B 중학교보다 더 크므로 그 계급에 속하는 학생의 비율은 A 중학교가 B 중학교보다 더 높다.

(3) B 중학교에 대한 그래프가 A 중학교에 대한 그래프보다 전체적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 만족도는 대체적으로 B 중학교가 A 중학교보다 더 높다고 할 수 있다.

3-1 (1) 3개 (2) A 정류장

(1) B 정류장보다 A 정류장의 상대도수가 더 큰 계급은 5^{이상}~10^{미만}, 10~15, 15~20의 3개이다.

(2) A 정류장에 대한 그래프가 B 정류장에 대한 그래프보다 전체적으로 왼쪽으로 치우쳐 있으므로 버스를 기다리는 시간이 대체적으로 A 정류장이 B 정류장보다 더 적다고 할 수 있다.

1 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) ×

2 0.36 3 40명 4 (1) 55% (2) 6개

5 (1) 50명 (2) $A=20, B=0.2, C=8, D=0.16, E=1$

6 (1) 32명 (2) 0.16

7 (1) 350명 (2) 0.4 (3) 140명 8 여학생 9 ㄱ, ㄷ

- 1 (2) 상대도수의 총합은 항상 1이다.
 (4) 상대도수의 총합은 항상 1이므로 상대도수의 분포를 나타낸 도수분포다각형 모양의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 계급의 크기와 같다.

- 2 전체 학생 수는 $1+5+6+9+4=25$ (명)
 한문 성적이 85점인 학생이 속하는 계급은 80점 이상 90점 미만이고, 이 계급의 도수는 9명이다.
 따라서 한문 성적이 85점인 학생이 속하는 계급의 상대도수는 $\frac{9}{25}=0.36$

- 3 (전체 학생 수) = $\frac{(\text{도수})}{(\text{상대도수})} = \frac{8}{0.2} = 40$ (명)

- 4 (1) 무게가 60g 이상 80g 미만인 계급의 상대도수의 합은 $0.3+0.25=0.55$
 $\therefore 0.55 \times 100 = 55$ (%)
 (2) 상대도수의 총합이 1이므로 무게가 50g 이상 60g 미만인 계급의 상대도수는 $1 - (0.1+0.3+0.25+0.2) = 0.15$
 \therefore (구하는 토마토의 개수) = $40 \times 0.15 = 6$ (개)

- 5 (1) 전체 회원 수는 $\frac{7}{0.14} = 50$ (명)

(2) $A=50 \times 0.4=20, B=\frac{10}{50}=0.2$

$C=50 - (7+20+10+5) = 8$

$D=\frac{8}{50}=0.16, E=1$

- 6 (1) 입장 대기 시간이 50분 이상인 계급의 상대도수의 합은 $0.1+0.06=0.16$
 따라서 입장 대기 시간이 50분 이상인 관객 수는 $200 \times 0.16 = 32$ (명)
 (2) 입장 대기 시간이 20분 미만인 관객 수는 $200 \times 0.08 = 16$ (명)
 입장 대기 시간이 20분 이상 30분 미만인 관객 수는 $200 \times 0.16 = 32$ (명)
 따라서 입장 대기 시간이 40번째로 적은 관객이 속하는 계급은 20분 이상 30분 미만이므로 구하는 상대도수는 0.16이다.

- 7 (1) (전체 학생 수) = $\frac{70}{0.2} = 350$ (명)
 (2) 상대도수의 총합은 1이므로 몸무게가 50kg 이상 55kg 미만인 계급의 상대도수는 $1 - (0.12+0.16+0.2+0.08+0.04) = 0.4$
 (3) 전체 학생 수가 350명이므로 몸무게가 50kg 이상 55kg 미만인 학생 수는 $350 \times 0.4 = 140$ (명)

- 8 국어 성적이 80점 이상 90점 미만인 계급의 상대도수는 남학생: $\frac{15}{100} = 0.15$, 여학생: $\frac{8}{50} = 0.16$
 이므로 국어 성적이 80점 이상 90점 미만인 학생의 비율은 여학생이 더 높다.

- 9 ㄱ. 음악 감상 시간이 90분 이상 120분 미만인 학생 수는
 1학년: $200 \times 0.2 = 40$ (명)
 2학년: $150 \times 0.24 = 36$ (명)
 따라서 음악 감상 시간이 90분 이상 120분 미만인 학생은 1학년이 더 많다.
 ㄴ. 2학년에 대한 그래프가 1학년에 대한 그래프보다 전체적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 2학년이 1학년보다 음악 감상 시간이 더 긴 편이다.
 ㄷ. 1학년과 2학년에 대한 각각의 그래프에서 계급의 크기와 상대도수의 총합이 각각 같으므로 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 같다.
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

- 1 ④ 2 (1) 남학생 (2) 많은 편
 3 (1) 90분 이상 110분 미만 (2) 30% 4 4
 5 9명 6 ⑤ 7 (1) 25명 (2) 8명 8 ㄴ, ㄷ
 9 ③ 10 0.225 11 ⑤ 12 6마리
 13 (1) 40명 (2) 0.3 14 ② 15 15명
 16 (1) B 제품 (2) 30세 이상 40세 미만 17 5:2
 18 ㄴ, ㄷ

- 1 ① 앞이 가장 많은 줄기는 앞의 개수가 8개인 1이다.
 ② $6+8+7+5+2=28$ (명)
 ⑤ 팔굽혀펴기 기록이 적은 학생의 기록부터 차례로 나열하면 4회, 5회, 6회, 7회, 8회, 9회, 10회, 11회, 12회, 13회, ...이므로 팔굽혀펴기 기록이 적은 쪽에서 10번째인 학생의 기록은 13회이다.
 따라서 옳은 것은 ④이다.

- 2 (1) 휴대 전화에 등록된 친구 수가 많은 학생의 친구 수부터 차례로 나열하면
53명, 52명, 52명, 51명, 51명, 50명, 49명, ...이므로 휴대 전화에 등록된 친구 수가 많은 쪽에서 7번째인 학생은 등록된 친구 수가 49명인 남학생이다.
(2) 전체 학생 수는 30명이고, 휴대 전화에 등록된 친구 수가 43명인 학생은 등록된 친구 수가 적은 쪽에서 20번째, 많은 쪽에서 11번째이므로 많은 편이다.
- 3 (1) 인터넷을 사용한 시간이 90분 이상 110분 미만인 계급의 도수는
 $30 - (3 + 7 + 11 + 1) = 8$ (명)
따라서 도수가 두 번째로 큰 계급은 90분 이상 110분 미만이다.
(2) 인터넷을 사용한 시간이 90분 이상인 학생은
 $8 + 1 = 9$ (명)이므로 전체의 $\frac{9}{30} \times 100 = 30$ (%)이다.
- 4 줄넘기 기록이 80회 이상 100회 미만인 학생이 전체의 35%이므로
 $\frac{A}{40} \times 100 = 35 \quad \therefore A = 14$
 $\therefore B = 40 - (6 + 8 + 14 + 2) = 10$
 $\therefore A - B = 14 - 10 = 4$
- 5 통화 시간이 40분 미만인 학생 수를 x 명이라고 하면 통화 시간이 40분 이상인 학생 수가 40분 미만인 학생 수의 2배이므로 통화 시간이 40분 이상인 학생 수는 $2x$ 명이다.
이때 전체 학생 수가 27명이므로
 $x + 2x = 27, 3x = 27 \quad \therefore x = 9$
따라서 통화 시간이 40분 미만인 학생 수는 9명이다.
- 6 ② $4 + 7 + 10 + 9 + 2 = 32$ (명)
④ 키가 140 cm 미만인 학생은 4명, 150 cm 미만인 학생은 $4 + 7 = 11$ (명)이므로 키가 12번째로 작은 학생이 속하는 계급은 150 cm 이상 160 cm 미만이다.
⑤ (모든 직사각형의 넓이의 합)
= (계급의 크기) \times (도수의 총합)
= $10 \times 32 = 320$
- 7 (1) 기록이 190 cm 미만인 학생은 $2 + 5 = 7$ (명)이고, 전체의 28%이므로
(전체 학생 수) $\times \frac{28}{100} = 7$
 \therefore (전체 학생 수) = 25(명)
(2) 기록이 210 cm 미만인 학생 수는
 $25 \times \frac{4}{4+1} = 20$ (명)이므로
기록이 190 cm 이상 200 cm 미만인 계급의 도수는
 $20 - (2 + 5 + 5) = 8$ (명)

- 8 ㄱ. $1 + 6 + 12 + 10 + 3 = 32$ (명)
ㄴ. (계급의 크기) = $5 - 3 = 7 - 5 = \dots = 13 - 11 = 2$ (회)
계급의 개수는 $3^{\text{이상}} \sim 5^{\text{미만}}, 5 \sim 7, 7 \sim 9, 9 \sim 11, 11 \sim 13$ 의 5개이다.
ㄷ. $1 + 6 = 7$ (명)
ㄹ. 자유투 성공 횟수가 11회 이상인 학생은 3명, 9회 이상인 학생은 $10 + 3 = 13$ (명)이므로 자유투 성공 횟수가 많은 쪽에서 10번째인 학생이 속하는 계급은 9회 이상 11회 미만이다.
따라서 옳지 않은 것은 ㄴ, ㄹ이다.
- 9 ㄱ. 줄기와 잎 그림에서는 실제 변량의 정확한 값을 알 수 있다.
ㄴ. 도수분포표에서 계급의 개수가 너무 많거나 적으면 자료의 분포 상태를 파악하기 어려우므로 계급의 개수는 5~15개가 적당하다.
ㄷ. 히스토그램에서 각 직사각형의 가로의 길이는 계급의 크기이므로 일정하다.
ㄹ. 도수의 총합에 따라 도수가 큰 쪽의 상대도수가 더 작을 수도 있다.
따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다.
- 10 전체 연극의 수는 $2 + 4 + 5 + 7 + 9 + 8 + 4 + 1 = 40$ (편)
도수가 가장 큰 계급의 도수는 9편이므로
구하는 상대도수는 $\frac{9}{40} = 0.225$
- 11 변량의 개수가 다른 두 자료, 즉 도수의 총합이 다른 두 집단의 분포를 비교할 때는 상대도수끼리 비교하는 것이 적합하므로 구하는 가장 편리한 것은 ⑤ 상대도수의 분포표이다.
- 12 (구하는 유기견의 수) = (전체 유기견의 수) \times (상대도수)
= $40 \times 0.15 = 6$ (마리)
- 13 (1) 기록이 0 m 이상 10 m 미만인 계급의 도수는 2명, 상대도수는 0.05이므로 전체 학생 수는
 $\frac{2}{0.05} = 40$ (명)
(2) 기록이 10 m인 학생이 속하는 계급은 10 m 이상 20 m 미만이고, 이 계급의 도수는 12명이다.
따라서 이 계급의 상대도수는
 $\frac{12}{40} = 0.3$
- 14 나이가 30세 이상 35세 미만인 동물의 수는
 $80 \times 0.05 = 4$ (마리)
나이가 25세 이상 30세 미만인 동물의 수는
 $80 \times 0.15 = 12$ (마리)
따라서 나이가 많은 쪽에서 16번째인 동물이 속하는 계급은 25세 이상 30세 미만이므로 이 계급의 상대도수는 0.15이다.

15 (전체 학생 수) = $\frac{4}{0.08} = 50$ (명)

앞은키가 80 cm 이상 85 cm 미만인 계급의 상대도수는
 $1 - (0.08 + 0.18 + 0.26 + 0.16 + 0.02) = 0.3$
 따라서 구하는 학생 수는
 $50 \times 0.3 = 15$ (명)

16 (1) A 제품을 구매한 20대 고객 수는 $1800 \times 0.18 = 324$ (명)
 B 제품을 구매한 20대 고객 수는 $2200 \times 0.17 = 374$ (명)
 따라서 20대 고객들이 더 많이 구매한 제품은 B 제품이다.

(2)

나이(세)	상대도수		고객 수(명)	
	A 제품	B 제품	A 제품	B 제품
10 ^{이상} ~20 ^{미만}	0.09	0.16	162	352
20 ~ 30	0.18	0.17	324	374
30 ~ 40	0.22	0.18	396	396
40 ~ 50	0.31	0.26	558	572
50 ~ 60	0.2	0.23	360	506
합계	1	1	1800	2200

따라서 A, B 두 제품의 구매 고객 수가 같은 계급은 30세 이상 40세 미만이다.

17 도수의 총합의 비가 1 : 2이므로 도수의 총합을 각각 a , $2a$ (a 는 자연수)라 하고,
 어떤 계급의 도수의 비가 5 : 4이므로 이 계급의 도수를 각각 $5b$, $4b$ (b 는 자연수)라고 하면
 이 계급의 상대도수의 비는
 $\frac{5b}{a} : \frac{4b}{2a} = 5 : 2$

18 ㄱ. 2학년에 대한 그래프가 1학년에 대한 그래프보다 전체적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 2학년이 1학년보다 독서 시간이 더 긴 편이다.
 ㄴ. 2학년에 대한 그래프가 1학년에 대한 그래프보다 위쪽에 있는 계급을 찾으면 5시간 이상 6시간 미만, 6시간 이상 7시간 미만이다.
 ㄷ. 독서 시간이 4시간 이상 5시간 미만인 학생 수는
 1학년: $100 \times 0.3 = 30$ (명)
 2학년: $125 \times 0.28 = 35$ (명)
 따라서 독서 시간이 4시간 이상 5시간 미만인 학생은 1학년보다 2학년이 더 많다.
 ㄹ. 2학년에서 독서 시간이 5시간 이상인 계급의 상대도수의 합은 $0.28 + 0.08 = 0.36$ 이므로
 2학년 전체의 $0.36 \times 100 = 36$ (%)이다.
 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

STEP 3 **쓱쓱 서술형 완성하기** P. 156~157

<과정은 풀이 참조>

따라 해보자 유제 1 12일 유제 2 10명

연습해 보자 1 22명, 47 kg 2 8권

3 30%

4 (1) 볼링 동호회 (2) 볼링 동호회

따라 해보자

유제 1 (1단계) 기온이 20°C 이상 22°C 미만인 날수는 전체의 20%이므로
 $40 \times \frac{20}{100} = 8$ (일) ... (i)

(2단계) 기온이 22°C 이상 24°C 미만인 날수는
 $40 - (4 + 7 + 8 + 6 + 3) = 12$ (일) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 기온이 20°C 이상 22°C 미만인 날수 구하기	50%
(ii) 기온이 22°C 이상 24°C 미만인 날수 구하기	50%

유제 2 (1단계) 기록이 10 m 이상 15 m 미만인 계급의 상대도수는 0.05, 도수는 2명이므로
 (전체 학생 수) = $\frac{2}{0.05} = 40$ (명) ... (i)

(2단계) 기록이 30 m 이상인 계급의 상대도수의 합은
 $0.2 + 0.05 = 0.25$ 이므로
 구하는 학생 수는
 $40 \times 0.25 = 10$ (명) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 전체 학생 수 구하기	50%
(ii) 기록이 30 m 이상인 학생 수 구하기	50%

연습해 보자

1 전체 학생 수는 전체 앞의 개수와 같으므로
 (전체 학생 수) = $6 + 7 + 5 + 4 = 22$ (명) ... (i)
 몸무게가 가벼운 학생의 몸무게부터 차례로 나열하면
 41 kg, 43 kg, 45 kg, 46 kg, 47 kg, ...이므로 몸무게가 가벼운 쪽에서 5번째인 학생의 몸무게는 47 kg이다. ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 전체 학생 수 구하기	50%
(ii) 몸무게가 가벼운 쪽에서 5번째인 학생의 몸무게 구하기	50%

2 전체 학생 수는
 $5 + 7 + 9 + 4 + 3 + 2 = 30$ (명)이므로 ... (i)
 상위 30% 이내에 속하는 학생 수는
 $30 \times \frac{30}{100} = 9$ (명) ... (ii)

읽은 책의 수가 많은 계급부터 학생 수를 차례로 나열하면
 12권 이상 14권 미만인 계급의 학생 수는 2명,
 10권 이상 12권 미만인 계급의 학생 수는 3명,
 8권 이상 10권 미만인 계급의 학생 수는 4명이다.
 따라서 읽은 책의 수가 많은 쪽에서 9번째인 학생이 속하는
 계급은 8권 이상 10권 미만이므로 상위 30% 이내에 속하려
 면 8권 이상의 책을 읽어야 한다. ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 전체 학생 수 구하기	30%
(ii) 상위 30% 이내에 속하는 학생 수 구하기	30%
(iii) 상위 30% 이내에 속하려면 몇 권 이상의 책을 읽어야 하는지 구하기	40%

3 (전체 학생 수) = $\frac{5}{0.1} = 50$ (명)이므로 ... (i)
 타자 수가 300타 이상 350타 미만인 계급의 상대도수는
 $\frac{11}{50} = 0.22$... (ii)
 따라서 타자 수가 300타 이상인 계급의 상대도수의 합은
 $0.22 + 0.08 = 0.3$ 이므로 타자 수가 300타 이상인 학생은 전
 체의 $0.3 \times 100 = 30$ (%)이다. ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 전체 학생 수 구하기	30%
(ii) 타자 수가 300타 이상 350타 미만인 계급의 상대도수 구하기	30%
(iii) 타자 수가 300타 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하기	40%

4 (1) 전체 회원 수는
 테니스 동호회가 $\frac{120}{0.4} = 300$ (명),
 볼링 동호회가 $\frac{80}{0.25} = 320$ (명)이므로 ... (i)
 전체 회원 수가 더 많은 곳은 볼링 동호회이다. ... (ii)
 (2) 볼링 동호회에 대한 그래프가 테니스 동호회에 대한 그래
 프보다 전체적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 회원들
 의 연령대는 볼링 동호회가 테니스 동호회보다 더 높다고
 할 수 있다. ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 테니스 동호회와 볼링 동호회의 전체 회원 수 구하기	40%
(ii) 전체 회원 수가 더 많은 동호회 구하기	10%
(iii) 회원들의 연령대가 대체적으로 더 높은 동호회 구하기	50%

생활 속 수학 P. 158

답 60곳
 농도가 $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 계급의 상대도수는
 $1 - (0.05 + 0.05 + 0.25 + 0.2 + 0.15) = 0.3$
 따라서 농도가 $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 계급의 지역
 의 수는
 $200 \times 0.3 = 60$ (곳)

memo

memo

memo


1 기본 도형


1 점, 선, 면, 각


유형 1 P.6


1 (1) ○ (2) ○ (3) ×


2 교점: 8개, 교선: 12개

3 (1)  , 무수히 많다.

(2)  , 1개

4 (1) 

(2) 

(3) 

5 (1) \overrightarrow{MN} (2) \overline{MN} (또는 \overline{NM})
 (3) \overline{NM} (4) \overrightarrow{MN} (또는 \overrightarrow{NM})

6 (1) = (2) ≠ (3) = (4) =

유형 3 P.8

1 (1) 예 (2) 둔 (3) 예 (4) 직 (5) 평 (6) 예 (7) 둔

2 (1) 180, 60 (2) 180, 80

3 (1) 30° (2) 30°

유형 4 P.9

1 (1) ∠BOD (2) ∠AOF (3) ∠COE
 (4) ∠DOE (5) ∠BOC (6) ∠BOF

2 (1) 140, 180, 40 (2) x, 30, 180, 150

3 (1) 80 (2) 20

4 (1) 70° (2) 50°

유형 5 P.10

1 (1) \overleftrightarrow{CD} (또는 \overleftrightarrow{CO} 또는 \overleftrightarrow{OD})
 (2) 점 O
 (3) $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$
 (4) \overleftrightarrow{AO}
 (5) \overleftrightarrow{AB} (또는 \overleftrightarrow{AO} 또는 \overleftrightarrow{OB})

2 (1) 점 B (2) 점 A (3) \overleftrightarrow{AB}

3 (1) 점 B (2) 점 D (3) \overleftrightarrow{BD}

4 6cm

유형 2 P.7

1 (1) 8cm (2) 9cm

2 (1) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 3$ (2) 2, 2, 10

3 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ (3) 2, 4 (4) 8, 16

4 (1) 2배 (2) 6cm

쌍둥이 기출문제 P.11~13

1 ④ 2 ③ 3 ③ 4 6 5 ①

6 ③ 7 (1) 3개 (2) 6개 8 (1) 6개 (2) 12개

9 ② 10 30cm 11 ③ 12 50°

13 ∠a=120°, ∠b=60° 14 ② 15 ③

16 25 17 ①, ⑤ 18 ④

2 점, 직선, 평면의 위치 관계

유형 6

P. 14

- 1 (1) 점 B, 점 E
(2) 점 A, 점 C, 점 E
(3) 점 A, 점 C, 점 D
(4) 점 D
- 2 (1) 점 A, 점 B
(2) 점 A, 점 B, 점 C, 점 D
(3) \overline{AC} , \overline{BC} , \overline{CF}
(4) 점 A, 점 D
- 3 (1) \overline{AB} , \overline{BF} , \overline{CD} , \overline{CG}
(2) \overline{AD} , \overline{EH} , \overline{FG}
(3) \overline{AE} , \overline{DH} , \overline{EF} , \overline{HG}
- 4 (1) \overline{CD} (2) \overline{BD} (3) \overline{BC}

유형 7

P. 15

- 1 (1) 면 ABCD, 면 AEHD
(2) 면 ABFE, 면 CGHD
(3) 면 BFGC, 면 EFGH
- 2 (1) \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CD} , \overline{DA}
(2) \overline{AE} , \overline{BF} , \overline{CG} , \overline{DH}
(3) \overline{AB} , \overline{EF} , \overline{HG} , \overline{DC}
(4) \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CD} , \overline{DA}
- 3 (1) \overline{BC}
(2) 면 ABCD, 면 ABFE, 면 EFGH, 면 CGHD
(3) 면 ABCD, 면 BFGC, 면 EFGH, 면 AEHD
(4) 면 BFGC
- 4 (1) × (2) ○ (3) ×

쌍둥이 기출문제

P. 16

- 1 ③ 2 \overline{CG} , \overline{DH} , \overline{EH} , \overline{FG} 3 ⑤
- 4 ⑤ 5 ② 6 나, 다

3 동위각과 엇각

유형 8

P. 17

- 1 (1) 130 (2) e, 50 (3) c, 110 (4) 70
- 2 $\angle a=125^\circ$, $\angle b=55^\circ$, $\angle c=55^\circ$
- 3 $\angle d=80^\circ$, $\angle e=80^\circ$, $\angle f=100^\circ$, $\angle g=80^\circ$, $\angle h=100^\circ$
- 4 $\angle x=60^\circ$, $\angle y=60^\circ$
- 5 $\angle x=50^\circ$, $\angle y=70^\circ$, $\angle z=70^\circ$
- 6 $\angle x=75^\circ$, $\angle y=45^\circ$

유형 9

P. 18

- 1 80° 2 100° 3 58° 4 125° 5 100°
- 6 40° 7 130° 8 15°

유형 10

P. 19

- 1 (1) 120° , 평행하다. (2) 110° , 평행하지 않다.
(3) 100° , 평행하지 않다. (4) 50° , 평행하다.
- 2 다, 르
- 3 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○

쌍둥이 기출문제

P. 20~21

- 1 ④ 2 ③ 3 ③ 4 15° 5 ④
- 6 ① 7 95° 8 27° 9 ④ 10 64°
- 11 ② 12 나, 다

단원 마무리

P. 22~23

- 1 1 2 9 cm 3 24° 4 20 5 ④, ⑤
- 6 ② 7 ⑤ 8 22 9 25°

2 작도와 합동

1 삼각형의 작도

유형 1 P. 26

1 \square, \square
 2 (1) \times (2) \times (3) \circ (4) \circ 3 컴퍼스
 4 $P, \overline{AB}, P, \overline{AB}, Q$ 5 $\ominus \rightarrow \omin� \rightarrow \omin�$

유형 2 P. 27

1 A, B, C, \overline{AB}
 2 (1) $\omin�, \omin�, \omin�$ (2) 동위각
 3 (1) $\omin�, \omin�, \omin�$ (2) 엇각

유형 3 P. 28

1 (1) \overline{BC} (2) \overline{AC} (3) \overline{AB} (4) $\angle C$ (5) $\angle A$ (6) $\angle B$
 2 (1) 3 cm (2) 4 cm (3) 80°
 3 (1) \times (2) \times (3) \circ (4) \times (5) \circ (6) \circ (7) \circ (8) \times

유형 4 P. 29

1 (1) \times (2) \circ (3) \circ (4) \circ
 2 a, $\angle XBC, \angle YCB, A$

유형 5 P. 30

1 (1) \times
 이유: (가장 긴 변의 길이) > (나머지 두 변의 길이의 합)
 이므로 삼각형이 그려지지 않는다.
 (2) \circ
 이유: (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)
 이므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 (3) \times
 이유: 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어졌으므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 (4) \circ
 이유: 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌으므로 삼각형이 하나로 정해진다.

(5) \circ
 이유: 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌으므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 (6) \circ
 이유: $\angle B = 180^\circ - (30^\circ + 60^\circ) = 90^\circ$, 즉 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 알 수 있으므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 (7) \times
 이유: 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.

2 (1) \circ (2) \circ (3) \times (4) \times

쌍둥이 기출문제 P. 31~33

1 ⑤ 2 ②, ④ 3 $\omin� \rightarrow \omin� \rightarrow \omin�$ 4 ④
 5 $\omin� \rightarrow \omin� \rightarrow \omin� \rightarrow \omin� \rightarrow \omin�$ 6 ③ 7 ②, ⑤
 8 ③ 9 ③ 10 ⑤ 11 \square, \square 12 ③
 13 ④ 14 ① 15 $\omin�$ 16 $\square, \square, \square$

2 삼각형의 합동

유형 6 P. 34

1 (1) $\overline{EF}, 10$ (2) 5 cm (3) 60° (4) 30°
 2 $a=60, b=75, c=60, x=6$
 3 (1) \circ (2) \circ (3) \circ (4) \times (5) \times (6) \circ (7) \circ

유형 7 P. 35

1 (1) SAS 합동 (2) SSS 합동 (3) ASA 합동
 2 $\triangle ABC \equiv \triangle HIG \equiv \triangle PRQ$
 3 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle CDB$ (2) ASA 합동

쌍둥이 기출문제

P. 36~37

- 1 ④ 2 ①, ④ 3 ③ 4 $x=5, a=60$
 5 ① 6 \sphericalangle 과 \sphericalangle , SAS 합동 7 ①, ④
 8 ③ 9 (가) \sphericalangle DMC (나) \sphericalangle D (다) ASA
 10 ③ 11 (가) \overline{OC} (나) \overline{OD} (다) \sphericalangle O (라) SAS
 12 (1) $\triangle COB$, SAS 합동 (2) 98°

단원 마무리

P. 38~39

- 1 $\text{㉠} \rightarrow \text{㉡} \rightarrow \text{㉢} \rightarrow \text{㉣} \rightarrow \text{㉤}$ 2 ③ 3 ⑤
 4 \sphericalangle , \sphericalangle 5 ③ 6 ③, ⑤ 7 3개 8 ⑤

3 다각형

1 다각형

유형 1

P. 42

- 1 \sphericalangle , \square 2 (1) 내각 (2) 외각 (3) 180
 3 (1) 180, 130 (2) 95° (3) 65°
 4 (1) 정오각형 (2) 정구각형
 5 (1) ○ (2) ○ (3) × (4) ×

유형 2

P. 43

- 1 (1) 3개 (2) 5개
 2 (1) 4개, 1개, 2개 (2) 5개, 2개, 5개 (3) 6개, 3개, 9개 (4) 7개, 4개, 14개
 3 (1) 35개 (2) 54개 (3) 90개 (4) 170개
 4 (1) 십일각형 (2) 44개
 5 20, 40, 8, 8, 팔각형 6 십삼각형

쌍둥이 기출문제

P. 44

- 1 25 2 ⑤ 3 ③ 4 ①
 5 정십팔각형 6 ② 7 ④ 8 ②

2 삼각형의 내각과 외각


유형 3

P. 45

- 1 (1) 25° (2) 115° 2 (1) 16 (2) 35
 3 45° 4 (1) 105° (2) 135°
 5 (1) 120° (2) 60° 6 (1) 35° (2) 30°

한 걸음 더 연습

P. 46

- 1 (1) 30° (2) 105° 2 180, 50, 180, 130
 3 
 $\therefore \angle x = 90^\circ$
 4 $a+c, b+e, \angle a+\angle c, \angle b+\angle e, 180$

쌍둥이 기출문제

P. 47~48

- 1 30° 2 50 3 15° 4 90° 5 ④
 6 40° 7 ③ 8 40° 9 (1) 26° (2) 74°
 10 80° 11 110° 12 83° 13 105° 14 34°
 15 ③ 16 45°

3 다각형의 내각과 외각

유형 4

P. 49

다각형	한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수	내각의 크기의 합
오각형	3개	$180^\circ \times 3 = 540^\circ$
육각형	4개	$180^\circ \times 4 = 720^\circ$
칠각형	5개	$180^\circ \times 5 = 900^\circ$
팔각형	6개	$180^\circ \times 6 = 1080^\circ$
⋮	⋮	⋮
n 각형	$(n-2)$ 개	$180^\circ \times (n-2)$

- 2 (1) 1440° (2) 1800° (3) 2340° (4) 2880°
 3 (1) 육각형 (2) 구각형 (3) 십일각형 (4) 십사각형
 4 (1) 135° (2) 100° 5 (1) 130° (2) 82°

유형 5 P. 50

1 5, 3, 5, 3, 360, 360 2 (1) 360° (2) 360°
 3 (1) 100° (2) 110° 4 (1) 100° (2) 53°
 5 (1) 55° (2) 60° (3) 70°

유형 6 P. 51

1 (1) 10, 8, 1440, 144 (2) 360, 36

2

정다각형	한 내각의 크기
(1) 정오각형	$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$
(2) 정팔각형	$\frac{180^\circ \times (8-2)}{8} = 135^\circ$
(3) 정십오각형	$\frac{180^\circ \times (15-2)}{15} = 156^\circ$

3

정다각형	한 외각의 크기
(1) 정육각형	$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$
(2) 정구각형	$\frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$
(3) 정십이각형	$\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$

4 (1) 정구각형 (2) 정십팔각형
 5 (1) 정십오각형 (2) 정이십각형
 6 1, 45, 45, 8, 정팔각형

쌍둥이 기출문제 P. 52~53

1 1267 2 900° 3 ③ 4 정십각형
 5 110° 6 90° 7 ③ 8 ② 9 144°
 10 ⑤ 11 ① 12 정십이각형
 13 (1) 20° (2) 정십팔각형 14 ①

단원 마무리 P. 54~55

1 55 2 ③, ⑤ 3 ⑤ 4 45° 5 36°
 6 ⑤ 7 ④ 8 177 9 5개
 10 정육각형

4 원과 부채꼴

1 원과 부채꼴

유형 1 P. 58

1

2 (1) \overline{OA} , \overline{OB} , \overline{OE} (2) \overline{BE} , \overline{CD} (3) \overline{BE}
 (4) \widehat{AB} (5) $\angle AOE$ (6) 180°

3 (1) × (2) ○ (3) × (4) ○

유형 2 P. 59

1

중심각의 크기	호의 길이	부채꼴의 넓이
$\angle a$	2 cm	4 cm^2
$2\angle a$	4 cm	8 cm^2
$3\angle a$	6 cm	12 cm^2
$4\angle a$	8 cm	16 cm^2

⇒ 정비례

2 (1) 12 (2) 55 3 (1) 30 (2) 6
 4 (1) 120 (2) 4 5 (1) 6 (2) 30
 6 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

쌍둥이 기출문제 P. 60~61

1 ④ 2 ②, ③ 3 120° 4 ③ 5 2 cm^2
 6 60 7 168° 8 72°
 9 40, 40, 180, 100, 40, 100, 4 10 ② 11 ②
 12 ⑤

2 부채꼴의 호의 길이와 넓이

유형 3

P. 62

- 1 (1) $l: 6\pi$ cm, $S: 9\pi$ cm²
 (2) $l: 14\pi$ cm, $S: 49\pi$ cm²
 (3) $l: (6\pi + 12)$ cm, $S: 18\pi$ cm²
- 2 (1) $l: 24\pi$ cm, $S: 24\pi$ cm²
 (2) $l: 12\pi$ cm, $S: 12\pi$ cm²
 (3) $l: 14\pi$ cm, $S: 12\pi$ cm²
 (4) $l: 16\pi$ cm, $S: 24\pi$ cm²

유형 4

P. 63

- 1 (1) $l: \pi$ cm, $S: \frac{3}{2}\pi$ cm²
 (2) $l: 14\pi$ cm, $S: 84\pi$ cm²
- 2 (1) 72° (2) 160°
- 3 (1) 2π cm² (2) 135π cm²
- 4 (1) 10 cm (2) 3 cm
- 5 (1) $\frac{4}{3}\pi$ cm (2) 3π cm
- 6 (1) $(6\pi + 20)$ cm (2) 30π cm²

한 걸음 더 연습

P. 64

- 1 $l: 16\pi$ cm, $S: 32\pi$ cm²
- 2 $\frac{10}{3}\pi$ cm
- 3 216°
- 4 (1) $(72\pi - 144)$ cm² (2) $(8\pi - 16)$ cm²
- 5 (1) 32 cm² (2) 200 cm²

쌍둥이 기출문제

P. 65~67

- 1 (1) 24π cm (2) 48π cm²
- 2 20π cm, 12π cm²
- 3 $(\pi + 8)$ cm, 2π cm²
- 4 $(12\pi + 18)$ cm, 54π cm²
- 5 ⑤
- 6 80°
- 7 6 cm
- 8 ②
- 9 $(6\pi + 6)$ cm, 9π cm²
- 10 $(\frac{9}{2}\pi + 10)$ cm, $\frac{45}{4}\pi$ cm²
- 11 (1) $(10\pi + 10)$ cm (2) $\frac{25}{2}\pi$ cm²
- 12 $(8\pi + 8)$ cm, 8π cm²
- 13 9π cm, $(\frac{81}{2}\pi - 81)$ cm²
- 14 $(6\pi + 24)$ cm, $(72 - 18\pi)$ cm²
- 15 49 cm²
- 16 $(25\pi - 50)$ cm²
- 17 12π cm²
- 18 8π cm²

단원 마무리

P. 68~69

- 1 ③ 2 ③ 3 15 cm 4 ④ 5 ①
- 6 6π cm 7 ④ 8 8π cm²

5 다면체와 회전체

1 다면체

유형 1

P. 72~73

입체도형					
다면체이면 ○, 아니면 ×	○	○	○	×	×

입체도형					n 각기둥
이름	삼각기둥	사각기둥	오각기둥	육각기둥	
몇 면체?	오면체	육면체	칠면체	팔면체	$(n+2)$ 면체
꼭짓점의 개수	6개	8개	10개	12개	$2n$ 개
모서리의 개수	9개	12개	15개	18개	$3n$ 개

입체도형					n 각뿔
이름	삼각뿔	사각뿔	오각뿔	육각뿔	
몇 면체?	사면체	오면체	육면체	칠면체	$(n+1)$ 면체
꼭짓점의 개수	4개	5개	6개	7개	$(n+1)$ 개
모서리의 개수	6개	8개	10개	12개	$2n$ 개

입체도형					n 각뿔대
이름	삼각뿔대	사각뿔대	오각뿔대	육각뿔대	
몇 면체?	오면체	육면체	칠면체	팔면체	$(n+2)$ 면체
꼭짓점의 개수	6개	8개	10개	12개	$2n$ 개
모서리의 개수	9개	12개	15개	18개	$3n$ 개

- 5 (1) 구면체 (2) 구면체 (3) 십일면체
 6 (1) 직사각형 (2) 삼각형 (3) 사다리꼴
 7 (1) 16개, 24개 (2) 10개, 18개 (3) 14개, 21개
 8 팔각기둥 9 육각뿔대 10 오각뿔

쌍둥이 기출문제

P. 74~75

- 1 ⑤ 2 3개 3 ② 4 ④ 5 ③
 6 ① 7 ② 8 46 9 ⑤ 10 ④
 11 ② 12 ④ 13 ①, ⑤ 14 ②, ⑤ 15 ③
 16 팔각뿔

2 정다면체

유형 2

P. 76

1	개념도					
	이름	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
	면의 모양	정삼각형	정사각형	정삼각형	정오각형	정삼각형
	한 꼭짓점에 모인 면의 개수	3개	3개	4개	3개	5개
	꼭짓점의 개수	4개	8개	6개	20개	12개
	모서리의 개수	6개	12개	12개	30개	30개
	면의 개수	4개	6개	8개	12개	20개

- 2 (1) × (2) ○ (3) ○ (4) × (5) ×
 3 정사면체 4 정육면체

유형 3

P. 77

- 1 (1) 정사면체 (2) 4, 6
 (3) ⇒
 (4) E, \overline{ED}
 2 (1) 정육면체 (2) 8개, 12개
 (3) ⇒
 (4) 4개
 3 (1) 정팔면체 (2) 6개, 12개 (3) 4개
 (4) ⇒
 (5) 점 I, \overline{HG}

쌍둥이 기출문제

P. 78

- 1 18 2 70 3 12개 4 42 5 ③
 6 ㄱ, ㄴ 7 ⑤ 8 ③

3 회전체

유형 4

P. 79

1 ㄱ, ㄷ, ㄴ

2					
평면도형					
회전체					

3 (1) ㄴ (2) ㄷ (3) ㄱ

유형 5

P. 80

1 (1) ㉠ (2) ㉡ (3) ㉢ (4) ㉣

2 (1) ㉠ (2) ㉢ (3) ㉡ (4) ㉣

3 (1) 원기둥 (2) 원, $25\pi \text{ cm}^2$ (3) 직사각형, 80 cm^2

4 (1) 원뿔 (2) 이등변삼각형, 28 cm^2

유형 6

P. 81

1 (1) $a=5, b=8$ (2) $a=10, b=6$ (3) $a=8, b=5$

2 $10\pi, 5, 5$ 3 둘레, $5, 10\pi$

쌍둥이 기출문제

P. 82~83

1 ㉢ 2 ㉣ 3 ㉡ 4 ㉤ 5 ㉠

6 ㉢ 7 ㉡ 8 ㉢ 9 ㉣ 10 $12\pi \text{ cm}$

11 ㉢ 12 ㉠, ㉢

단원 마무리

P. 84~85

1 ㉤ 2 8 3 21개 4 ㉡, ㉢ 5 ㉤

6 ㉣ 7 ㉢ 8 ㄱ, ㄴ

6 입체도형의 겉넓이와 부피

1 기둥의 겉넓이와 부피

유형 1

P. 88

1 5, 3, (1) 6 cm^2 (2) 96 cm^2 (3) 108 cm^2

2 6π , (1) $9\pi \text{ cm}^2$ (2) $42\pi \text{ cm}^2$ (3) $60\pi \text{ cm}^2$

3 (1) 236 cm^2 (2) 300 cm^2 (3) $130\pi \text{ cm}^2$ (4) 276 cm^2

유형 2

P. 89

1 (1) 160 cm^3 (2) $100\pi \text{ cm}^3$

2 (1) $9 \text{ cm}^2, 7 \text{ cm}, 63 \text{ cm}^3$

(2) $12 \text{ cm}^2, 5 \text{ cm}, 60 \text{ cm}^3$

(3) $24 \text{ cm}^2, 8 \text{ cm}, 192 \text{ cm}^3$

(4) $16\pi \text{ cm}^2, 7 \text{ cm}, 112\pi \text{ cm}^3$

(5) $25\pi \text{ cm}^2, 6 \text{ cm}, 150\pi \text{ cm}^3$

3 (1) 45 cm^2 (2) 360 cm^3

4 $108\pi, 12\pi, 120\pi$

5 $80\pi, 5\pi, 75\pi$

쌍둥이 기출문제

P. 90~91

1 $168 \text{ cm}^2, 120 \text{ cm}^3$

2 $136 \text{ cm}^2, 96 \text{ cm}^3$

3 $80\pi \text{ cm}^2, 96\pi \text{ cm}^3$

4 $192\pi \text{ cm}^2, 360\pi \text{ cm}^3$

5 30 cm^3

6 $72\pi \text{ cm}^3$

7 6

8 5 cm

9 $(28\pi + 48) \text{ cm}^2, 24\pi \text{ cm}^3$

10 $(20\pi + 42) \text{ cm}^2, 21\pi \text{ cm}^3$

11 72 cm^3

12 $270\pi \text{ cm}^3$

2 볼의 겉넓이와 부피

유형 3

P. 92~93

- 1 12, (1) 64 cm^2 (2) 192 cm^2 (3) 256 cm^2
- 2 (1) 161 cm^2 (2) 95 cm^2
- 3 12, (1) $8\pi\text{ cm}$ (2) $16\pi\text{ cm}^2$ (3) $48\pi\text{ cm}^2$
(4) $64\pi\text{ cm}^2$
- 4 (1) $96\pi\text{ cm}^2$ (2) $90\pi\text{ cm}^2$
- 5 (1) 9 (2) 25 (3) 16, 64 (4) 34, 64, 98
- 6 (1) 224 cm^2 (2) 120 cm^2
- 7 (1) 9π (2) 36π (3) $60\pi, 15\pi, 45\pi$
(4) $45\pi, 45\pi, 90\pi$
- 8 (1) $38\pi\text{ cm}^2$ (2) $66\pi\text{ cm}^2$


유형 4

P. 94

- 1 (1) 80 cm^3 (2) $70\pi\text{ cm}^3$
- 2 (1) $36\text{ cm}^2, 7\text{ cm}, 84\text{ cm}^3$
(2) $10\text{ cm}^2, 6\text{ cm}, 20\text{ cm}^3$
(3) $25\pi\text{ cm}^2, 12\text{ cm}, 100\pi\text{ cm}^3$
(4) $49\pi\text{ cm}^2, 9\text{ cm}, 147\pi\text{ cm}^3$
- 3 (1) 72, 9, 63 (2) $96\pi, 12\pi, 84\pi$
- 4 (1) 56 cm^3 (2) $105\pi\text{ cm}^3$

쌍둥이 기출문제

P. 95~96

- 1 ④ 2 $48\pi\text{ cm}^2$ 3 117 cm^2
- 4 $99\pi\text{ cm}^2$ 5 (1) 75 cm^3 (2) 93 cm^3
- 6 (1) $32\pi\text{ cm}^3$ (2) $416\pi\text{ cm}^3$
- 7 (1)  (2) $12\pi\text{ cm}^3$
- 8 $96\pi\text{ cm}^3$
- 9 (1) 10 cm^2 (2) 20 cm^3 10 $\frac{32}{3}\text{ cm}^3$
- 11 21 cm^3 12 ①

3 구의 겉넓이와 부피

유형 5

P. 97

- 1 (1) 10^2 (또는 100), 400π (2) $324\pi\text{ cm}^2$
- 2 (1) $72\pi, 36\pi, 108\pi$ (2) $192\pi\text{ cm}^2$
- 3 (1) $65\pi\text{ cm}^2$ (2) $50\pi\text{ cm}^2$ (3) $115\pi\text{ cm}^2$
- 4 (1) $12\pi\text{ cm}^2$ (2) $4\pi\text{ cm}^2$ (3) $16\pi\text{ cm}^2$

유형 6

P. 98

- 1 (1) 9^3 (또는 729), 972π (2) $\frac{500}{3}\pi\text{ cm}^3$
- 2 (1) $\frac{16}{3}\pi$ (2) $\frac{686}{3}\pi\text{ cm}^3$
- 3 $\frac{63}{2}\pi\text{ cm}^3$
- 4 (1) $18\pi\text{ cm}^3$ (2) $36\pi\text{ cm}^3$ (3) $54\pi\text{ cm}^3$ (4) 1 : 2 : 3

쌍둥이 기출문제

P. 99

- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 $144\pi\text{ cm}^2$ | 2 $300\pi\text{ cm}^2$ | 3 $132\pi\text{ cm}^2$ |
| 4 $68\pi\text{ cm}^2$ | 5 $216\pi\text{ cm}^3$ | 6 $\frac{560}{3}\pi\text{ cm}^3$ |
| 7 2 : 3 | 8 $16\pi\text{ cm}^3$ | |

단원 마무리

P. 100~101

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 $100\pi\text{ cm}^2$ | 2 ③ | 3 $\frac{100}{3}\pi\text{ cm}^3$ |
| 4 15 cm | 5 $\frac{485}{3}\text{ cm}^3$ | 6 6 cm |
| 7 ③ | 8 ⑤ | 9 ② |

7 자료의 정리와 해석

1 줄기와 잎 그림, 도수분포표

유형 1

P. 104

1 주민들의 나이
(1|0은 10세)

줄기	잎
1	0 1 3 5 6 7
2	1 3 4 4 9
3	3 5 6 7 7 8 8
4	0 1 2 4
5	2 7

2 (1) 십, 일 (2) 3, 4, 5, 24 (3) 3, 4, 4, 9

3 2 4 20명 5 6명 6 34회

유형 2

P. 105

1

봉사 활동 시간(시간)	학생 수(명)	
0 이상 ~ 4 미만	/	1
4 ~ 8	///	8
8 ~ 12	/// // /	11
12 ~ 16	///	5
16 ~ 20	//	2
합계	27	

2 (1) 5 (2) 4 (3) 11, 8, 12


3 6권 4 12권 이상 18권 미만

5 18명 6 6권 이상 12권 미만

2 히스토그램과 도수분포다각형

유형 3

P. 108




2 30분, 6개 3 150분 이상 180분 미만

4 30명 5 10% 6 900

유형 4

P. 109



2 4만 원, 6개 3 16만 원 이상 20만 원 미만

4 40명 5 30% 6 160

한 번 더 연습

P. 110

1 8명 2 25명 3 40분 이상 50분 미만

4 36% 5 가, 나, 르 6 40명

7 70점 이상 80점 미만 8 45% 9 400

10 가, 르

쌍둥이 기출문제

P. 106~107

1 (1) 70점대 (2) 89점 (3) 10명

2 ④ 3 ④ 4 ②, ④

5 (1) 5개 (2) 0.5 kg (3) 2명
(4) 3.0 kg 이상 3.5 kg 미만 (5) 20%

6 ③, ⑤ 7 (1) 7명 (2) 8명

8 A=9, B=8

쌍둥이 기출문제

P. 111~112

1 (1) 32명 (2) 64 2 120

3 (1) 9명 (2) 40% 4 25%

5 (1) 20명 (2) 75회 이상 80회 미만 (3) 30%

6 ④ 7 (1) 10명 (2) 15명

8 12명

3 상대도수와 그 그래프

유형 5

P. 113

1

졸년기 기록(회)	학생 수(명)	상대도수
80 ^{이상} ~100 ^{미만}	4	0.08
100 ~120	6	0.12
120 ~140	16	0.32
140 ~160	14	0.28
160 ~180	8	0.16
180 ~200	2	0.04
합계	50	A

- 2 1 3 (1) 0.3, 9 (2) 0.48, 25
 4 $A=20, B=0.15, C=5, D=2$
 5 0.3 6 15%

- 2 30분 이상 40분 미만
 3 B 중학교
 4 A 모둠
 5 8시간 이상 9시간 미만, 9시간 이상 10시간 미만
 6 B 모둠


쌍둥이 기출문제

P. 116~118

- 1 (1) 40명 (2) 0.2 2 (1) 20명 (2) 0.3
 3 (1) $A=0.1, B=12, C=1$ (2) 20%
 4 (1) 50명 (2) $A=0.1, B=15, C=0.2$ (3) 64%
 5 (1) 7명 (2) 0.16 6 (1) 18그룹 (2) 0.25
 7 (1) 40명 (2) 14명 8 6명
 9 (1) 1학년 (2) 2개 10 (1) A 중학교 (2) 3개
 11 (1) 5명 (2) B반 12 르, 모

유형 6

P. 114



- 2 13명 3 52% 4 0.05 5 21명 6 20%
 7 15명

단원 마무리

P. 119~120

- 1 ③ 2 $A=17, B=4$ 3 9명 4 ②, ④
 5 (1) 64% (2) 4명 6 0.2 7 ④

유형 7

P. 115

1


걸리는 시간(분)	A 중학교		B 중학교	
	학생 수(명)	상대도수	학생 수(명)	상대도수
10 ^{이상} ~20 ^{미만}	40	0.08	8	0.02
20 ~30	90	0.18	20	0.05
30 ~40	150	0.3	120	0.3
40 ~50	130	0.26	128	0.32
50 ~60	80	0.16	100	0.25
60 ~70	10	0.02	24	0.06
합계	500	1	400	1

1 점, 선, 면, 각

유형 1

P.6

- (1) ○ (2) ○ (3) ×
- 교점: 8개, 교선: 12개
- (1) 그림은 풀이 참조, 무수히 많다.
(2) 그림은 풀이 참조, 1개




- (1) \overline{MN} (2) \overline{MN} (또는 \overline{NM})
(3) \overline{NM} (4) \overline{MN} (또는 \overline{NM})
- (1) = (2) ≠ (3) = (4) =

- (3) 오른쪽 그림과 같이 교점은 선과 면이 만나는 경우에도 생긴다.



- (교점의 개수) = (꼭짓점의 개수) = 8(개)
(교선의 개수) = (모서리의 개수) = 12(개)

참고 평면으로만 둘러싸인 입체도형에서
• (교점의 개수) = (꼭짓점의 개수)
• (교선의 개수) = (모서리의 개수)



- (1)
- ⇒ 한 점을 지나는 직선은 무수히 많다.

- (2)
- ⇒ 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.

- (2) \overrightarrow{BA} 와 \overrightarrow{BC} 는 시작점은 점 B로 같지만 뻗어 나가는 방향이 다르므로 서로 다른 반직선이다.

유형 2

P.7

- (1) 8 cm (2) 9 cm
- (1) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 3$ (2) 2, 2, 10
- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ (3) 2, 4 (4) 8, 16
- (1) 2배 (2) 6 cm

- (1) $\overline{AM} = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ (cm)
(2) $\overline{AB} = 2 \overline{AM} = 2 \times 5 = 10$ (cm)

- (1) $\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$
(2) $\overline{AN} = \overline{NM} = \frac{1}{2} \overline{AM}$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{4} \overline{AB}$
(3) $\overline{AB} = 2 \overline{AM} = 2 \times 2 \overline{AN} = 4 \overline{AN}$
(4) $\overline{AM} = 2 \overline{AN} = 2 \times 4 = 8$ (cm)
 $\overline{AB} = 2 \overline{AM} = 2 \times 8 = 16$ (cm)

- (1) 두 점 M, N이 각각 \overline{AB} , \overline{BC} 의 중점이므로
 $\overline{AB} = 2 \overline{MB}$, $\overline{BC} = 2 \overline{BN}$
 $\therefore \overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$
 $= 2 \overline{MB} + 2 \overline{BN}$
 $= 2(\overline{MB} + \overline{BN}) = 2 \overline{MN}$
따라서 \overline{AC} 의 길이는 \overline{MN} 의 길이의 2배이다.
(2) $\overline{AC} = 2 \overline{MN}$ 이므로
 $\overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{AC} = \frac{1}{2} \times 12 = 6$ (cm)

유형 3

P.8

- (1) 예 (2) 둔 (3) 예 (4) 직 (5) 평 (6) 예 (7) 둔
- (1) 180, 60 (2) 180, 80
- (1) 30° (2) 30°

- (1) $60^\circ + \angle x + 90^\circ = 180^\circ$ 이므로
 $\angle x + 150^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 30^\circ$
(2) $\angle x + 3\angle x + 2\angle x = 180^\circ$ 이므로
 $6\angle x = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 30^\circ$

유형 4 P. 9


1 (1) $\angle BOD$ (2) $\angle AOF$ (3) $\angle COE$
 (4) $\angle DOE$ (5) $\angle BOC$ (6) $\angle BOF$

2 (1) 140, 180, 40 (2) x , 30, 180, 150


3 (1) 80 (2) 20

4 (1) 70° (2) 50°

3 (1) 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $30 + x + 70 = 180 \quad \therefore x = 80$



(2) 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $90 + 3x + (x + 10) = 180$
 $4x = 80 \quad \therefore x = 20$



4 (1) 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $\angle x + 50^\circ = 120^\circ \quad \therefore \angle x = 70^\circ$
 (2) 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $90^\circ + \angle x = 2\angle x + 40^\circ \quad \therefore \angle x = 50^\circ$

유형 5 P. 10

1 (1) \overrightarrow{CD} (또는 \overrightarrow{CO} 또는 \overrightarrow{OD}) (2) 점 O
 (3) $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CD}$ (4) \overrightarrow{AO} (5) \overrightarrow{AB} (또는 \overrightarrow{AO} 또는 \overrightarrow{OB})

2 (1) 점 B (2) 점 A (3) \overrightarrow{AB}

3 (1) 점 B (2) 점 D (3) \overrightarrow{BD}

4 6 cm


4 점 P와 직선 l 사이의 거리는 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발 B까지의 거리, 즉 \overline{PB} 의 길이와 같으므로 6 cm이다.

쌍둥이 기출문제 P. 11~13

1 ④	2 ③	3 ③	4 6	5 ①
6 ③	7 (1) 3개 (2) 6개	8 (1) 6개 (2) 12개		
9 ②	10 30 cm	11 ③	12 50°	
13 $\angle a = 120^\circ, \angle b = 60^\circ$	14 ②	15 ③		
16 25	17 ①, ⑤	18 ④		

[1~4] 점, 선, 면 \rightarrow 도형의 기본 요소
 평면으로만 둘러싸인 입체도형에서
 • (교점의 개수) = (꼭짓점의 개수)
 • (교선의 개수) = (모서리의 개수)

1 ④ 오른쪽 그림과 같은 경우에는 세 점을 모 A, C, B 두 지나는 직선이 존재하지 않는다.



2 ① 점이 움직인 자리는 선이 된다.
 ② 평면과 평면이 만나면 교선이 생긴다.
 ④ 삼각기둥에서 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같다.
 ⑤ 점 A에서 점 B에 이르는 가장 짧은 거리는 \overline{AB} 의 길이이다.
 따라서 옳은 것은 ③이다.

3 교점, 즉 꼭짓점의 개수는 6개이므로 $a = 6$
 교선, 즉 모서리의 개수는 10개이므로 $b = 10$
 $\therefore a + b = 6 + 10 = 16$

4 교점, 즉 꼭짓점의 개수는 12개이므로 $x = 12$
 교선, 즉 모서리의 개수는 18개이므로 $y = 18$
 $\therefore y - x = 18 - 12 = 6$

[5~6] 직선, 반직선, 선분
 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ 이지만
 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AC} \neq \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA} \neq \overrightarrow{BC}$
 즉, 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 같아야 같은 반직선이다.

5 \overrightarrow{AC} 와 같은 반직선은 점 A를 시작점으로 하고 점 C의 방향으로 뻗어 나가는 반직선이므로 ① \overrightarrow{AB} 이다.

6 ③ 시작점은 점 C로 같지만 뻗어 나가는 방향이 다르므로 $\overrightarrow{CA} \neq \overrightarrow{CD}$

[7~8] 직선, 반직선, 선분의 개수
 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선, 반직선, 선분 사이의 관계는 다음과 같다.
 • (직선의 개수) = (선분의 개수)
 • (반직선의 개수) = (직선의 개수) \times 2
 $\hookrightarrow \overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA} \quad \hookrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

7 (1) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$ 의 3개이다.
 (2) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ 의 6개이다.


다른 풀이
 세 점이 한 직선 위에 있지 않으므로
 (반직선의 개수) = (직선의 개수) \times 2
 $= 3 \times 2 = 6(\text{개})$

- 8 (1) \overline{AB} , \overline{AC} , \overline{AD} , \overline{BC} , \overline{BD} , \overline{CD} 의 6개이다.
 (2) \overline{AB} , \overline{AC} , \overline{AD} , \overline{BA} , \overline{BC} , \overline{BD} , \overline{CA} , \overline{CB} , \overline{CD} , \overline{DA} , \overline{DB} , \overline{DC} 의 12개이다.


다른 풀이

어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로
 (반직선의 개수) = (선분의 개수) × 2
 = 6 × 2 = 12(개)

[9~10] 선분의 중점과 두 점 사이의 거리




- (1) $\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{AB} = 2\overline{AM} = 2\overline{MB}$
 (2) $\overline{BN} = \overline{NC} = \frac{1}{2}\overline{BC}$, $\overline{BC} = 2\overline{BN} = 2\overline{NC}$
 (3) $\overline{AC} = 2\overline{MN}$, $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{AC}$



점 M이 \overline{AB} 의 중점이므로
 $\overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 12 = 6(\text{cm})$
 $\therefore \overline{BN} = \overline{MN} - \overline{MB}$
 $= 10 - 6 = 4(\text{cm})$

점 N이 \overline{BC} 의 중점이므로
 $\overline{BC} = 2\overline{BN} = 2 \times 4 = 8(\text{cm})$




두 점 M, N이 각각 \overline{AB} , \overline{BC} 의 중점이므로
 $\overline{AB} = 2\overline{MB}$, $\overline{BC} = 2\overline{BN}$... (i)
 $\therefore \overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 2\overline{MB} + 2\overline{BN}$
 $= 2(\overline{MB} + \overline{BN}) = 2\overline{MN}$
 $= 2 \times 15 = 30(\text{cm})$... (ii)


채점 기준	비율
(i) $\overline{AB} = 2\overline{MB}$, $\overline{BC} = 2\overline{BN}$ 임을 설명하기	40%
(ii) \overline{AC} 의 길이 구하기	60%

[11~16] 각의 크기 구하기

(1) 평각의 크기는 180°임을 이용한다.
 $\Rightarrow \angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ$



(2) 두 개 이상의 직선이 한 점에서 만날 때, 맞꼭지각의 크기는 서로 같음을 이용한다.




- 11 $\angle x + 90^\circ + 30^\circ = 180^\circ$ 이므로
 $\angle x = 60^\circ$

- 12 $\angle DOE + 50^\circ = 90^\circ$
 $\therefore \angle DOE = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$
 $\angle x + \angle DOE = 90^\circ$ 이므로
 $\angle x = 90^\circ - \angle DOE = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$


- 13 $\angle a = 120^\circ$ (맞꼭지각)
 $\angle b + 120^\circ = 180^\circ \therefore \angle b = 60^\circ$

- 14 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $x + 40 = 3x$, $2x = 40$
 $\therefore x = 20$

- 15 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $\angle x + (2\angle x - 80^\circ) + 50^\circ = 180^\circ$
 $3\angle x = 210^\circ \therefore \angle x = 70^\circ$




- 16 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $(2x + 25) + (x - 10) + 90 = 180$
 $3x = 75 \therefore x = 25$




[17~18] 직교와 수선

- (1) 직교 $\Rightarrow \overline{AB} \perp l$
 (2) 점 A에서 직선 l에 내린 수선의 발 \Rightarrow 점 B
 (3) 점 A와 직선 l 사이의 거리 $\Rightarrow \overline{AB}$ 의 길이



- 17 ② \overline{AD} 의 수선은 \overline{AB} , \overline{CD} 이다.
 ③ \overline{AD} 와 \overline{CD} 의 교점은 점 D이다.
 ④ 점 D에서 \overline{AB} 에 내린 수선의 발은 점 A이다.
 ⑤ 점 A와 \overline{BC} 사이의 거리는 \overline{AB} 의 길이인 3 cm이다.
 따라서 옳은 것은 ①, ⑤이다.

- 18 ④ 오른쪽 그림에서 점 D와 \overline{BC} 사이의 거리는 \overline{AB} 의 길이와 같은 4 cm이다.



2 점, 직선, 평면의 위치 관계

유형 6

P. 14


- (1) 점 B, 점 E (2) 점 A, 점 C, 점 E
(3) 점 A, 점 C, 점 D (4) 점 D
 - (1) 점 A, 점 B (2) 점 A, 점 B, 점 C, 점 D
(3) \overline{AC} , \overline{BC} , \overline{CF} (4) 점 A, 점 D
 - (1) \overline{AB} , \overline{BF} , \overline{CD} , \overline{CG}
(2) \overline{AD} , \overline{EH} , \overline{FG}
(3) \overline{AE} , \overline{DH} , \overline{EF} , \overline{HG}
 - (1) \overline{CD} (2) \overline{BD} (3) \overline{BC}
- 3 (3) 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 BC와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리이므로 \overline{AE} , \overline{DH} , \overline{EF} , \overline{HG} 이다.

유형 7


P. 15

- (1) 면 ABCD, 면 AEHD
(2) 면 ABFE, 면 CGHD
(3) 면 BFGC, 면 EFGH
- (1) \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CD} , \overline{DA}
(2) \overline{AE} , \overline{BF} , \overline{CG} , \overline{DH}
(3) \overline{AB} , \overline{EF} , \overline{HG} , \overline{DC}
(4) \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CD} , \overline{DA}
- (1) \overline{BC}
(2) 면 ABCD, 면 ABFE, 면 EFGH, 면 CGHD
(3) 면 ABCD, 면 BFGC, 면 EFGH, 면 AEHD
(4) 면 BFGC
- (1) × (2) ○ (3) ×

- 4 (1) $l \parallel P$, $m \parallel P$ 이면 서로 다른 두 직선 l , m 은 다음 그림과 같이 평행하거나 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있을 수 있다.



- (3) $P \perp Q$, $P \perp R$ 이면 서로 다른 두 평면 Q , R 는 다음 그림과 같이 평행하거나 한 직선에서 만날 수 있다.



쌍둥이 기출문제

P. 16

- 1 ③ 2 \overline{CG} , \overline{DH} , \overline{EH} , \overline{FG} 3 ⑤
4 ⑤ 5 ② 6 L, C

[1~2] 꼬인 위치

입체도형에서 어떤 모서리와 꼬인 위치에 있는 모서리는

- 한 점에서 만나는 모서리
- 평행한 모서리를 제외한 나머지 모서리이다.


- 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 BC와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리이므로 \overline{AD} , \overline{DE} , \overline{DF} 의 3개이다.
- \overline{AB} 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 \overline{AB} 와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리이므로 \overline{CG} , \overline{DH} , \overline{EH} , \overline{FG} 이다.

[3~6] 공간에서의 위치 관계


직선과 직선	직선과 평면	평면과 평면
<ul style="list-style-type: none"> 한 점에서 만난다. 일치한다. 평행하다. 꼬인 위치에 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> 한 점에서 만난다. 포함된다. 평행하다. 	<ul style="list-style-type: none"> 한 직선에서 만난다. 일치한다. 평행하다.

- ③ \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{CA} 의 3개이다.
④ 면 ADEB, 면 BEFC, 면 ADFC의 3개이다.
⑤ \overline{BC} , \overline{EF} 의 2개이다.
따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.
- ① \overline{AF} , \overline{BG} 의 2개이다.
② \overline{AB} 와 \overline{CD} 는 한 점에서 만난다.
③ 면 AFJE, 면 EJID, 면 CHID의 3개이다.
④ 면 ABCDE, 면 FGHIJ의 2개이다.
따라서 옳은 것은 ⑤이다.


- 5 ① 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 다음 그림과 같이 평행하거나 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있을 수 있다.



- ② 한 평면에 평행한 서로 다른 두 평면은 오른쪽 그림과 같이 평행하다.




- ③ 한 평면에 수직인 서로 다른 두 평면은 다음 그림과 같이 평행하거나 한 직선에서 만날 수 있다.




평행하다. 한 직선에서 만난다.

- ④ 한 직선에 수직인 서로 다른 두 직선은 다음 그림과 같이 평행하거나 한 점에서 만나거나 꼬인 위치에 있을 수 있다.



평행하다. 한 점에서 만난다. 꼬인 위치에 있다.

- ⑤ 한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 다음 그림과 같이 평행하거나 한 직선에서 만날 수 있다.



평행하다. 한 직선에서 만난다.

따라서 옳은 것은 ②이다.

- 6 가. 서로 다른 두 직선 l 과 m 이 만나지 않으면 평행하거나 꼬인 위치에 있을 수 있다.
 나. $l \parallel m, l \parallel n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.
 따라서 옳은 것은 나, 다이다.

3 동위각과 엇각

유형 8

P. 17

- 1 (1) 130 (2) $e, 50$ (3) $c, 110$ (4) 70
 2 $\angle a = 125^\circ, \angle b = 55^\circ, \angle c = 55^\circ$
 3 $\angle d = 80^\circ, \angle e = 80^\circ, \angle f = 100^\circ, \angle g = 80^\circ, \angle h = 100^\circ$
 4 $\angle x = 60^\circ, \angle y = 60^\circ$
 5 $\angle x = 50^\circ, \angle y = 70^\circ, \angle z = 70^\circ$
 6 $\angle x = 75^\circ, \angle y = 45^\circ$

- 1 (1) $\angle a$ 의 동위각: $\angle d = 130^\circ$ (맞꼭지각)
 (2) $\angle b$ 의 동위각: $\angle e = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$
 (3) $\angle d$ 의 엇각: $\angle c = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$


- 2 $l \parallel m$ 이므로
 $\angle a = 125^\circ$ (동위각)
 $\angle b = 180^\circ - \angle a = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$
 $\angle c = \angle b = 55^\circ$ (맞꼭지각)

- 3 $l \parallel m$ 이므로
 $\angle d = 80^\circ$ (동위각)
 $\angle e = 80^\circ$ (엇각)
 $\angle f = 180^\circ - \angle d = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$
 $\angle g = 80^\circ$ (맞꼭지각)
 $\angle h = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$

- 4 $l \parallel m$ 이므로 $\angle x = 60^\circ$ (동위각)
 $p \parallel q$ 이므로 $\angle y = 60^\circ$ (동위각)

- 5 $l \parallel m$ 이므로 $\angle x = 50^\circ$ (동위각)
 $\angle y = 180^\circ - (\angle x + 60^\circ)$
 $= 180^\circ - (50^\circ + 60^\circ) = 70^\circ$
 $l \parallel m$ 이므로 $\angle z = \angle y = 70^\circ$ (엇각)

- 6 오른쪽 그림에서
 $l \parallel m$ 이므로 $\angle x = 75^\circ$ (동위각)
 $\therefore \angle BAC = 180^\circ - \angle x$
 $= 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$
 즉, 삼각형 ABC에서
 $105^\circ + 30^\circ + \angle y = 180^\circ$
 $135^\circ + \angle y = 180^\circ \quad \therefore \angle y = 45^\circ$




유형 9


P. 18

- 1 80° 2 100° 3 58° 4 125° 5 100°
 6 40° 7 130° 8 15°


- 1 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 30^\circ + 50^\circ = 80^\circ$




- 2 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 60^\circ + 40^\circ = 100^\circ$




- 3 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 58^\circ$ (동위각)




- 4 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$




5 오른쪽 그림과 같이 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면 $\angle x = 50^\circ + 50^\circ = 100^\circ$




6 오른쪽 그림과 같이 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면 $\angle x = 25^\circ + 15^\circ = 40^\circ$




7 오른쪽 그림과 같이 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면 $\angle x = 30^\circ + 100^\circ = 130^\circ$



8 오른쪽 그림과 같이 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면 $\angle x = 15^\circ$ (엇각)




2 가. 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.




나. 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.


다. 오른쪽 그림과 같이 엇각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.




르. 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.



미. 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.



히. 오른쪽 그림과 같이 엇각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.



따라서 두 직선 l, m 이 평행한 것은 다, 르이다.


- 3 (1) $l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle e$ (동위각)이다.
 (2), (4) $\angle c = \angle g$ (동위각) 또는 $\angle c = \angle e$ (엇각)이면 $l \parallel m$ 이다.
 (3) $l \parallel m$ 이면 $\angle b = \angle f$ (동위각) 또는 $\angle b = \angle h$ (엇각)이다.

유형 10


P. 19

- 1 (1) 120°, 평행하다. (2) 110°, 평행하지 않다.
 (3) 100°, 평행하지 않다. (4) 50°, 평행하다.
 2 다, 르
 3 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○


1 (1) 오른쪽 그림에서 $\angle x = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$
 즉, 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.




(2) 오른쪽 그림에서 $\angle x = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
 즉, 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.



(3) 오른쪽 그림에서 $\angle x = 100^\circ$ (맞꼭지각)
 즉, 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.



(4) 오른쪽 그림에서 $\angle x = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$
 즉, 엇각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.



쌍둥이 기출문제


P. 20~21

- | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------|---|-----|---|-----|----|-----|
| 1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ③ | 4 | 15° | 5 | ④ |
| 6 | ① | 7 | 95° | 8 | 27° | 9 | ④ | 10 | 64° |
| 11 | ② | 12 | ㄱ, ㄷ | | | | | | |

[1~2] 동위각과 엇각

서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나서 생기는 각 중에서

- (1) 동위각: 같은 위치에 있는 각
 (2) 엇각: 엇갈린 위치에 있는 각




- 1 ① $\angle a$ 의 맞꼭지각은 $\angle c$ 이다.
 ② $\angle b$ 의 동위각은 $\angle f$ 이다.
 ③ $\angle d$ 의 엇각은 $\angle f$ 이다.
 ⑤ $\angle g$ 의 동위각은 $\angle c$ 이다.
 따라서 옳은 것은 ④이다.

- 2 ① $\angle a$ 의 동위각은 $\angle e$ 이므로 $\angle e = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
 ③ $\angle c$ 의 엇각은 $\angle e$ 이므로 $\angle e = 110^\circ$
 ④ 두 직선 l, m 이 평행하면 $\angle c = \angle g$ (동위각)이다.
 ⑤ $\angle c = 110^\circ$ 이면 $\angle c = \angle e$ (엇각)이므로 두 직선 l, m 은 평행하다.
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

[3~4] 평행선의 성질

- $l \parallel m$ 이면 동위각, 엇각의 크기가 각각 같다.
- $\angle a + \angle b = 180^\circ$




- 3 $l \parallel m$ 이므로
 $\angle x = 60^\circ$ (동위각), $\angle y = 70^\circ$ (엇각)
 $\therefore \angle x + \angle y = 60^\circ + 70^\circ = 130^\circ$

- 4 $l \parallel m$ 이므로
 $\angle x = 70^\circ$ (엇각)
 $\angle y = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$
 $\therefore \angle x - \angle y = 70^\circ - 55^\circ = 15^\circ$


[5~6] 평행선에서 삼각형 모양이 주어질 때, 각의 크기 구하기

동위각 또는 엇각의 크기를 이용하여 삼각형의 세 각의 크기를 구한 후 삼각형의 세 각의 크기의 합이 180° 임을 이용한다.

- 5 오른쪽 그림에서
 $45^\circ + (2\angle x + 15^\circ) + \angle x = 180^\circ$
 $3\angle x = 120^\circ$
 $\therefore \angle x = 40^\circ$




- 6 오른쪽 그림에서
 $135^\circ + 30^\circ + \angle x = 180^\circ$
 $\angle x + 165^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 15^\circ$




[7~10] 평행선에서 보조선을 그어 각의 크기 구하기


꺾인 점을 지나면서 두 직선 l, m 에 평행한 보조선을 긋는다.




- 7 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 35^\circ + 60^\circ = 95^\circ$




- 8 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ$



- 9 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면
 $\angle x = 32^\circ + 23^\circ = 55^\circ$



- 10 오른쪽 그림과 같이
 $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 를 그으면 ... (i)
 $l \parallel p$ 이므로 $\angle a = 60^\circ$ (엇각)
 $\angle b = 90^\circ - \angle a$
 $= 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$
 $p \parallel q$ 이므로 $\angle c = \angle b = 30^\circ$ (엇각)
 $q \parallel m$ 이므로 $\angle d = 34^\circ$ (엇각) ... (ii)
 $\therefore \angle x = 30^\circ + 34^\circ = 64^\circ$... (iii)



채점 기준	비율
(i) $l \parallel m \parallel p \parallel q$ 인 두 직선 p, q 구기	20%
(ii) 평행선의 성질을 이용하여 $\angle a, \angle b, \angle c, \angle d$ 의 크기 구하기	60%
(iii) $\angle x$ 의 크기 구하기	20%

[11~12] 평행선이 되기 위한 조건


- (1) $\angle a = \angle b$ 이면 $l \parallel m$
 (2) $\angle c = \angle d$ 이면 $l \parallel m$

- 11 ① 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.


- ② 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.




- ③ 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.






- ④ 오른쪽 그림과 같이 엇각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.



- ⑤ 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.




따라서 두 직선 l, m 이 평행하지 않은 것은 ②이다.

- 12 가. 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.
- 
- 나. 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.
- 
- 다. 오른쪽 그림과 같이 동위각의 크기가 같으므로 두 직선 l, m 은 평행하다.
- 
- 르. 동위각의 크기가 같지 않으므로 두 직선 l, m 은 평행하지 않다.
따라서 두 직선 l, m 이 평행한 것은 가, 다이다.


단원 마무리 P. 22~23

1	1	2	9 cm	3	24°	4	20	5	④, ⑤
6	②	7	⑤	8	22	9	25°		

- 1 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선은 \overline{AB} 의 1개이므로 $x=1$
반직선은 $\overline{AB}, \overline{BA}, \overline{BC}, \overline{CB}, \overline{CD}, \overline{DC}$ 의 6개이므로 $y=6$
선분은 $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}, \overline{BC}, \overline{BD}, \overline{CD}$ 의 6개이므로 $z=6$
 $\therefore x-y+z=1-6+6=1$

- 2
- 
- 두 점 B, D가 각각 $\overline{AC}, \overline{CE}$ 의 중점이므로
 $\overline{BC} = \frac{1}{2}\overline{AC}, \overline{CD} = \frac{1}{2}\overline{CE}$
 $\therefore \overline{BD} = \overline{BC} + \overline{CD}$
 $= \frac{1}{2}\overline{AC} + \frac{1}{2}\overline{CE} = \frac{1}{2}(\overline{AC} + \overline{CE})$
 $= \frac{1}{2}\overline{AE} = \frac{1}{2} \times 18 = 9(\text{cm})$


- 3 $90^\circ + \angle x + (2\angle x + 18^\circ) = 180^\circ$
 $3\angle x = 72^\circ \quad \therefore \angle x = 24^\circ$

- 4 오른쪽 그림에서 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
 $(2x+17) + 4x + (x+23) = 180$
 $7x = 140$
 $\therefore x = 20$
- 


- 5 모서리 AB와 만나지도 않고 평행하지도 않은 모서리, 즉 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{CD}, \overline{DE}$ 이다.

- 6 ① \overline{AB} 와 \overline{DH} 는 꼬인 위치에 있다.
③ 면 ABCD와 면 EFGH, 면 ABFE와 면 DCGH, 면 AEHD와 면 BFGC의 3쌍이다.
④ $\overline{AE}, \overline{DH}, \overline{EF}, \overline{HG}$ 의 4개이다.
⑤ $\overline{CD}, \overline{CG}, \overline{DH}, \overline{GH}$ 의 4개이다.
따라서 옳은 것은 ②이다.

- 7 ⑤ $\angle d$ 의 크기와 $\angle g$ 의 크기가 같은지는 알 수 없다.

- 8 $l \parallel m$ 이므로
 $\angle ABC = 3x^\circ + 8^\circ$ (엇각) ... (i)
삼각형 ABC에서
 $(2x+14) + (3x+8) + 48 = 180$
 $5x = 110 \quad \therefore x = 22$... (ii)
- 

채점 기준	비율
(i) $\angle ABC$ 의 크기를 x 를 사용하여 나타내기	50%
(ii) x 의 값 구하기	50%

- 9 오른쪽 그림과 같이 $l \parallel m \parallel n$ 인 직선 n 을 그으면
 $\angle x = 96^\circ - 71^\circ = 25^\circ$
- 


1 삼각형의 작도

유형 1 P. 26

- 1 $\sphericalangle, \text{리}$
 - 2 (1) \times (2) \times (3) \bigcirc (4) \bigcirc
 - 3 컴퍼스
 - 4 P, \overline{AB} , P, \overline{AB} , Q
 - 5 $\text{㉔} \rightarrow \text{㉓} \rightarrow \text{㉒}$
- 2 (1) 두 선분의 길이를 비교할 때는 컴퍼스를 사용한다.
 (2) 두 점을 연결하는 선분을 그릴 때는 눈금 없는 자를 사용한다.
- 3 선분의 길이를 재어서 옮길 때는 컴퍼스를 사용한다.


유형 2 P. 27

- 1 A, B, C, \overline{AB}
 - 2 (1) $\text{㉔}, \text{㉓}, \text{㉒}$ (2) 동위각
 - 3 (1) $\text{㉒}, \text{㉓}, \text{㉔}$ (2) 엇각
- 2 (1) 작도 순서는 다음과 같다.



- ㉔ 점 P를 지나는 직선을 그어 직선 l 과의 교점을 Q라고 한다.
 - ㉓ 점 Q를 중심으로 원을 그려 \overline{PQ} , 직선 l 과의 교점을 각각 A, B라고 한다.
 - ㉒ 점 P를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{QA} 인 원을 그려 \overline{PQ} 와의 교점을 C라고 한다.
 - ㉑ \overline{AB} 의 길이를 잰다.
 - ㉐ 점 C를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{AB} 인 원을 그려 ㉓ 의 원과의 교점을 D라고 한다.
 - ㉏ \overline{PD} 를 그으면 $l \parallel \overline{PD}$ 이다.
- 따라서 작도 순서는 $\text{㉔} \rightarrow \text{㉓} \rightarrow \text{㉒} \rightarrow \text{㉑} \rightarrow \text{㉐} \rightarrow \text{㉏}$ 이다.

3 (1) 작도 순서는 다음과 같다.



- ㉔ 점 P를 지나는 직선을 그어 직선 l 과의 교점을 Q라고 한다.
 - ㉓ 점 Q를 중심으로 원을 그려 \overline{PQ} , 직선 l 과의 교점을 각각 A, B라고 한다.
 - ㉒ 점 P를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{QA} 인 원을 그려 \overline{PQ} 와의 교점을 C라고 한다.
 - ㉑ \overline{AB} 의 길이를 잰다.
 - ㉐ 점 C를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{AB} 인 원을 그려 ㉒ 의 원과의 교점을 D라고 한다.
 - ㉏ \overline{PD} 를 그으면 $l \parallel \overline{PD}$ 이다.
- 따라서 작도 순서는 $\text{㉔} \rightarrow \text{㉓} \rightarrow \text{㉒} \rightarrow \text{㉑} \rightarrow \text{㉐} \rightarrow \text{㉏}$ 이다.

유형 3 P. 28

- 1 (1) \overline{BC} (2) \overline{AC} (3) \overline{AB} (4) $\angle C$ (5) $\angle A$ (6) $\angle B$
 - 2 (1) 3 cm (2) 4 cm (3) 80°
 - 3 (1) \times (2) \times (3) \bigcirc (4) \times (5) \bigcirc (6) \bigcirc (7) \bigcirc (8) \times
- 2 (1) $\angle A$ 의 대변은 \overline{BC} 이므로 그 길이는 3 cm이다.
 (2) $\angle C$ 의 대변은 \overline{AB} 이므로 그 길이는 4 cm이다.
 (3) 변 AC의 대각은 $\angle B$ 이므로 그 크기는 80° 이다.
- 3 (1) $6 > 1 + 3 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없다.
 (2) $9 = 2 + 7 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없다.
 (3) $5 < 4 + 4 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있다.
 (4) $13 > 5 + 6 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없다.
 (5) $12 < 6 + 8 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있다.
 (6) $15 < 7 + 9 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있다.
 (7) $10 < 8 + 10 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있다.
 (8) $24 > 11 + 12 \Rightarrow$ 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없다.

유형 4 P. 29

- 1 (1) \times (2) \bigcirc (3) \bigcirc (4) \bigcirc
- 2 a, $\angle XBC$, $\angle YCB$, A

- 1 (1) 두 변인 \overline{AB} , \overline{BC} 의 길이와 그 끼인각이 아닌 $\angle A$ 의 크기가 주어졌으므로 $\triangle ABC$ 를 하나로 작도할 수 없다.
 (2) 한 변인 \overline{AB} 의 길이와 그 양 끝 각인 $\angle A$, $\angle B$ 의 크기가 주어졌으므로 $\triangle ABC$ 를 하나로 작도할 수 있다.
 (3) 두 변인 \overline{AC} , \overline{BC} 의 길이와 그 끼인각인 $\angle C$ 의 크기가 주어졌으므로 $\triangle ABC$ 를 하나로 작도할 수 있다.
 (4) 세 변인 \overline{AB} , \overline{BC} , \overline{AC} 의 길이가 주어지고 $\overline{AC} < \overline{AB} + \overline{BC}$ 이므로 $\triangle ABC$ 를 하나로 작도할 수 있다.

유형 5 P. 30

- 1 (1) ×
 이유: (가장 긴 변의 길이) > (나머지 두 변의 길이의 합)
 이므로 삼각형이 그려지지 않는다.
 (2) ○
 이유: (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)
 이므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 (3) ×
 이유: 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어졌으므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 (4) ○
 이유: 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌으므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 (5) ○
 이유: 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌으므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 (6) ○
 이유: $\angle B = 180^\circ - (30^\circ + 60^\circ) = 90^\circ$, 즉 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기를 알 수 있으므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 (7) ×
 이유: 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.

2 (1) ○ (2) ○ (3) × (4) ×

- 2 (1) 세 변의 길이가 주어진 경우이고, 이때 $\overline{AB} + \overline{AC} > \overline{BC}$ 이므로 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해진다.
 (2) $\angle A$ 가 \overline{AB} 와 \overline{AC} 의 끼인각이므로 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
 즉, $\triangle ABC$ 가 하나로 정해진다.
 (3) $\angle B$ 가 \overline{AB} 와 \overline{AC} 의 끼인각이 아니므로 $\triangle ABC$ 는 하나로 정해지지 않는다.
 (4) $\angle C$ 가 \overline{AB} 와 \overline{AC} 의 끼인각이 아니므로 $\triangle ABC$ 는 하나로 정해지지 않는다.

쌍둥이 기출문제 P. 31~33

1	⑤	2	②, ④	3	㉠ → ㉡ → ㉢	4	④
5	㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤	6	③	7	②, ⑤		
8	③	9	③	10	⑤	11	㉠, ㉡
13	④	14	①	15	㉠	16	㉠, ㉡, ㉢

[1~2] 작도
 작도: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것
 • 눈금 없는 자: 두 점을 지나는 선분을 그리거나 선분을 연장할 때 사용
 • 컴퍼스: 원을 그리거나 선분의 길이를 옮길 때 사용

- 2 ② 작도할 때는 각도기를 사용하지 않는다.
 ④ 선분의 길이를 잴 때는 컴퍼스를 사용한다.

[3~4] 길이가 같은 선분의 작도
 \overline{AB} 와 길이가 같은 선분의 작도 순서는 다음과 같다.

$\overline{AB} = \overline{PQ}$

- 4 ㉢ \overline{AB} 의 길이를 잰다.
 ㉡ 두 점 A, B를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{AB} 인 원을 각각 그려 두 원의 교점을 C라고 한다.
 ㉠ \overline{AC} , \overline{BC} 를 그으면 삼각형 ABC는 정삼각형이다.
 따라서 작도 순서는 ㉢ → ㉡ → ㉠이다.

[5~8] 크기가 같은 각의 작도
 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각의 작도 순서는 다음과 같다.

$\angle XOY = \angle CPD$

이때 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{PC} = \overline{PD}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이다.

- 6 ① 점 D를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{AB} 인 원을 그리므로 $\overline{AB} = \overline{CD}$
 ② 두 점 O, P를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{OA} 인 원을 각각 그리므로 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{PC} = \overline{PD}$
 ③ $\overline{OX} = \overline{PQ}$ 인지는 알 수 없다.
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

- 7 두 점 A, P를 중심으로 반지름의 길이가 같은 원을 각각 그리므로 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{PQ} = \overline{PR}$
 따라서 \overline{AB} 와 길이가 같은 선분이 아닌 것은 ②, ⑤이다.

- 8 ① 두 점 A, P를 중심으로 반지름의 길이가 같은 원을 각각 그리므로
 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{PQ} = \overline{PR}$
 ② 점 Q를 중심으로 반지름의 길이가 \overline{BC} 인 원을 그리므로
 $\overline{BC} = \overline{QR}$
 ③ $\angle QPR = \angle QRP$ 인지는 알 수 없다.
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

[9~10] 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계
 (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

- 9 ① $4 < 3+3$
 ② $5 < 4+2$
 ③ $7 > 4+2$
 ④ $8 < 6+6$
 ⑤ $9 < 6+4$
 따라서 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은 ③이다.

- 10 ① $1 < 1+1$
 ② $2 < 2+1$
 ③ $4 < 3+2$
 ④ $5 < 4+4$
 ⑤ $5 = 2+3$
 따라서 삼각형을 작도할 수 없는 것은 ⑤이다.

[11~12] 삼각형의 작도
 다음의 각 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.
 (1) 세 변의 길이가 주어질 때
 (2) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
 (3) 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

- 11 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 때, 삼각형의 작도는
 ㄱ. 한 변을 작도한 후 두 각을 작도하거나
 ㄴ. 한 각을 작도한 후 한 변을 작도하고 다른 한 각을 작도하면 된다.

- 12 작도 순서는
 ④ → ①(또는 ②) → ②(또는 ①) → ③
 또는
 ①(또는 ②) → ④ → ②(또는 ①) → ③
 따라서 가장 마지막에 해당하는 것은 ③이다.

[13~16] 삼각형이 하나로 정해지는 경우
 (1) 세 변의 길이가 주어질 때
 (2) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
 (3) 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

- 13 ① 세 변의 길이가 주어졌지만 $10 > 4+5$ 이므로 삼각형이 그려지지 않는다.
 ② $\angle A$ 는 \overline{AB} 와 \overline{BC} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 ③ $\angle A$ 는 \overline{BC} 와 \overline{CA} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 ④ $\angle B = 180^\circ - (30^\circ + 75^\circ) = 75^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 경우와 같다.
 ⑤ 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.
 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 ④이다.

- 14 ① 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.
 ② 세 변의 길이가 주어졌을 경우이고, 이때 $12 < 6+8$ 이므로 삼각형이 하나로 정해진다.
 ③ 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌을 경우이다.
 ④ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 경우이다.
 ⑤ $\angle C = 180^\circ - (40^\circ + 60^\circ) = 80^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 경우와 같다.
 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것은 ①이다.

- 15 ㄱ. 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 경우이다.
 ㄴ. $\angle B$ 가 \overline{AB} 와 \overline{AC} 의 끼인각이 아니므로 $\triangle ABC$ 는 하나로 정해지지 않는다.
 ㄷ. $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 크기가 주어졌으므로 $\angle A$ 의 크기도 알 수 있다. 즉, 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 경우와 같다.
 ㄹ. 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌을 경우이다.
 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 필요한 나머지 한 조건이 될 수 없는 것은 ㄴ이다.

- 16 ㄱ. 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 경우이다.
 ㄴ, ㄷ. $\angle C = 180^\circ - (65^\circ + 40^\circ) = 75^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어졌을 경우와 같다.
 ㄹ. 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.
 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 필요한 나머지 한 조건이 될 수 있는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

2 삼각형의 합동

유형 6


P. 34

- 1 (1) \overline{EF} , 10 (2) 5 cm (3) 60° (4) 30°
 2 $a=60, b=75, c=60, x=6$
 3 (1) ○ (2) ○ (3) ○ (4) × (5) × (6) ○ (7) ○


- 1 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이므로
 (2) $\overline{AB} = \overline{DE} = 5$ cm
 (3) $\angle E = \angle B = 60^\circ$
 (4) $\angle F = \angle C = 180^\circ - (90^\circ + 60^\circ) = 30^\circ$

- 2 $\angle B = \angle F = 75^\circ$
 $\therefore b = 75$
 사각형의 네 각의 크기의 합이 360° 이므로
 $\angle A = 360^\circ - (75^\circ + 78^\circ + 147^\circ) = 60^\circ$
 $\therefore a = 60$
 $\angle E = \angle A = 60^\circ$
 $\therefore c = 60$
 $\overline{GF} = \overline{CB} = 6$ cm
 $\therefore x = 6$

- 3 (4) 오른쪽 그림의 두 정삼각형은 모양은 같지만 합동은 아니다.



- (5) 오른쪽 그림의 두 직사각형의 넓이는 12로 같지만 합동은 아니다.



유형 7

P. 35

- 1 (1) SAS 합동 (2) SSS 합동 (3) ASA 합동
 2 $\triangle ABC \equiv \triangle HIG \equiv \triangle PRQ$
 3 (1) $\triangle ABD \equiv \triangle CDB$ (2) ASA 합동

- 1 (1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{AC} = \overline{DF}, \angle A = \angle D$
 $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SAS 합동)
 (2) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \overline{CA} = \overline{FD}$
 $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SSS 합동)
 (3) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\angle A = \angle D, \overline{AC} = \overline{DF}, \angle C = \angle F$
 $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)

- 2 $\triangle ABC$ 와 $\triangle HIG$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{HG}, \angle C = \angle G = 60^\circ,$
 $\angle A = 180^\circ - (30^\circ + 60^\circ) = 90^\circ = \angle H$ 이므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle HIG$ (ASA 합동)
 $\triangle ABC$ 와 $\triangle PRQ$ 에서
 $\overline{BC} = \overline{RQ}, \overline{AC} = \overline{PQ},$
 $\angle C = \angle Q = 180^\circ - (90^\circ + 30^\circ) = 60^\circ$ 이므로
 $\triangle ABC \equiv \triangle PRQ$ (SAS 합동)
 $\therefore \triangle ABC \equiv \triangle HIG \equiv \triangle PRQ$

- 3 $\triangle ABD$ 와 $\triangle CDB$ 에서
 $\angle ADB = \angle CBD, \overline{BD}$ 는 공통,
 $\angle ABD = 180^\circ - (\angle A + \angle ADB)$
 $= 180^\circ - (\angle C + \angle CBD)$
 $= \angle CDB$
 $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle CDB$ (ASA 합동)

쌍둥이 기출문제

P. 36~37


- 1 ④ 2 ①, ④ 3 ③ 4 $x=5, a=60$
 5 ① 6 \neg 과 \neg , SAS 합동 7 ①, ④
 8 ③ 9 (가) $\angle DMC$ (나) $\angle D$ (다) ASA
 10 ③ 11 (가) \overline{OC} (나) \overline{OD} (다) $\angle O$ (라) SAS
 12 (1) $\triangle COB$, SAS 합동 (2) 98°

[1~4] 도형의 합동


- (1) 합동: 한 도형을 모양과 크기를 바꾸지 않고 다른 도형에 완전히 포갤 수 있을 때, 이 두 도형을 서로 합동이라고 한다.
 (2) 두 도형이 서로 합동이면
 ① 대응변의 길이는 서로 같다.
 ② 대응각의 크기는 서로 같다.

- 1 ④ 합동인 두 도형은 모양과 크기가 각각 같다.


- 2 ② 오른쪽 그림의 두 평행사변형은 한 변의 길이가 2로 같지만 합동은 아니다.



- ③ 오른쪽 그림의 두 이등변삼각형은 둘레의 길이가 10으로 같지만 합동은 아니다.



- ⑤ 오른쪽 그림의 두 삼각형은 세 각의 크기가 같지만 합동은 아니다.



따라서 두 도형이 항상 합동인 것은 ①, ④이다.

3 $\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ 이므로
 $\angle C = \angle R = 180^\circ - (80^\circ + 30^\circ) = 70^\circ$

4 $\overline{AD} = \overline{EH} = 5 \text{ cm}$
 $\therefore x = 5$
 $\angle E = \angle A = 85^\circ, \angle F = \angle B = 80^\circ$ 이고
 사각형의 네 각의 크기의 합이 360° 이므로
 $\angle G = 360^\circ - (85^\circ + 80^\circ + 135^\circ) = 60^\circ$
 $\therefore a = 60$

[5~6] 합동인 삼각형 찾기

- (1) 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때 (SSS 합동)
- (2) 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 합동)
- (3) 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때 (ASA 합동)

5 ①의 삼각형에서 나머지 한 각의 크기는
 $180^\circ - (80^\circ + 40^\circ) = 60^\circ$
 따라서 보기의 삼각형과 ①의 삼각형은 ASA 합동이다.

6 \triangle 의 삼각형에서 나머지 한 각의 크기는
 $180^\circ - (45^\circ + 65^\circ) = 70^\circ$
 따라서 \triangle 의 삼각형과 \triangle 의 삼각형은 SAS 합동이다.

[7~8] 두 삼각형이 합동이 되기 위해 필요한 한 조건 찾기

- (1) 두 변의 길이가 각각 같을 때
 \Rightarrow 나머지 한 변의 길이 또는 그 끼인각의 크기가 같아야 한다.
- (2) 한 변의 길이와 그 양 끝 각 중 한 각의 크기가 같을 때
 \Rightarrow 그 각을 끼고 있는 변의 길이 또는 다른 한 각의 크기가 같아야 한다.
- (3) 두 각의 크기가 각각 같을 때
 \Rightarrow 대응하는 한 변의 길이가 같아야 한다.


7 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DE}, \angle A = \angle D$ 이므로
 ① $\angle B = \angle E$ 이면
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)
 ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$ 이면
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SAS 합동)

8 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DFE$ 에서 $\overline{AB} = \overline{DF}, \overline{AC} = \overline{DE}$ 이므로
 ③ $\angle D = \angle A = 50^\circ$ 이면
 $\triangle ABC \equiv \triangle DFE$ (SAS 합동)

[9~12] 삼각형의 합동 조건


(1) $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \overline{AC} = \overline{DF}$

이면
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SSS 합동)




(2) $\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E$

이면
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (SAS 합동)



(3) $\overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$

이면
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (ASA 합동)



10 $\triangle ABM$ 과 $\triangle DCM$ 에서
 $\overline{AM} = \overline{DM}, \angle AMB = \angle DMC$ (맞꼭지각),
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이므로 $\angle BAM = \angle CDM$ (엇각) ⑤
 따라서 $\triangle ABM \equiv \triangle DCM$ (ASA 합동)이므로
 $\overline{AB} = \overline{CD}$ ①, $\overline{BM} = \overline{CM}$ ②, $\angle ABM = \angle DCM$ ④
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

12 (1) $\triangle AOD$ 와 $\triangle COB$ 에서
 $\overline{OA} = \overline{OC}, \angle O$ 는 공통,
 $\overline{OD} = \overline{OC} + \overline{CD} = \overline{OA} + \overline{AB} = \overline{OB}$
 $\therefore \triangle AOD \equiv \triangle COB$ (SAS 합동)
 (2) $\angle OCB = \angle OAD = 180^\circ - (32^\circ + 50^\circ) = 98^\circ$

단원 마무리

P. 38~39

- 1 ㉠ \rightarrow ㉡ \rightarrow ㉢ \rightarrow ㉣ \rightarrow ㉤ 2 ③ 3 ⑤
 4 ㉠, ㉡ 5 ③ 6 ③, ⑤ 7 3개 8 ⑤

2 ③ $\overline{AQ} = \overline{BQ} = \overline{CP} = \overline{DP}, \overline{AB} = \overline{CD}$ 이지만 $\overline{AB} = \overline{CP}$ 인지는 알 수 없다.

3 a 에 주어진 값을 대입하여 세 변의 길이를 각각 구하면
 ① 5, 9, 7 $\Rightarrow 9 < 5 + 7$ (O)
 ② 5, 9, 9 $\Rightarrow 9 < 5 + 9$ (O)
 ③ 5, 9, 11 $\Rightarrow 11 < 5 + 9$ (O)
 ④ 5, 9, 13 $\Rightarrow 13 < 5 + 9$ (O)
 ⑤ 5, 9, 15 $\Rightarrow 15 > 5 + 9$ (X)
 따라서 a 의 값이 될 수 없는 것은 ⑤이다.

4 \triangle 세 변의 길이가 주어진 경우이지만 $9 = 4 + 5$ 이므로 삼각형이 그려지지 않는다.
 \triangle 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
 \triangle $\angle B$ 는 \overline{AB} 와 \overline{CA} 의 끼인각이 아니므로 삼각형이 하나로 정해지지 않는다.
 \triangle $\angle B = 180^\circ - (35^\circ + 60^\circ) = 85^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우와 같다.
 따라서 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 \triangle , \triangle 이다.

- 5
- ① 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
 - ② 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
 - ③ 세 각의 크기가 주어지면 모양은 같고 크기가 다른 삼각형이 무수히 많이 그려진다.
 - ④ $\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C)$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우와 같다.
 - ⑤ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다. 따라서 더 필요한 조건이 아닌 것은 ③이다.

- 6
- ① $\angle C = \angle F = 45^\circ$
 - ② $\angle D = \angle A = 30^\circ$
 - ③ $\angle E = 180^\circ - (45^\circ + 30^\circ) = 105^\circ$
 - ④ \overline{AB} 의 길이는 알 수 없다.
 - ⑤ $\overline{EF} = \overline{BC} = 4\text{ cm}$
- 따라서 옳은 것은 ③, ⑤이다.

- 7
- ㄱ. $\triangle ABC$ 와 $\triangle EFD$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{EF}$, $\overline{BC} = \overline{FD}$, $\overline{AC} = \overline{ED}$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle EFD$ (SSS 합동)
 - ㄴ. $\triangle ABC$ 와 $\triangle GIH$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{GI}$, $\overline{BC} = \overline{IH}$, $\angle B = \angle I$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle GIH$ (SAS 합동)
 - ㄷ. $\triangle LJK$ 에서 $\angle L = 180^\circ - (42^\circ + 60^\circ) = 78^\circ$
 $\triangle ABC$ 와 $\triangle LJK$ 에서
 $\overline{AC} = \overline{LK}$, $\angle A = \angle L$, $\angle C = \angle K$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle LJK$ (ASA 합동)
- 따라서 $\triangle ABC$ 와 합동인 삼각형은 ㄱ, ㄴ, ㄷ의 3개이다.

- 8
- $\triangle AMC$ 와 $\triangle DMB$ 에서
 $\overline{CM} = \overline{BM}$, $\angle AMC = \angle DMB$ (맞꼭지각),
 $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ 에서 $\angle ACM = \angle DBM$ (②)이므로
 $\triangle AMC \cong \triangle DMB$ (ASA 합동) (①)
 $\therefore \overline{AC} = \overline{BD}$ (③), $\overline{AM} = \overline{DM}$ (④)
 ⑤ $\overline{AD} = \overline{BC}$ 인지는 알 수 없다.
 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.



3. 다각형

1 다각형

유형 1

P. 42

- 1 ㄱ, ㄴ 2 (1) 내각 (2) 외각 (3) 180
- 3 (1) 180, 130 (2) 95° (3) 65°
- 4 (1) 정오각형 (2) 정구각형
- 5 (1) ○ (2) ○ (3) × (4) ×
- 1 나, 르, 브. 평면도형이 아니므로 다각형이 아니다.
 다. 반원의 일부는 곡선이므로 다각형이 아니다.
 따라서 다각형은 ㄱ, ㄴ이다.
- 3 다각형의 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 크기의 합은 180° 이므로
 (2) ($\angle A$ 의 외각의 크기) = $180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$
 (3) ($\angle A$ 의 외각의 크기) = $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$
- 4 (1) ㄱ에서 정다각형이고, ㄴ에서 오각형이므로
 주어진 다각형은 정오각형이다.
 (2) ㄱ에서 구각형이고, ㄴ에서 정다각형이므로
 주어진 다각형은 정구각형이다.
- 5 (3) 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형은 직사각형이다.
 (4) 마름모는 네 변의 길이가 모두 같지만 네 내각의 크기가
 모두 같지는 않으므로 정다각형이 아니다.

유형 2

P. 43

- 1 (1) 3개 (2) 5개
- 2 (1) 4개, 1개, 2개 (2) 5개, 2개, 5개
 (3) 6개, 3개, 9개 (4) 7개, 4개, 14개
- 3 (1) 35개 (2) 54개 (3) 90개 (4) 170개
- 4 (1) 십일각형 (2) 44개
- 5 20, 40, 8, 8, 팔각형 6 십삼각형
- 1 (1) 주어진 다각형은 육각형이므로 한 꼭짓점에서 그을 수
 있는 대각선의 개수는
 $6-3=3$ (개)
 (2) 주어진 다각형은 팔각형이므로 한 꼭짓점에서 그을 수
 있는 대각선의 개수는
 $8-3=5$ (개)

- 2 (1) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $4-3=1$ (개)
 대각선의 개수는 $\frac{4 \times 1}{2} = 2$ (개)
 (2) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $5-3=2$ (개)
 대각선의 개수는 $\frac{5 \times 2}{2} = 5$ (개)
 (3) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $6-3=3$ (개)
 대각선의 개수는 $\frac{6 \times 3}{2} = 9$ (개)
 (4) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $7-3=4$ (개)
 대각선의 개수는 $\frac{7 \times 4}{2} = 14$ (개)
- 3 (1) $\frac{10 \times (10-3)}{2} = 35$ (개) (2) $\frac{12 \times (12-3)}{2} = 54$ (개)
 (3) $\frac{15 \times (15-3)}{2} = 90$ (개) (4) $\frac{20 \times (20-3)}{2} = 170$ (개)
- 4 (1) 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8개인 다각
 형을 n 각형이라고 하면
 $n-3=8 \quad \therefore n=11$, 즉 십일각형
 (2) $\frac{11 \times (11-3)}{2} = 44$ (개)
- 6 대각선의 개수가 65개인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $\frac{n(n-3)}{2} = 65$ 에서
 $n(n-3) = 130 = 13 \times 10$ 이므로 $n=13$
 따라서 주어진 다각형은 십삼각형이다.

쌍둥이 기출문제

P. 44

- 1 25 2 ⑤ 3 ③ 4 ①
- 5 정십팔각형 6 ② 7 ④ 8 ②

[1~4] 다각형의 대각선의 개수

- (1) n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수 $\Rightarrow (n-3)$ 개
 (2) n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형
 의 개수 $\Rightarrow (n-2)$ 개
 (3) n 각형의 대각선의 개수 $\Rightarrow \frac{n(n-3)}{2}$ 개

- 1 팔각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는
 $8-3=5$ (개) $\therefore a=5$
 모든 대각선의 개수는
 $\frac{8 \times 5}{2} = 20$ (개) $\therefore b=20$
 $\therefore a+b=5+20=25$

2 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 13개인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $n-3=13 \quad \therefore n=16$
 따라서 십육각형의 대각선의 개수는
 $\frac{16 \times (16-3)}{2} = 104(\text{개})$


3 대각선의 개수가 27개인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $\frac{n(n-3)}{2} = 27, \quad n(n-3) = 54 = 9 \times 6$
 $\therefore n=9$
 따라서 주어진 다각형은 구각형이다.

4 대각선의 개수가 44개인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $\frac{n(n-3)}{2} = 44, \quad n(n-3) = 88 = 11 \times 8$
 $\therefore n=11$
 따라서 십일각형의 변의 개수는 11개이다.


[5~8] 정다각형

정다각형은 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같아야 한다.

(1) 모든 변의 길이가 같아도 내각의 크기가 같지 않은 다각형은 정다각형이 아니다.



(2) 모든 내각의 크기가 같아도 변의 길이가 같지 않은 다각형은 정다각형이 아니다.



5 (나)에서 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형은 정다각형이므로 정 n 각형이라고 하면 (다)에서
 $n-3=15 \quad \therefore n=18$
 따라서 주어진 다각형은 정십팔각형이다.

6 (가)에서 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형은 정다각형이므로 정 n 각형이라고 하면 (나)에서
 $\frac{n(n-3)}{2} = 14, \quad n(n-3) = 28 = 7 \times 4$
 $\therefore n=7$
 따라서 주어진 다각형은 정칠각형이다.

7 ① 최소 3개의 변이 있어야 다각형이 될 수 있다.
 ② 삼각형에는 이웃하지 않는 두 꼭짓점이 없으므로 대각선을 그을 수 없다.
 ④ n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $(n-3)$ 개이다.
 ⑤ 오각형의 대각선의 개수는 $\frac{5 \times (5-3)}{2} = 5(\text{개})$ 이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

8 ② 변의 길이가 모두 같은 사각형은 마름모이다.
 ③ 칠각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $7-3=4(\text{개})$ 이다.

④ 육각형과 정육각형은 모두 꼭짓점이 6개인 다각형이므로 대각선의 개수가 $\frac{6 \times (6-3)}{2} = 9(\text{개})$ 로 서로 같다.
 ⑤ 다각형이 정다각형이라면 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같아야 하지만 삼각형은 세 내각의 크기만 같아도 정삼각형이 된다.
 따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

2 삼각형의 내각과 외각

유형 3

P. 45

- | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | (1) 25° | (2) 115° | 2 | (1) 16 | (2) 35 |
| 3 | 45° | | 4 | (1) 105° | (2) 135° |
| 5 | (1) 120° | (2) 60° | 6 | (1) 35° | (2) 30° |


1 (1) $65^\circ + \angle x + 90^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 25^\circ$
 (2) $35^\circ + \angle x + 30^\circ = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 115^\circ$

2 (1) $108 + 40 + 2x = 180$
 $2x = 32 \quad \therefore x = 16$
 (2) $x + 50 + (2x + 25) = 180$
 $3x = 105 \quad \therefore x = 35$


3 $180^\circ \times \frac{3}{3+4+5} = 180^\circ \times \frac{3}{12} = 45^\circ$

4 (1) $\angle x = 50^\circ + 55^\circ = 105^\circ$
 (2) $\angle x = 25^\circ + 110^\circ = 135^\circ$

5 (1) 오른쪽 그림에서
 $\angle x = 70^\circ + 50^\circ = 120^\circ$




(2) 오른쪽 그림에서
 $\angle x + 45^\circ = 105^\circ$
 $\therefore \angle x = 60^\circ$



6 (1) 오른쪽 그림에서
 $3\angle x + 15^\circ = 85^\circ + \angle x$
 $2\angle x = 70^\circ \quad \therefore \angle x = 35^\circ$



(2) 오른쪽 그림에서
 $3\angle x + 10^\circ = 70^\circ + \angle x$
 $2\angle x = 60^\circ \quad \therefore \angle x = 30^\circ$



한 걸음 더 연습

P. 46


- 1 (1) 30° (2) 105° 2 180, 50, 180, 130
 3 그림은 풀이 참조, 90
 4 $a+c, b+e, \angle a+\angle c, \angle b+\angle e, 180$

1 (1) $\triangle ABC$ 에서
 $\angle BAC = 180^\circ - (45^\circ + 75^\circ) = 60^\circ$ 이므로
 $\angle BAD = \frac{1}{2} \angle BAC = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ$

(2) $\triangle ABD$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (45^\circ + 30^\circ) = 105^\circ$

다른 풀이

$\angle CAD = \angle BAD = 30^\circ$ 이므로
 $\triangle ADC$ 에서 $\angle x = 30^\circ + 75^\circ = 105^\circ$



$\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ACB = \angle ABC = 30^\circ$
 $\therefore \angle CAD = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$
 $\triangle CDA$ 는 $\overline{CA} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle CDA = \angle CAD = 60^\circ$
 따라서 $\triangle DBC$ 에서
 $\angle x = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$

쌍둥이 기출문제


P. 47~48

- 1 30° 2 50 3 15° 4 90° 5 ④
 6 40° 7 ③ 8 40° 9 (1) 26° (2) 74°
 10 80° 11 110° 12 83° 13 105° 14 34°
 15 ③ 16 45°

[1~10] 삼각형의 내각과 외각

(1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.
 $\Rightarrow \angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ$

(2) 삼각형에서 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.



1 $3\angle x + \angle x + 60^\circ = 180^\circ$
 $4\angle x = 120^\circ \quad \therefore \angle x = 30^\circ$

2 $(x+10) + 20 + 2x = 180$
 $3x = 150 \quad \therefore x = 50$


3 $180^\circ \times \frac{1}{1+4+7} = 180^\circ \times \frac{1}{12} = 15^\circ$

4 $180^\circ \times \frac{9}{4+5+9} = 180^\circ \times \frac{9}{18} = 90^\circ$


5 $\angle x + 72^\circ = 125^\circ \quad \therefore \angle x = 53^\circ$

6 $\angle x + 60^\circ = 2\angle x + 20^\circ \quad \therefore \angle x = 40^\circ$

7 오른쪽 그림에서
 $\angle x + 55^\circ = 75^\circ + 30^\circ$
 $\therefore \angle x = 50^\circ$



8 오른쪽 그림에서
 $\angle x + 50^\circ = 30^\circ + 60^\circ$
 $\therefore \angle x = 40^\circ$



9 (1) $\triangle DBC$ 에서
 $\angle BCD = 180^\circ - (100^\circ + 54^\circ) = 26^\circ$
 (2) $\angle C = 2\angle BCD = 2 \times 26^\circ = 52^\circ$ 이므로
 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (54^\circ + 52^\circ) = 74^\circ$

다른 풀이


$\angle ACD = \angle BCD = 26^\circ$ 이므로
 $\triangle ADC$ 에서 $\angle x + 26^\circ = 100^\circ \quad \therefore \angle x = 74^\circ$


10 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle BAC = 180^\circ - (40^\circ + 60^\circ) = 80^\circ$ 이므로
 $\angle CAD = \frac{1}{2} \angle BAC = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$
 따라서 $\triangle ADC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (40^\circ + 60^\circ) = 80^\circ$


다른 풀이

$\triangle ABC$ 에서
 $\angle BAC = 180^\circ - (40^\circ + 60^\circ) = 80^\circ$ 이므로
 $\angle BAD = \frac{1}{2} \angle BAC = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$
 따라서 $\triangle ABD$ 에서
 $\angle x = \angle BAD + \angle ABD = 40^\circ + 40^\circ = 80^\circ$

[11~16] 삼각형의 내각과 외각의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

(1)  $\Rightarrow \angle x + \bullet + \times = \angle a + (\angle b + \bullet) + (\angle c + \times)$
 $\therefore \angle x = \angle a + \angle b + \angle c$

(2)  $\Rightarrow \triangle DBC$ 에서
 $\angle DCE = \angle B + \angle D = 3\bullet$


(3)  $\Rightarrow \angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = 180^\circ$

11 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle DBC + \angle DCB = 180^\circ - (60^\circ + 20^\circ + 30^\circ)$
 $= 70^\circ$

따라서 $\triangle DBC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$


12 $\triangle DBC$ 에서
 $\angle DBC + \angle DCB = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$
 따라서 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (17^\circ + 25^\circ + 55^\circ) = 83^\circ$

13 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ACB = \angle ABC = 35^\circ$
 $\therefore \angle CAD = 35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$




$\triangle CDA$ 는 $\overline{CA} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle CDA = \angle CAD = 70^\circ$
 따라서 $\triangle DBC$ 에서
 $\angle x = 35^\circ + 70^\circ = 105^\circ$

14 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ACB = \angle ABC = \angle x$
 $\therefore \angle CAD = \angle x + \angle x = 2\angle x$




$\triangle CDA$ 는 $\overline{CA} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle CDA = \angle CAD = 2\angle x$
 따라서 $\triangle DBC$ 에서
 $\angle x + 2\angle x = 102^\circ$
 $3\angle x = 102^\circ \quad \therefore \angle x = 34^\circ$

15 오른쪽 그림에서
 $(50^\circ + 40^\circ) + \angle x + (30^\circ + 20^\circ) = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 40^\circ$



16 오른쪽 그림에서
 $\angle x + (45^\circ + 40^\circ) + (20^\circ + 30^\circ) = 180^\circ$
 $\therefore \angle x = 45^\circ$



3 다각형의 내각과 외각

유형 4 P. 49

다각형	한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수	내각의 크기의 합
오각형	3개	$180^\circ \times 3 = 540^\circ$
육각형	4개	$180^\circ \times 4 = 720^\circ$
칠각형	5개	$180^\circ \times 5 = 900^\circ$
팔각형	6개	$180^\circ \times 6 = 1080^\circ$
⋮	⋮	⋮
n 각형	$(n-2)$ 개	$180^\circ \times (n-2)$

- 1** (1) 1440° (2) 1800° (3) 2340° (4) 2880°
3 (1) 육각형 (2)구각형 (3)십일각형 (4)십사각형
4 (1) 135° (2) 100° **5** (1) 130° (2) 82°

2 (1) $180^\circ \times (10-2) = 1440^\circ$ (2) $180^\circ \times (12-2) = 1800^\circ$
 (3) $180^\circ \times (15-2) = 2340^\circ$ (4) $180^\circ \times (18-2) = 2880^\circ$

3 주어진 다각형을 n 각형이라고 하면
 (1) $180^\circ \times (n-2) = 720^\circ, n-2=4$
 $\therefore n=6$, 즉 육각형
 (2) $180^\circ \times (n-2) = 1260^\circ, n-2=7$
 $\therefore n=9$, 즉 구각형
 (3) $180^\circ \times (n-2) = 1620^\circ, n-2=9$
 $\therefore n=11$, 즉 십일각형
 (4) $180^\circ \times (n-2) = 2160^\circ, n-2=12$
 $\therefore n=14$, 즉 십사각형

4 (1) 오각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ 이므로
 $105^\circ + \angle x + 90^\circ + 110^\circ + 100^\circ = 540^\circ$
 $\angle x + 405^\circ = 540^\circ \quad \therefore \angle x = 135^\circ$
 (2) 육각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (6-2) = 720^\circ$ 이므로
 $(\angle x + 20^\circ) + 130^\circ + 110^\circ + 120^\circ + \angle x + (\angle x + 40^\circ) = 720^\circ$
 $3\angle x = 300^\circ \quad \therefore \angle x = 100^\circ$


- 5 (1) 오각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$ 이므로
 $80^\circ + 100^\circ + \angle x + (180^\circ - 70^\circ) + 120^\circ = 540^\circ$
 $\angle x + 410^\circ = 540^\circ \quad \therefore \angle x = 130^\circ$
- (2) 육각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (6-2) = 720^\circ$ 이므로
 $(\angle x + 30^\circ) + \angle x + (180^\circ - 40^\circ) + 164^\circ$
 $+ (\angle x + 20^\circ) + 120^\circ = 720^\circ$
 $3\angle x = 246^\circ \quad \therefore \angle x = 82^\circ$

유형 5 P. 50

1 5, 3, 5, 3, 360, 360 2 (1) 360° (2) 360°
 3 (1) 100° (2) 110° 4 (1) 100° (2) 53°
 5 (1) 55° (2) 60° (3) 70°

- 3 (1) $\angle x + 110^\circ + 150^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 260^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 100^\circ$
- (2) $120^\circ + \angle x + 130^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 250^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 110^\circ$
- 4 (1) $80^\circ + 105^\circ + \angle x + 75^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 260^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 100^\circ$
- (2) $60^\circ + 50^\circ + 75^\circ + 60^\circ + 62^\circ + \angle x = 360^\circ$
 $\angle x + 307^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 53^\circ$

- 5 (1) 오른쪽 그림에서 오각형의 외각의 크기의 합은 360° 이므로
 $65^\circ + \angle x + 80^\circ + 75^\circ + 85^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 305^\circ = 360^\circ$
 $\therefore \angle x = 55^\circ$
- (2) 오른쪽 그림에서 오각형의 외각의 크기의 합은 360° 이므로
 $\angle x + 80^\circ + 67^\circ + 83^\circ + 70^\circ = 360^\circ$
 $\angle x + 300^\circ = 360^\circ$
 $\therefore \angle x = 60^\circ$
- (3) 오른쪽 그림에서 사각형의 외각의 크기의 합은 360° 이므로
 $80^\circ + 110^\circ + (180^\circ - \angle x) + 60^\circ = 360^\circ$
 $430^\circ - \angle x = 360^\circ$
 $\therefore \angle x = 70^\circ$



유형 6 P. 51

1 (1) 10, 8, 1440, 144 (2) 360, 36

2

정다각형	한 내각의 크기
(1) 정오각형	$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$
(2) 정팔각형	$\frac{180^\circ \times (8-2)}{8} = 135^\circ$
(3) 정십오각형	$\frac{180^\circ \times (15-2)}{15} = 156^\circ$

3

정다각형	한 외각의 크기
(1) 정육각형	$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$
(2) 정구각형	$\frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$
(3) 정십이각형	$\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$

4 (1) 정구각형 (2) 정십팔각형
 5 (1) 정십오각형 (2) 정이십각형
 6 1, 45, 45, 8, 정팔각형

- 4 주어진 정다각형을 정n각형이라고 하면
- (1) $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 140^\circ, 180^\circ \times n - 360^\circ = 140^\circ \times n$
 $40^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n = 9$, 즉 정구각형
- (2) $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 160^\circ, 180^\circ \times n - 360^\circ = 160^\circ \times n$
 $20^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n = 18$, 즉 정십팔각형

다른 풀이

- (1) 한 외각의 크기가 $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$ 이므로
 $\frac{360^\circ}{n} = 40^\circ \quad \therefore n = 9$, 즉 정구각형
- (2) 한 외각의 크기가 $180^\circ - 160^\circ = 20^\circ$ 이므로
 $\frac{360^\circ}{n} = 20^\circ \quad \therefore n = 18$, 즉 정십팔각형

- 5 주어진 정다각형을 정n각형이라고 하면
- (1) $\frac{360^\circ}{n} = 24^\circ \quad \therefore n = 15$, 즉 정십오각형
- (2) $\frac{360^\circ}{n} = 18^\circ \quad \therefore n = 20$, 즉 정이십각형

쌍둥이 기출문제 P. 52~53

1 1267 2 900° 3 ③ 4 정십각형
 5 110° 6 90° 7 ③ 8 ② 9 144°
 10 ⑤ 11 ① 12 정십이각형
 13 (1) 20° (2) 정십팔각형 14 ①

[1~6] 다각형의 내각의 크기의 합

- (1) n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수 $\Rightarrow (n-2)$ 개
- (2) n 각형의 내각의 크기의 합 $\Rightarrow 180^\circ \times (n-2)$

1 구각형은 한 꼭짓점에서 그은 대각선에 의해 $9-2=7$ (개)의 삼각형으로 나누어지므로
 $a=7$
 구각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (9-2)=1260^\circ$ 이므로
 $b=1260$
 $\therefore a+b=7+1260=1267$

2 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 4개인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $n-3=4 \quad \therefore n=7$
 따라서 칠각형의 내각의 크기의 합은
 $180^\circ \times (7-2)=900^\circ$

3 내각의 크기의 합이 1080° 인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $180^\circ \times (n-2)=1080^\circ$
 $n-2=6 \quad \therefore n=8$
 따라서 팔각형의 꼭짓점의 개수는 8개이다.

4 모든 변의 길이와 모든 내각의 크기가 각각 같은 다각형은 정다각형이다.
 내각의 크기의 합이 1440° 인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $180^\circ \times (n-2)=1440^\circ$
 $n-2=8 \quad \therefore n=10$
 따라서 주어진 다각형은 정십각형이다.

5 육각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (6-2)=720^\circ$ 이므로
 $(\angle x+30^\circ)+95^\circ+115^\circ+(\angle x+30^\circ)+\angle x+120^\circ=720^\circ$
 $3\angle x=330^\circ \quad \therefore \angle x=110^\circ$

6 오각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (5-2)=540^\circ$ 이므로
 $(180^\circ-75^\circ)+\angle x+130^\circ+(180^\circ-85^\circ)+120^\circ=540^\circ$
 $\angle x+450^\circ=540^\circ \quad \therefore \angle x=90^\circ$

[7~8] 다각형의 외각의 크기의 합

- (1) 다각형의 한 꼭짓점에서 내각과 외각의 크기의 합은 180° 이다.
- (2) 다각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

7 $90^\circ + \angle x + 80^\circ + 45^\circ + (180^\circ - 105^\circ) = 360^\circ$
 $\angle x + 290^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 70^\circ$

8 $45^\circ + 100^\circ + 50^\circ + (180^\circ - \angle x) + 85^\circ = 360^\circ$
 $460^\circ - \angle x = 360^\circ \quad \therefore \angle x = 100^\circ$

[9~14] 정다각형의 한 내각과 한 외각의 크기

- (1) 정 n 각형의 한 내각의 크기 $\Rightarrow \frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$
- (2) 정 n 각형의 한 외각의 크기 $\Rightarrow \frac{360^\circ}{n}$

9 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형의 개수가 8개인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $n-2=8 \quad \therefore n=10$, 즉 정십각형 ... (i)
 따라서 정십각형의 한 내각의 크기는
 $\frac{180^\circ \times (10-2)}{10} = 144^\circ$... (ii)

채점 기준	비율
(i) 정다각형의 이름 말하기	40%
(ii) 정다각형의 한 내각의 크기 구하기	60%

10 대각선의 개수가 9개인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{n(n-3)}{2}=9, \quad n(n-3)=18=6 \times 3$
 $\therefore n=6$

따라서 정육각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{6}=60^\circ$

11 한 외각의 크기가 36° 인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{360^\circ}{n}=36^\circ \quad \therefore n=10$, 즉 정십이각형

12 한 내각의 크기가 150° 인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}=150^\circ, \quad 180^\circ \times n - 360^\circ = 150^\circ \times n$
 $30^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n=12$
 따라서 주어진 정다각형은 정십이각형이다.

다른 풀이

한 외각의 크기가 $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ 이므로
 $\frac{360^\circ}{n} = 30^\circ \quad \therefore n=12$
 따라서 주어진 정다각형은 정십이각형이다.


13 (1) 한 내각과 한 외각의 크기의 합은 180° 이므로
 (한 외각의 크기) $= 180^\circ \times \frac{1}{8+1} = 180^\circ \times \frac{1}{9} = 20^\circ$
 (2) 주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{360^\circ}{n} = 20^\circ \quad \therefore n=18$
 따라서 주어진 정다각형은 정십팔각형이다.

14 한 내각과 한 외각의 크기의 합은 180° 이므로
 (한 외각의 크기) $= 180^\circ \times \frac{2}{3+2} = 180^\circ \times \frac{2}{5} = 72^\circ$
 주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{360^\circ}{n} = 72^\circ \quad \therefore n=5$
 따라서 주어진 정다각형은 정오각형이다.

- 1 55 2 ③, ⑤ 3 ⑤ 4 45° 5 36°
 6 ⑤ 7 ④ 8 177 9 5개
 10 정육각형

1 $n-2=9 \quad \therefore n=11$
 즉, 십일각형의 대각선의 개수는
 $\frac{11 \times (11-3)}{2} = 44(\text{개}) \quad \therefore m=44$
 $\therefore n+m=11+44=55$

2 ③ 오른쪽 그림의 정육각형처럼 대각선의 길이가 다른 경우도 있다.




④ 십각형의 대각선의 개수는 $\frac{10 \times (10-3)}{2} = 35(\text{개})$
 ⑤ 대각선이 27개인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $\frac{n(n-3)}{2} = 27, n(n-3) = 54 = 9 \times 6$
 $\therefore n=9$, 즉 구각형
 따라서 옳지 않은 것은 ③, ⑤이다.

3 $3x-30=50+(x+20)$
 $2x=100 \quad \therefore x=50$

4 $\triangle ADC$ 에서
 $\angle DAC + \angle DCA = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
 따라서 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (35^\circ + 40^\circ + 60^\circ) = 45^\circ$

5 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ACB = \angle ABC = \angle x$
 $\therefore \angle CAD = \angle x + \angle x = 2\angle x$
 ... (i)



$\triangle ACD$ 는 $\overline{AC} = \overline{CD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle CDA = \angle CAD = 2\angle x$... (ii)
 $\triangle DBC$ 에서 $\angle x + 2\angle x = 108^\circ$
 $3\angle x = 108^\circ \quad \therefore \angle x = 36^\circ$... (iii)

채점 기준	비율
(i) $\angle CAD$ 의 크기를 $\angle x$ 를 사용하여 나타내기	30%
(ii) $\angle CDA$ 의 크기를 $\angle x$ 를 사용하여 나타내기	30%
(iii) $\angle x$ 의 크기 구하기	40%

6 내각의 크기의 합이 1980° 인 다각형을 n 각형이라고 하면
 $180^\circ \times (n-2) = 1980^\circ, n-2=11$
 $\therefore n=13$
 따라서 십삼각형의 변의 개수는 13개이다.

7 $75^\circ + 30^\circ + \angle x + (180^\circ - 110^\circ) + 53^\circ + \angle y = 360^\circ$
 $\angle x + \angle y + 228^\circ = 360^\circ \quad \therefore \angle x + \angle y = 132^\circ$

8 정이십사각형의 한 내각의 크기는
 $\frac{180^\circ \times (20-2)}{20} = 162^\circ$ 이므로 $a=162$
 정이십사각형의 한 외각의 크기는
 $\frac{360^\circ}{24} = 15^\circ$ 이므로 $b=15$
 $\therefore a+b=162+15=177$

9 한 내각의 크기가 135° 인 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n} = 135^\circ, 180^\circ \times n - 360^\circ = 135^\circ \times n$
 $45^\circ \times n = 360^\circ \quad \therefore n=8$
 따라서 정팔각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $8-3=5(\text{개})$

다른 풀이 n 의 값 구하기


한 외각의 크기가 $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ 이므로
 $\frac{360^\circ}{n} = 45^\circ \quad \therefore n=8$

10 정다각형의 한 내각과 한 외각의 크기의 합은 180° 이므로
 (한 외각의 크기) $= 180^\circ \times \frac{1}{2+1} = 180^\circ \times \frac{1}{3} = 60^\circ$... (i)
 주어진 정다각형을 정 n 각형이라고 하면
 $\frac{360^\circ}{n} = 60^\circ \quad \therefore n=6$
 따라서 주어진 정다각형은 정육각형이다. ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 정다각형의 한 외각의 크기 구하기	50%
(ii) 정다각형의 이름 말하기	50%

1 원과 부채꼴


유형 1 P. 58



- 2 (1) $\overline{OA}, \overline{OB}, \overline{OE}$ (2) $\overline{BE}, \overline{CD}$ (3) \overline{BE}
 (4) \widehat{AB} (5) $\angle AOE$ (6) 180°

- 3 (1) × (2) ○ (3) × (4) ○

- 3 (1) 현은 원 위의 두 점을 이은 선분이다.
 (3) 부채꼴은 두 반지름과 호로 이루어진 도형이다.
 (4) 한 원에서 부채꼴과 활꼴이 같을 때는 오른쪽 그림과 같이 부채꼴이 반원인 경우이다.



유형 2 P. 59

1	중심각의 크기	호의 길이	부채꼴의 넓이
	$\angle a$	2 cm	4 cm^2
	$2\angle a$	4 cm	8 cm^2
	$3\angle a$	6 cm	12 cm^2
	$4\angle a$	8 cm	16 cm^2

⇒ 정비례

- 2 (1) 12 (2) 55 3 (1) 30 (2) 6
 4 (1) 120 (2) 4 5 (1) 6 (2) 30
 6 가, 나, 르, 모

- 3 (1) $2 : 8 = x^\circ : 120^\circ, 8x = 240$
 $\therefore x = 30$
 (2) $3 : x = 45^\circ : 90^\circ, 45x = 270$
 $\therefore x = 6$

- 4 (1) $4 : 8 = 60^\circ : x^\circ, 4x = 480$
 $\therefore x = 120$
 (2) $12 : x = 90^\circ : 30^\circ, 90x = 360$
 $\therefore x = 4$


- 6 가. $\widehat{AB} = \widehat{BC}$ 에서 $\angle AOB = \angle BOC$ 이므로
 $\overline{AB} = \overline{BC}$
 다. 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않으므로
 $\overline{AC} \neq 2\overline{AB}$
 바. $(\triangle AOC \text{의 넓이}) < 2 \times (\triangle AOB \text{의 넓이})$
 따라서 옳은 것은 가, 나, 르, 모이다.

쌍둥이 기출문제

P. 60~61

- 1 ④ 2 ②, ③ 3 120° 4 ③ 5 2 cm^2
 6 60 7 168° 8 72°
 9 40, 40, 180, 100, 40, 100, 4 10 ② 11 ②
 12 ⑤

[1~2] 원과 부채꼴에 대한 용어




- 1 ④ $\angle BOC$ 에 대한 호는 \widehat{BC} 이다.
 2 ① $\overline{OA}, \overline{OB}$ 는 원의 중심 O와 원 위의 점 A, B를 각각 이은 선분으로 원의 반지름이다.
 ④ \widehat{AB} 와 두 반지름 OA, OB로 둘러싸인 도형은 부채꼴이다.
 ⑤ \widehat{AB} 와 \overline{AB} 로 둘러싸인 도형은 활꼴이다.
 따라서 옳은 것은 ②, ③이다.

[3~8] 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이, 넓이 사이의 관계 한 원 또는 합동인 두 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 중심각의 크기에 정비례한다.

- 3 $5 : 15 = 40^\circ : \angle AOB, 5\angle AOB = 600^\circ$
 $\therefore \angle AOB = 120^\circ$
 4 $21 : \widehat{BC} = 135^\circ : 45^\circ, 135\widehat{BC} = 945$
 $\therefore \widehat{BC} = 7(\text{cm})$


- 5 부채꼴 COD의 넓이를 $S \text{ cm}^2$ 라고 하면
 $3 : S = 60^\circ : 40^\circ$, $60S = 120 \quad \therefore S = 2$
 따라서 부채꼴 COD의 넓이는 2 cm^2 이다.
- 6 $8 : 24 = 20^\circ : x^\circ$, $8x = 480$
 $\therefore x = 60$
- 7 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 2 : 6 : 7$ 이므로
 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 2 : 6 : 7$
 $\therefore \angle AOC = 360^\circ \times \frac{7}{2+6+7} = 360^\circ \times \frac{7}{15} = 168^\circ$
- 8 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 3 : 2$ 이므로
 $\angle AOB : \angle BOC = 3 : 2$
 $\therefore \angle BOC = 180^\circ \times \frac{2}{3+2} = 180^\circ \times \frac{2}{5} = 72^\circ$

[9~10] 평행선, 이등변삼각형의 성질을 이용하여 호의 길이 구하기



- 9 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이므로
 $\angle AOC = \angle OCD = 40^\circ$ (엇각)
 $\triangle OCD$ 가 $\overline{OC} = \overline{OD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ODC = \angle OCD = 40^\circ$
 이때 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이므로
 $\angle COD = 180^\circ - (40^\circ + 40^\circ) = 100^\circ$
 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
 $\widehat{AC} : 10 = 40^\circ : 100^\circ$, $100\widehat{AC} = 400$
 $\therefore \widehat{AC} = 4$ (cm)


- 10 $\triangle ODC$ 가 $\overline{OC} = \overline{OD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle ODC = \angle OCD = 30^\circ$
 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이므로
 $\angle BOD = \angle ODC = 30^\circ$ (엇각)
 또 $\triangle ODC$ 에서
 $\angle COD = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$
 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
 $\widehat{BD} : 26 = 30^\circ : 120^\circ$, $120\widehat{BD} = 780$
 $\therefore \widehat{BD} = \frac{13}{2}$ (cm)



[11~12] 중심각의 크기와 현의 길이 사이의 관계

한 원 또는 합동인 두 원에서

- (1) 중심각의 크기가 같은 두 현의 길이는 같다.
 $\Rightarrow \angle AOB = \angle BOC$ 이면 $\overline{AB} = \overline{BC}$
- (2) 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.
 $\Rightarrow \angle AOC = 2\angle AOB$ 이면
 $\overline{AC} \neq 2\overline{AB}$ ($\overline{AC} < 2\overline{AB}$)



- 11 ② 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.
- 12 ① $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 인지는 알 수 없다.
 ② $\angle AOB = \frac{1}{2}\angle COD$ 이므로 $\widehat{AB} = \frac{1}{2}\widehat{CD}$
 ③ 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않으므로
 $\overline{AB} \neq \frac{1}{2}\overline{CD}$
 ④ ($\triangle COD$ 의 넓이) $< 2 \times$ ($\triangle AOB$ 의 넓이)
 ⑤ $\angle COD = 2\angle AOB$ 이므로
 (부채꼴 COD의 넓이) $= 2 \times$ (부채꼴 AOB의 넓이)
 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

2 부채꼴의 호의 길이와 넓이

유형 3

P. 62

- 1 (1) $l : 6\pi \text{ cm}$, $S : 9\pi \text{ cm}^2$
 (2) $l : 14\pi \text{ cm}$, $S : 49\pi \text{ cm}^2$
 (3) $l : (6\pi + 12) \text{ cm}$, $S : 18\pi \text{ cm}^2$
- 2 (1) $l : 24\pi \text{ cm}$, $S : 24\pi \text{ cm}^2$
 (2) $l : 12\pi \text{ cm}$, $S : 12\pi \text{ cm}^2$
 (3) $l : 14\pi \text{ cm}$, $S : 12\pi \text{ cm}^2$
 (4) $l : 16\pi \text{ cm}$, $S : 24\pi \text{ cm}^2$

- 1 (1) $l = 2\pi \times 3 = 6\pi$ (cm)
 $S = \pi \times 3^2 = 9\pi$ (cm²)
 (2) $l = 2\pi \times 7 = 14\pi$ (cm)
 $S = \pi \times 7^2 = 49\pi$ (cm²)
 (3) $l = (2\pi \times 6) \times \frac{1}{2} + 12 = 6\pi + 12$ (cm)
 $S = (\pi \times 6^2) \times \frac{1}{2} = 18\pi$ (cm²)

- 2 (1) $l=2\pi \times 7+2\pi \times 5=14\pi+10\pi=24\pi$ (cm)
 $S=\pi \times 7^2-\pi \times 5^2=49\pi-25\pi=24\pi$ (cm²)
 (2) $l=2\pi \times 4+2\pi \times 2=8\pi+4\pi=12\pi$ (cm)
 $S=\pi \times 4^2-\pi \times 2^2=16\pi-4\pi=12\pi$ (cm²)
 (3) $l=(2\pi \times 7) \times \frac{1}{2}+(2\pi \times 4) \times \frac{1}{2}+(2\pi \times 3) \times \frac{1}{2}$
 $=7\pi+4\pi+3\pi=14\pi$ (cm)
 $S=(\pi \times 7^2) \times \frac{1}{2}-(\pi \times 4^2) \times \frac{1}{2}-(\pi \times 3^2) \times \frac{1}{2}$
 $=\frac{49}{2}\pi-8\pi-\frac{9}{2}\pi=12\pi$ (cm²)
 (4) $l=(2\pi \times 8) \times \frac{1}{2}+(2\pi \times 3) \times \frac{1}{2}+(2\pi \times 5) \times \frac{1}{2}$
 $=8\pi+3\pi+5\pi=16\pi$ (cm)
 $S=(\pi \times 8^2) \times \frac{1}{2}+(\pi \times 3^2) \times \frac{1}{2}-(\pi \times 5^2) \times \frac{1}{2}$
 $=32\pi+\frac{9}{2}\pi-\frac{25}{2}\pi=24\pi$ (cm²)

유형 4 P. 63

- 1 (1) $l: \pi$ cm, $S: \frac{3}{2}\pi$ cm² (2) $l: 14\pi$ cm, $S: 84\pi$ cm²
 2 (1) 72° (2) 160° 3 (1) 2π cm² (2) 135π cm²
 4 (1) 10 cm (2) 3 cm 5 (1) $\frac{4}{3}\pi$ cm (2) 3π cm
 6 (1) (6π+20) cm (2) 30π cm²

- 1 (1) $l=2\pi \times 3 \times \frac{60}{360}=\pi$ (cm)
 $S=\pi \times 3^2 \times \frac{60}{360}=\frac{3}{2}\pi$ (cm²)
 (2) $l=2\pi \times 12 \times \frac{210}{360}=14\pi$ (cm)
 $S=\pi \times 12^2 \times \frac{210}{360}=84\pi$ (cm²)
- 2 (1) 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면
 $2\pi \times 5 \times \frac{x}{360}=2\pi \quad \therefore x=72$
 따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 72°이다.
 (2) 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면
 $\pi \times 6^2 \times \frac{x}{360}=16\pi \quad \therefore x=160$
 따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 160°이다.
- 3 (1) $\frac{1}{2} \times 4 \times \pi=2\pi$ (cm²)
 (2) $\frac{1}{2} \times 15 \times 18\pi=135\pi$ (cm²)
- 4 (1) 반지름의 길이를 r cm라고 하면
 $\frac{1}{2} \times r \times 5\pi=25\pi \quad \therefore r=10$
 따라서 반지름의 길이는 10 cm이다.

- (2) 반지름의 길이를 r cm라고 하면
 $\frac{1}{2} \times r \times 4\pi=6\pi \quad \therefore r=3$
 따라서 반지름의 길이는 3 cm이다.


- 5 (1) 호의 길이를 l cm라고 하면
 $\frac{1}{2} \times 9 \times l=6\pi \quad \therefore l=\frac{4}{3}\pi$
 따라서 호의 길이는 $\frac{4}{3}\pi$ cm이다.
 (2) 호의 길이를 l cm라고 하면
 $\frac{1}{2} \times 10 \times l=15\pi \quad \therefore l=3\pi$
 따라서 호의 길이는 3π cm이다.

- 6 (1) (둘레의 길이)=①+②+③×2
 $=2\pi \times 20 \times \frac{36}{360}+2\pi \times 10 \times \frac{36}{360}+10 \times 2$
 $=4\pi+2\pi+20=6\pi+20$ (cm)
 (2) (넓이)= $\pi \times 20^2 \times \frac{36}{360}-\pi \times 10^2 \times \frac{36}{360}$
 $=40\pi-10\pi=30\pi$ (cm²)

한 걸음 더 연습 P. 64

- 1 $l: 16\pi$ cm, $S: 32\pi$ cm² 2 $\frac{10}{3}\pi$ cm
 3 216°
 4 (1) (72π-144) cm² (2) (8π-16) cm²
 5 (1) 32 cm² (2) 200 cm²


- 1 $l=2\pi \times 6+2\pi \times 2$
 $=12\pi+4\pi=16\pi$ (cm)
 $S=\pi \times 6^2-\pi \times 2^2$
 $=36\pi-4\pi=32\pi$ (cm²)
- 2 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=2:3:4$ 이므로
 $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=2:3:4$
 $\angle BOC=360^\circ \times \frac{3}{2+3+4}=360^\circ \times \frac{1}{3}=120^\circ$
 \therefore (부채꼴 BOC의 호의 길이)= $2\pi \times 5 \times \frac{120}{360}$
 $=\frac{10}{3}\pi$ (cm)
- 3 부채꼴의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
 $\frac{1}{2} \times r \times 12\pi=60\pi \quad \therefore r=10$
 따라서 부채꼴의 반지름의 길이는 10 cm이다.
 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면
 $2\pi \times 10 \times \frac{x}{360}=12\pi \quad \therefore x=216$
 따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 216°이다.

4 (1) 

$$= \left(12\text{cm} \times 12\text{cm} \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 12 \times 12 \right) \times 2$$

$$= (36\pi - 72) \times 2$$

$$= 72\pi - 144(\text{cm}^2)$$

(2) 

$$= \left(\pi \times 4^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) \times 2$$

$$= (4\pi - 8) \times 2$$

$$= 8\pi - 16(\text{cm}^2)$$

5 (1) 오른쪽 그림과 같이 색칠한 부분을 이동하면
(색칠한 부분의 넓이)
= (직각삼각형의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32(\text{cm}^2)$

(2) 오른쪽 그림과 같이 색칠한 부분을 이동하면
(색칠한 부분의 넓이)
= (직각삼각형의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200(\text{cm}^2)$

쌍둥이 기출문제

P. 65~67

- 1 (1) $24\pi \text{ cm}$ (2) $48\pi \text{ cm}^2$
- 2 $20\pi \text{ cm}$, $12\pi \text{ cm}^2$
- 3 $(\pi + 8) \text{ cm}$, $2\pi \text{ cm}^2$
- 4 $(12\pi + 18) \text{ cm}$, $54\pi \text{ cm}^2$ 5 ⑤ 6 80°
- 7 6 cm 8 ②
- 9 $(6\pi + 6) \text{ cm}$, $9\pi \text{ cm}^2$
- 10 $\left(\frac{9}{2}\pi + 10\right) \text{ cm}$, $\frac{45}{4}\pi \text{ cm}^2$
- 11 (1) $(10\pi + 10) \text{ cm}$ (2) $\frac{25}{2}\pi \text{ cm}^2$
- 12 $(8\pi + 8) \text{ cm}$, $8\pi \text{ cm}^2$
- 13 $9\pi \text{ cm}$, $\left(\frac{81}{2}\pi - 81\right) \text{ cm}^2$
- 14 $(6\pi + 24) \text{ cm}$, $(72 - 18\pi) \text{ cm}^2$
- 15 49 cm^2 16 $(25\pi - 50) \text{ cm}^2$
- 17 $12\pi \text{ cm}^2$ 18 $8\pi \text{ cm}^2$

[1~2] 원의 둘레의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면
 $l = 2\pi r$, $S = \pi r^2$

1 (1) (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= 2\pi \times 8 + 2\pi \times 4$
 $= 16\pi + 8\pi$
 $= 24\pi(\text{cm})$

(2) (색칠한 부분의 넓이) $= \pi \times 8^2 - \pi \times 4^2$
 $= 64\pi - 16\pi$
 $= 48\pi(\text{cm}^2)$

2 (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= 2\pi \times 5 + 2\pi \times 2 + 2\pi \times 3$
 $= 10\pi + 4\pi + 6\pi$
 $= 20\pi(\text{cm})$

(색칠한 부분의 넓이) $= \pi \times 5^2 - \pi \times 2^2 - \pi \times 3^2$
 $= 25\pi - 4\pi - 9\pi$
 $= 12\pi(\text{cm}^2)$

[3~8] 부채꼴의 호의 길이와 넓이

(1) 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

$$l = 2\pi r \times \frac{x}{360}, S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$

(2) 반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 넓이를 S 라고 하면


$$S = \frac{1}{2}rl$$

3 (둘레의 길이) $= 2\pi \times 4 \times \frac{45}{360} + 4 \times 2$
 $= \pi + 8(\text{cm})$

(넓이) $= \pi \times 4^2 \times \frac{45}{360} = 2\pi(\text{cm}^2)$

4 (둘레의 길이) $= 2\pi \times 9 \times \frac{240}{360} + 9 \times 2$
 $= 12\pi + 18(\text{cm})$

(넓이) $= \pi \times 9^2 \times \frac{240}{360} = 54\pi(\text{cm}^2)$



5 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면

$$2\pi \times 5 \times \frac{x}{360} = 4\pi \quad \therefore x = 144$$

따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 144° 이다.

6 부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면

$$\pi \times 3^2 \times \frac{x}{360} = 2\pi \quad \therefore x = 80$$

따라서 부채꼴의 중심각의 크기는 80° 이다.

7 부채꼴의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면

$$\frac{1}{2} \times r \times \pi = 3\pi \quad \therefore r = 6$$

따라서 부채꼴의 반지름의 길이는 6 cm 이다.

8 부채꼴의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면


$$\frac{1}{2} \times r \times 2\pi = 5\pi \quad \therefore r = 5$$

따라서 부채꼴의 반지름의 길이는 5 cm 이다.

[9~10] 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이 구하기

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서

- (1) (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 = (큰 호의 길이) + (작은 호의 길이)
 + (선분의 길이) × 2
- (2) (색칠한 부분의 넓이)
 = (큰 부채꼴의 넓이) - (작은 부채꼴의 넓이)




9 (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= 2\pi \times 6 \times \frac{120}{360} + 2\pi \times 3 \times \frac{120}{360} + 3 \times 2$
 $= 4\pi + 2\pi + 6 = 6\pi + 6(\text{cm})$
 (색칠한 부분의 넓이)
 $= \pi \times 6^2 \times \frac{120}{360} - \pi \times 3^2 \times \frac{120}{360}$
 $= 12\pi - 3\pi = 9\pi(\text{cm}^2)$

10 (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= 2\pi \times 7 \times \frac{90}{360} + 2\pi \times 2 \times \frac{90}{360} + 5 \times 2$
 $= \frac{7}{2}\pi + \pi + 10 = \frac{9}{2}\pi + 10(\text{cm})$
 (색칠한 부분의 넓이)
 $= \pi \times 7^2 \times \frac{90}{360} - \pi \times 2^2 \times \frac{90}{360}$
 $= \frac{49}{4}\pi - \pi = \frac{45}{4}\pi(\text{cm}^2)$


[11~18] 색칠한 부분의 넓이 구하기

- (1) 전체의 넓이에서 색칠하지 않은 부분의 넓이를 빼어서 색칠한 부분의 넓이를 구한다.



이때 같은 부분이 있으면 한 부분의 넓이를 구하여 같은 부분의 개수를 곱한다.

- (2) 도형의 일부분을 적당히 이동하여 넓이를 구한다.



11 (1) (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= 2\pi \times 10 \times \frac{90}{360} + (2\pi \times 5) \times \frac{1}{2} + 10$
 $= 5\pi + 5\pi + 10 = 10\pi + 10(\text{cm}) \quad \dots (i)$
 (2) (색칠한 부분의 넓이)
 $= \pi \times 10^2 \times \frac{90}{360} - (\pi \times 5^2) \times \frac{1}{2}$
 $= 25\pi - \frac{25}{2}\pi = \frac{25}{2}\pi(\text{cm}^2) \quad \dots (ii)$

채점 기준	비율
(i) 색칠한 부분의 둘레의 길이 구하기	50%
(ii) 색칠한 부분의 넓이 구하기	50%


12 (색칠한 부분의 둘레의 길이)
 $= 2\pi \times 8 \times \frac{90}{360} + (2\pi \times 4) \times \frac{1}{2} + 8$
 $= 4\pi + 4\pi + 8 = 8\pi + 8(\text{cm})$
 (색칠한 부분의 넓이)
 $= \pi \times 8^2 \times \frac{90}{360} - (\pi \times 4^2) \times \frac{1}{2}$
 $= 16\pi - 8\pi = 8\pi(\text{cm}^2)$

13 (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= (2\pi \times 9 \times \frac{90}{360}) \times 2$
 $= 9\pi(\text{cm})$


오른쪽 그림과 같이 보조선

을 그으면

(색칠한 부분의 넓이)
 $= (\pi \times 9^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 9 \times 9) \times 2$
 $= (\frac{81}{4}\pi - \frac{81}{2}) \times 2$
 $= \frac{81}{2}\pi - 81(\text{cm}^2)$




14 (색칠한 부분의 둘레의 길이) $= (2\pi \times 6 \times \frac{90}{360}) \times 2 + 6 \times 4$
 $= 6\pi + 24(\text{cm})$




\therefore (색칠한 부분의 넓이) $= (6 \times 6 - \pi \times 6^2 \times \frac{90}{360}) \times 2$
 $= (36 - 9\pi) \times 2$
 $= 72 - 18\pi(\text{cm}^2)$

- 15** 오른쪽 그림과 같이 색칠한 부분을 이동하면


(색칠한 부분의 넓이) $= \frac{1}{4} \times 14 \times 14$
 $= 49(\text{cm}^2)$



- 16** 다음 그림과 같이 색칠한 부분을 이동하면




\therefore (색칠한 부분의 넓이) $= \pi \times 10^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 10 \times 10$
 $= 25\pi - 50(\text{cm}^2)$



\therefore (색칠한 부분의 넓이) = (부채꼴 B'AB의 넓이)
 $= \pi \times 12^2 \times \frac{30}{360}$
 $= 12\pi(\text{cm}^2)$

18



∴ (색칠한 부분의 넓이) = (부채꼴 B'AB의 넓이)

$$= \pi \times 8^2 \times \frac{45}{360}$$

$$= 8\pi (\text{cm}^2)$$

단원 마무리


P. 68~69

- 1 ③ 2 ③ 3 15 cm 4 ④ 5 ①
 6 6π cm 7 ④ 8 8π cm²

1 $6 : x = 20^\circ : 30^\circ, 20x = 180 \quad \therefore x = 9$
 $6 : 24 = 20^\circ : y^\circ, 6y = 480 \quad \therefore y = 80$

2 $\widehat{AC} : \widehat{CB} = 1 : 3$ 이므로
 $\angle AOC : \angle COB = 1 : 3$
 $\therefore \angle AOC = 180^\circ \times \frac{1}{1+3} = 180^\circ \times \frac{1}{4} = 45^\circ$

3 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이므로
 $\angle OAC = \angle BOD = 40^\circ$ (동위각) ... (i)
 오른쪽 그림과 같이 \overline{OC} 를 그으면
 $\triangle OCA$ 가
 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle OCA = \angle OAC = 40^\circ$... (ii)
 $\therefore \angle AOC = 180^\circ - (40^\circ + 40^\circ) = 100^\circ$... (iii)
 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
 $\widehat{AC} : 6 = 100^\circ : 40^\circ, 40\widehat{AC} = 600$
 $\therefore \widehat{AC} = 15(\text{cm})$... (iv)



채점 기준	비율
(i) $\angle OAC$ 의 크기 구하기	20%
(ii) $\angle OCA$ 의 크기 구하기	20%
(iii) $\angle AOC$ 의 크기 구하기	20%
(iv) \widehat{AC} 의 길이 구하기	40%

4 $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 이므로
 $\angle COD = \angle DOE = \angle AOB = 40^\circ$
 $\therefore \angle COE = \angle COD + \angle DOE = 40^\circ + 40^\circ = 80^\circ$

5 (색칠한 부분의 둘레의 길이)

$$= (2\pi \times 4) \times \frac{1}{2} + (2\pi \times 3) \times \frac{1}{2} + (2\pi \times 1) \times \frac{1}{2}$$

$$= 4\pi + 3\pi + \pi = 8\pi(\text{cm})$$

6 부채꼴의 호의 길이를 l cm라고 하면

$$\frac{1}{2} \times 10 \times l = 30\pi \quad \therefore l = 6\pi$$

따라서 부채꼴의 호의 길이는 6π cm이다.

다른 풀이

부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라고 하면

$$\pi \times 10^2 \times \frac{x}{360} = 30\pi \text{에서 } x = 108$$

따라서 부채꼴의 호의 길이는

$$2\pi \times 10 \times \frac{108}{360} = 6\pi(\text{cm})$$


7 (색칠한 부분의 둘레의 길이)

$$= 2\pi \times 8 \times \frac{72}{360} + 2\pi \times 5 \times \frac{72}{360} + 3 \times 2$$

$$= \frac{16}{5}\pi + 2\pi + 6$$

$$= \frac{26}{5}\pi + 6(\text{cm})$$

8 다음 그림과 같이 색칠한 부분을 이동하면



∴ (색칠한 부분의 넓이) = $(\pi \times 4^2) \times \frac{1}{2}$

$$= 8\pi(\text{cm}^2)$$

1 다면체

유형 1

P. 72~73

1~4 풀이 참조

5 (1) 구면체 (2) 구면체 (3) 십일면체

6 (1) 직사각형 (2) 삼각형 (3) 사다리꼴

7 (1) 16개, 24개 (2) 10개, 18개 (3) 14개, 21개

8 팔각기둥 9 육각뿔대 10 오각뿔

입체도형							
다면체이면 ○, 아니면 ×	○	○	○	×	×	○	○

입체도형					n 각기둥
이름	삼각기둥	사각기둥	오각기둥	육각기둥	
몇 면체?	오면체	육면체	칠면체	팔면체	$(n+2)$ 면체
꼭짓점의 개수	$3 \times 2 = 6(\text{개})$	$4 \times 2 = 8(\text{개})$	10개	$6 \times 2 = 12(\text{개})$	2n개
모서리의 개수	$3 \times 3 = 9(\text{개})$	$4 \times 3 = 12(\text{개})$	$5 \times 3 = 15(\text{개})$	18개	3n개

입체도형					n 각뿔
이름	삼각뿔	사각뿔	오각뿔	육각뿔	
몇 면체?	사면체	오면체	육면체	칠면체	$(n+1)$ 면체
꼭짓점의 개수	$3+1 = 4(\text{개})$	$4+1 = 5(\text{개})$	6개	$6+1 = 7(\text{개})$	$(n+1)$ 개
모서리의 개수	$3 \times 2 = 6(\text{개})$	$4 \times 2 = 8(\text{개})$	$5 \times 2 = 10(\text{개})$	12개	2n개

입체도형					n 각뿔대
이름	삼각뿔대	사각뿔대	오각뿔대	육각뿔대	
몇 면체?	오면체	육면체	칠면체	팔면체	$(n+2)$ 면체
꼭짓점의 개수	$3 \times 2 = 6(\text{개})$	$4 \times 2 = 8(\text{개})$	10개	$6 \times 2 = 12(\text{개})$	2n개
모서리의 개수	$3 \times 3 = 9(\text{개})$	$4 \times 3 = 12(\text{개})$	$5 \times 3 = 15(\text{개})$	18개	3n개

참고 n 각뿔대는 n 각기둥과 꼭짓점, 모서리, 면의 개수가 각각 같다.

- 5 (1) 면의 개수: $7+2=9(\text{개})$ ∴ 구면체
 (2) 면의 개수: $8+1=9(\text{개})$ ∴ 구면체
 (3) 면의 개수: $9+2=11(\text{개})$ ∴ 십일면체

- 7 (1) 꼭짓점의 개수: $8 \times 2 = 16(\text{개})$
 모서리의 개수: $8 \times 3 = 24(\text{개})$
 (2) 꼭짓점의 개수: $9+1=10(\text{개})$
 모서리의 개수: $9 \times 2 = 18(\text{개})$
 (3) 꼭짓점의 개수: $7 \times 2 = 14(\text{개})$
 모서리의 개수: $7 \times 3 = 21(\text{개})$

- 8 (가), (나), (다)에서 주어진 다면체는 각기둥이므로 n 각기둥이라고 하면
 (라)에서 $n+2=10$ ∴ $n=8$
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 팔각기둥이다.

- 9 (가), (나)에서 주어진 다면체는 각뿔대이므로 n 각뿔대라고 하면
 (다)에서 $2n=12$ ∴ $n=6$
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 육각뿔대이다.

- 10 (가), (나)에서 주어진 다면체는 각뿔이므로 n 각뿔이라고 하면
 (다)에서 $2n=10$ ∴ $n=5$
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 오각뿔이다.

쌍둥이 기출문제

P. 74~75

- 1 ⑤ 2 3개 3 ② 4 ④ 5 ③
 6 ① 7 ② 8 46 9 ⑤ 10 ④
 11 ② 12 ④ 13 ①, ⑤ 14 ②, ⑤ 15 ③
 16 팔각뿔

[1~2] 다면체: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형

- 1 ⑤ 원뿔은 옆면이 곡면으로 이루어져 있으므로 다면체가 아닙니다.
 2 다면체는 나. 사각뿔, 다. 정육면체, 라. 오각뿔대의 3개이다.

[3~4] 다면체의 면의 개수

다면체	n 각기둥	n 각뿔	n 각뿔대
면의 개수	$(n+2)$ 개	$(n+1)$ 개	$(n+2)$ 개
몇 면체?	$(n+2)$ 면체	$(n+1)$ 면체	$(n+2)$ 면체

3 주어진 입체도형은 사각뿔이므로 면의 개수는 $4+1=5$ (개)가 되어 오면체이다.

4 면의 개수는 각각 다음과 같다.

- ① $4+2=6$ (개) \Rightarrow 육면체
 - ② $3+1=4$ (개) \Rightarrow 사면체
 - ③ $3+2=5$ (개) \Rightarrow 오면체
 - ④ $5+2=7$ (개) \Rightarrow 칠면체
 - ⑤ $5+1=6$ (개) \Rightarrow 육면체
- 따라서 칠면체인 것은 ④이다.

[5~10] 다면체의 꼭짓점, 모서리의 개수

다면체	n 각기둥	n 각뿔	n 각뿔대
꼭짓점의 개수	$2n$ 개	$(n+1)$ 개	$2n$ 개
모서리의 개수	$3n$ 개	$2n$ 개	$3n$ 개

5 꼭짓점의 개수는 각각 다음과 같다.
 ① $5+1=6$ (개) ② 8개 ③ $5 \times 2=10$ (개)
 ④ $6 \times 2=12$ (개) ⑤ $10+1=11$ (개)
 따라서 바르게 짝 지은 것은 ③이다.

6 모서리의 개수는 각각 다음과 같다.
 ① $5 \times 3=15$ (개) ② $6 \times 2=12$ (개) ③ $4 \times 3=12$ (개)
 ④ $4 \times 2=8$ (개) ⑤ $3 \times 3=9$ (개)
 따라서 모서리의 개수가 가장 많은 것은 ①이다.

7 삼각기둥의 면의 개수는 $3+2=5$ (개)이므로 $a=5$
 오각뿔의 모서리의 개수는 $5 \times 2=10$ (개)이므로 $b=10$
 사각뿔대의 꼭짓점의 개수는 $4 \times 2=8$ (개)이므로 $c=8$
 $\therefore a+b-c=5+10-8=7$

8 육각기둥의 모서리의 개수는 $6 \times 3=18$ (개)이므로 $a=18$... (i)
 칠각뿔의 면의 개수는 $7+1=8$ (개)이므로 $b=8$... (ii)
 십각뿔대의 꼭짓점의 개수는 $10 \times 2=20$ (개)이므로 $c=20$... (iii)
 $\therefore a+b+c=18+8+20=46$... (iv)

채점 기준	비율
(i) a 의 값 구하기	30%
(ii) b 의 값 구하기	30%
(iii) c 의 값 구하기	30%
(iv) $a+b+c$ 의 값 구하기	10%

9 모서리의 개수가 24개인 각기둥을 n 각기둥이라고 하면 $3n=24 \quad \therefore n=8$, 즉 팔각기둥
 따라서 팔각기둥의 면의 개수는 $8+2=10$ (개)

10 꼭짓점의 개수가 18개인 각뿔대를 n 각뿔대라고 하면 $2n=18 \quad \therefore n=9$, 즉 구각뿔대
 따라서 구각뿔대의 밑면의 모양은 구각형이다.

[11~12] 다면체의 옆면의 모양

다면체	각기둥	각뿔	각뿔대
옆면의 모양	직사각형	삼각형	사다리꼴

11 ① 삼각기둥 - 직사각형 ③ 오각뿔 - 삼각형
 ④ 육각뿔대 - 사다리꼴 ⑤ 칠각기둥 - 직사각형
 따라서 바르게 짝 지은 것은 ②이다.

12 옆면의 모양은 각각 다음과 같다.
 ① 사다리꼴 ② 직사각형 ③ 직사각형
 ④ 삼각형 ⑤ 사다리꼴
 따라서 사각형이 아닌 것은 ④이다.

[13~16] 다면체의 이해

- (1) 각기둥: 두 밑면은 서로 평행하고 합동인 다각형이며, 옆면은 모두 직사각형인 다면체
- (2) 각뿔: 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 삼각형인 다면체
- (3) 각뿔대: 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘라서 생기는 두 다면체 중 각뿔이 아닌 쪽의 도형

13 ② 육각뿔의 꼭짓점의 개수는 $6+1=7$ (개)이다.
 ③ 각뿔대의 옆면의 모양은 사다리꼴이다.
 ④ 각기둥의 두 밑면은 서로 평행하다.
 따라서 옳은 것은 ①, ⑤이다.

14 ② 옆면의 모양은 사다리꼴이다.
 ⑤ n 각뿔대의 모서리의 개수는 $3n$ 개이다.


15 (나), (다)에서 주어진 입체도형은 각뿔대이므로 n 각뿔대라고 하면 (가)에서 $n+2=6 \quad \therefore n=4$
 따라서 조건을 모두 만족시키는 입체도형은 사각뿔대이다.

16 (가), (나)에서 주어진 다면체는 각뿔이므로 n 각뿔이라고 하면 (다)에서 $2n=16 \quad \therefore n=8$
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 팔각뿔이다.

2 정다면체

유형 2

P. 76

1	계량도					
	이름	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
	면의 모양	정삼각형	정사각형	정삼각형	정오각형	정삼각형
	한 꼭짓점에 모인 면의 개수	3개	3개	4개	3개	5개
	꼭짓점의 개수	4개	8개	6개	20개	12개
	모서리의 개수	6개	12개	12개	30개	30개
	면의 개수	4개	6개	8개	12개	20개

2 (1) × (2) ○ (3) ○ (4) × (5) ×

3 정사면체 4 정육면체


- 2 (1) 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체의 다섯 가지뿐이다.
 (4) 정다면체의 이름은 면의 개수에 따라 결정된다.
 (5) 모든 면이 합동인 정다각형이고, 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체를 정다면체라고 한다.
- 3 (가) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
 ⇒ 정사면체, 정팔면체, 정이십면체
 (나) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3개이다.
 ⇒ 정사면체, 정육면체, 정십이면체
 따라서 조건을 모두 만족시키는 정다면체는 정사면체이다.
- 4 (가) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3개이다.
 ⇒ 정사면체, 정육면체, 정십이면체
 (나) 모서리의 개수는 12개이다.
 ⇒ 정육면체, 정팔면체
 따라서 조건을 모두 만족시키는 정다면체는 정육면체이다.

유형 3

P. 77


- 1 (1) 정사면체 (2) 4, 6 (3) 풀이 참조 (4) E, ED
 2 (1) 정육면체 (2) 8개, 12개 (3) 풀이 참조 (4) 4개
 3 (1) 정팔면체 (2) 6개, 12개 (3) 4개
 (4) 풀이 참조 (5) 점 I, HG

1 (3) 주어진 전개도로 만들어지는 정사면체는 다음 그림과 같다.




(4) 점 A와 겹치는 꼭짓점은 점 E, AB와 겹치는 모서리는 ED이다.


2 (3) 주어진 전개도로 만들어지는 정육면체는 다음 그림과 같다.



(4) 오른쪽 그림에서 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 DG, EH, GN, HM의 4개이다.



3 (4) 주어진 전개도로 만들어지는 정팔면체는 다음 그림과 같다.



(5) 점 A와 겹치는 꼭짓점은 점 I, BC와 겹치는 모서리는 HG이다.

쌍둥이 기출문제

P. 78

- 1 18 2 70 3 12개 4 42 5 ③
 6 ㄱ, ㄴ 7 ⑤ 8 ③

1 정육면체의 모서리의 개수는 12개이므로 $a=12$
 정팔면체의 꼭짓점의 개수는 6개이므로 $b=6$
 $\therefore a+b=12+6=18$


2 정십이면체의 꼭짓점의 개수는 20개이므로 $a=20$
 정이십면체의 모서리의 개수는 30개이므로 $b=30$
 $\therefore 2a+b=2 \times 20+30=70$

- 3 (가), (나)에서 주어진 다면체는 정다면체이다.
 (가) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
 ⇒ 정사면체, 정팔면체, 정이십면체
 (나) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수는 4개이다.
 ⇒ 정팔면체
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 정팔면체이므로
 그 모서리의 개수는 12개이다.


- 4 (가), (나)에서 주어진 다면체는 정다면체이다.
 (가) 모든 면이 합동인 정삼각형이다.
 ⇒ 정사면체, 정팔면체, 정이십면체
 (나) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수는 5개이다.
 ⇒ 정이십면체
 따라서 조건을 모두 만족시키는 다면체는 정이십면체이다.
 정이십면체의 꼭짓점의 개수는 12개이므로 $a=12$
 정이십면체의 모서리의 개수는 30개이므로 $b=30$
 ∴ $a+b=12+30=42$

- 5 ③ 정다면체의 면의 모양은 정삼각형, 정사각형, 정오각형의 세 가지이다.
- 6 나. 정사면체의 면의 모양은 정삼각형이다.
 다. 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정이십면체, 정이십면체의 다섯 가지뿐이다.
 따라서 옳은 것은 가, 라이다.


[7~8] 정다면체의 전개도



- 7 주어진 전개도로 만들어지는 정육면체는 오른쪽 그림과 같으므로 \overline{EF} 와 겹치는 모서리는 ⑤ \overline{KJ} 이다.



- 8 주어진 전개도로 만들어지는 정팔면체는 오른쪽 그림과 같으므로 \overline{AB} 와 꼬인 위치에 있는 모서리가 아닌 것은 ③ \overline{CG} 이다.



3 회전체

유형 4

P. 79

- 1 가, 다, 모

2				
평면도형				
회전체				

- 3 (1) 나 (2) 다 (3) 가


- 1 가, 다, 모. 회전체 나, 라, 바. 다면체

유형 5

P. 80


- 1 (1) ㉠ (2) ㉡ (3) ㉢ (4) ㉣
 2 (1) ㉠ (2) ㉡ (3) ㉢ (4) ㉣
 3 (1) 원기둥 (2) 원, $25\pi \text{ cm}^2$ (3) 직사각형, 80 cm^2
 4 (1) 원뿔 (2) 이등변삼각형, 28 cm^2

- 3 (1) 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같은 원기둥이다.



- (2) 이 원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 반지름의 길이가 5 cm인 원이므로
 (단면의 넓이) = $\pi \times 5^2 = 25\pi (\text{cm}^2)$
 (3) 이 원기둥을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 가로 길이가 $5 \times 2 = 10 (\text{cm})$, 세로 길이가 8 cm인 직사각형이므로
 (단면의 넓이) = $10 \times 8 = 80 (\text{cm}^2)$

- 4 (1) 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같은 원뿔이다.



- (2) 이 원뿔을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 밑변의 길이가 $4 \times 2 = 8 (\text{cm})$, 높이가 7 cm인 삼각형이므로
 (단면의 넓이) = $\frac{1}{2} \times 8 \times 7 = 28 (\text{cm}^2)$

- 1 (1) $a=5, b=8$ (2) $a=10, b=6$ (3) $a=8, b=5$
 2 $10\pi, 5, 5$ 3 둘레, 5, 10π


쌍둥이 기출문제

P. 82~83


- 1 ③ 2 ④ 3 ② 4 ⑤ 5 ①
 6 ③ 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 $12\pi \text{ cm}$
 11 ③ 12 ①, ③

[1~4] 회전체: 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형

- 1 ③ 오각기둥은 회전체가 아닌 다면체이다.
 2 가, 르, 무. 다면체
 나, 다, 바. 회전체
 3 주어진 평면도형을 각각 1회전 시키면 다음과 같다.



따라서 주어진 입체도형은 ②를 1회전 시켜 만든 것이다.




따라서 옳은 것은 ⑤이다.

[5~8] 회전체의 성질

- (1) 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 경계
 ⇨ 항상 원이다.
 (2) 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면
 ⇨ 모두 합동이고, 회전축에 대하여 선대칭도형이다.


- 5 ① 원기둥 - 직사각형
 6 ① 원뿔 - 회전축을 포함하는 평면 - 이등변삼각형
 ② 원뿔대 - 회전축을 포함하는 평면 - 사다리꼴
 ④ 반구 - 회전축에 수직인 평면 - 원
 ⑤ 원기둥 - 회전축에 수직인 평면 - 원
 따라서 바르게 짝 지은 것은 ③이다.

- 7 원뿔을 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면은 오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 8 cm, 높이가 6 cm인 이등변삼각형이므로



$$(\text{단면의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24 (\text{cm}^2)$$


- 8 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같은 원뿔대이다.
 이 원뿔대를 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면은 윗변의 길이가 8 cm, 아랫변의 길이가 10 cm, 높이가 6 cm인 사다리꼴이므로



$$(\text{단면의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (8 + 10) \times 6 = 54 (\text{cm}^2)$$

[9~10] 회전체의 전개도

- (1) 원기둥의 전개도 (2) 원뿔의 전개도 (3) 원뿔대의 전개도



- 9 밑면인 원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면
 $2\pi r = 8\pi \quad \therefore r = 4$
 따라서 밑면인 원의 반지름의 길이는 4 cm이다.
 10 (옆면인 부채꼴의 호의 길이) = (밑면인 원의 둘레의 길이)
 $= 2\pi \times 6 = 12\pi (\text{cm})$
 11 ③ 원기둥을 회전축에 평행한 평면으로 자른 단면은 직사각형이다.
 12 ① 구는 전개도를 그릴 수 없다.
 ③ 원뿔대를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 모두 합동인 사다리꼴이다.


1 기둥의 겹넓이와 부피

유형 1

P. 88

- 1 5, 3, (1) 6 cm^2 (2) 96 cm^2 (3) 108 cm^2
- 2 6π , (1) $9\pi\text{ cm}^2$ (2) $42\pi\text{ cm}^2$ (3) $60\pi\text{ cm}^2$
- 3 (1) 236 cm^2 (2) 300 cm^2 (3) $130\pi\text{ cm}^2$ (4) 276 cm^2


1



- (1) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6(\text{cm}^2)$
- (2) (옆넓이) $= (4 + 5 + 3) \times 8 = 96(\text{cm}^2)$
- (3) (겉넓이) $= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
 $= 6 \times 2 + 96 = 108(\text{cm}^2)$

2

원기둥의 전개도에서 옆면의 가로의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같으므로
 (옆면의 가로 길이) $= 2\pi \times 3$
 $= 6\pi(\text{cm})$



- (1) (밑넓이) $= \pi \times 3^2 = 9\pi(\text{cm}^2)$
- (2) (옆넓이) $= 6\pi \times 7 = 42\pi(\text{cm}^2)$
- (3) (겉넓이) $= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
 $= 9\pi \times 2 + 42\pi$
 $= 60\pi(\text{cm}^2)$

3

- (1) (겉넓이) $= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
 $= (6 \times 5) \times 2 + (6 + 5 + 6 + 5) \times 8$
 $= 60 + 176$
 $= 236(\text{cm}^2)$
- (2) (겉넓이) $= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
 $= \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 5\right) \times 2 + (5 + 12 + 13) \times 8$
 $= 60 + 240 = 300(\text{cm}^2)$
- (3) (겉넓이) $= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
 $= (\pi \times 5^2) \times 2 + (2\pi \times 5) \times 8$
 $= 50\pi + 80\pi$
 $= 130\pi(\text{cm}^2)$
- (4) (겉넓이) $= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
 $= \left\{ \frac{1}{2} \times (4 + 8) \times 3 \right\} \times 2 + (4 + 3 + 8 + 5) \times 12$
 $= 36 + 240$
 $= 276(\text{cm}^2)$

유형 2

P. 89

- 1 (1) 160 cm^3 (2) $100\pi\text{ cm}^3$
- 2 (1) 9 cm^2 , 7 cm , 63 cm^3
 (2) 12 cm^2 , 5 cm , 60 cm^3
 (3) 24 cm^2 , 8 cm , 192 cm^3
 (4) $16\pi\text{ cm}^2$, 7 cm , $112\pi\text{ cm}^3$
 (5) $25\pi\text{ cm}^2$, 6 cm , $150\pi\text{ cm}^3$
- 3 (1) 45 cm^2 (2) 360 cm^3
- 4 108π , 12π , 120π
- 5 80π , 5π , 75π

1

- (1) (부피) $= 32 \times 5 = 160(\text{cm}^3)$
- (2) (부피) $= 25\pi \times 4 = 100\pi(\text{cm}^3)$

2

- (1) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9(\text{cm}^2)$
 (높이) $= 7\text{ cm}$
 \therefore (부피) $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= 9 \times 7 = 63(\text{cm}^3)$
- (2) (밑넓이) $= 3 \times 4 = 12(\text{cm}^2)$
 (높이) $= 5\text{ cm}$
 \therefore (부피) $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= 12 \times 5 = 60(\text{cm}^3)$
- (3) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times (6 + 10) \times 3$
 $= 24(\text{cm}^2)$
 (높이) $= 8\text{ cm}$
 \therefore (부피) $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= 24 \times 8$
 $= 192(\text{cm}^3)$
- (4) (밑넓이) $= \pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$
 (높이) $= 7\text{ cm}$
 \therefore (부피) $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= 16\pi \times 7$
 $= 112\pi(\text{cm}^3)$
- (5) (밑넓이) $= \pi \times 5^2 = 25\pi(\text{cm}^2)$
 (높이) $= 6\text{ cm}$
 \therefore (부피) $= (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= 25\pi \times 6$
 $= 150\pi(\text{cm}^3)$

3

- (1) (밑넓이) $= \frac{1}{2} \times 10 \times 3 + \frac{1}{2} \times 10 \times 6$
 $= 15 + 30$
 $= 45(\text{cm}^2)$
- (2) (부피) $= 45 \times 8$
 $= 360(\text{cm}^3)$


4 (큰 원기둥의 부피) = $(\pi \times 6^2) \times 3$
 $= 108\pi(\text{cm}^3)$
 (작은 원기둥의 부피) = $(\pi \times 2^2) \times 3$
 $= 12\pi(\text{cm}^3)$
 \therefore (부피) = (큰 원기둥의 부피) + (작은 원기둥의 부피)
 $= 108\pi + 12\pi$
 $= 120\pi(\text{cm}^3)$

5 큰 원기둥의 밑면인 원의 반지름의 길이는
 $1+3=4(\text{cm})$ 이므로
 (큰 원기둥의 부피) = $(\pi \times 4^2) \times 5$
 $= 80\pi(\text{cm}^3)$
 (작은 원기둥의 부피) = $(\pi \times 1^2) \times 5$
 $= 5\pi(\text{cm}^3)$
 \therefore (부피) = (큰 원기둥의 부피) - (작은 원기둥의 부피)
 $= 80\pi - 5\pi$
 $= 75\pi(\text{cm}^3)$

2 (겉넓이) = $\left\{ \frac{1}{2} \times (3+9) \times 4 \right\} \times 2 + (3+5+9+5) \times 4$
 $= 48 + 88 = 136(\text{cm}^2)$
 (부피) = $\left\{ \frac{1}{2} \times (3+9) \times 4 \right\} \times 4 = 96(\text{cm}^3)$

3 밑면인 원의 반지름의 길이가 4cm이므로
 (겉넓이) = $(\pi \times 4^2) \times 2 + (2\pi \times 4) \times 6$
 $= 32\pi + 48\pi = 80\pi(\text{cm}^2)$
 (부피) = $(\pi \times 4^2) \times 6 = 96\pi(\text{cm}^3)$

4 주어진 직사각형을 직선 l 을 회전축으로
 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은
 오른쪽 그림과 같은 원기둥이므로
 (겉넓이) = $(\pi \times 6^2) \times 2 + (2\pi \times 6) \times 10$
 $= 72\pi + 120\pi$
 $= 192\pi(\text{cm}^2)$
 (부피) = $(\pi \times 6^2) \times 10 = 360\pi(\text{cm}^3)$



5 (밑넓이) = $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6(\text{cm}^2)$
 (높이) = 5 cm
 \therefore (부피) = $6 \times 5 = 30(\text{cm}^3)$

6 (밑넓이) = $\pi \times 3^2 = 9\pi(\text{cm}^2)$
 (높이) = 8 cm
 \therefore (부피) = $9\pi \times 8 = 72\pi(\text{cm}^3)$

7 사각기둥의 겉넓이가 148cm^2 이므로
 $(5 \times 4) \times 2 + (5+4+5+4) \times h = 148$
 $40 + 18h = 148, 18h = 108 \quad \therefore h = 6$

8 원기둥의 높이를 x cm라고 하면
 원기둥의 부피가 $20\pi\text{cm}^3$ 이므로
 $(\pi \times 2^2) \times x = 20\pi \quad \dots (i)$
 $4\pi x = 20\pi \quad \therefore x = 5$
 따라서 원기둥의 높이는 5 cm이다. $\dots (ii)$

채점 기준	비율
(i) 원기둥의 높이를 구하는 식 세우기	60%
(ii) 원기둥의 높이 구하기	40%

9 (겉넓이) = $\left\{ \frac{1}{2} \times (\pi \times 2^2) \right\} \times 2 + \left\{ \frac{1}{2} \times (2\pi \times 2) + 4 \right\} \times 12$
 $= 4\pi + 24\pi + 48$
 $= 28\pi + 48(\text{cm}^2)$
 (부피) = $\left\{ \frac{1}{2} \times (\pi \times 2^2) \right\} \times 12 = 24\pi(\text{cm}^3)$

쌍둥이 기출문제

P. 90~91

- 1 $168\text{cm}^2, 120\text{cm}^3$ 2 $136\text{cm}^2, 96\text{cm}^3$
 3 $80\pi\text{cm}^2, 96\pi\text{cm}^3$ 4 $192\pi\text{cm}^2, 360\pi\text{cm}^3$
 5 30cm^3 6 $72\pi\text{cm}^3$ 7 6
 8 5 cm 9 $(28\pi + 48)\text{cm}^2, 24\pi\text{cm}^3$
 10 $(20\pi + 42)\text{cm}^2, 21\pi\text{cm}^3$ 11 72cm^3
 12 $270\pi\text{cm}^3$

[1~10] 기둥의 겉넓이와 부피

- (1) (각기둥의 겉넓이) = (밑넓이) \times 2 + (옆넓이)
 (2) 원기둥의 겉넓이(S)
 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라고 하면
 $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$
 (3) (각기둥의 부피) = (밑넓이) \times (높이)
 (4) 원기둥의 부피(V)
 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라고 하면
 $V = \pi r^2 h$

1 (겉넓이) = $\left(\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \right) \times 2 + (6+8+10) \times 5$
 $= 48 + 120 = 168(\text{cm}^2)$
 (부피) = $\left(\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \right) \times 5 = 120(\text{cm}^3)$

10 (겉넓이) = $\left(\pi \times 3^2 \times \frac{120}{360}\right) \times 2$
 $+ \left(3 + 3 + 2\pi \times 3 \times \frac{120}{360}\right) \times 7$
 $= 6\pi + 42 + 14\pi$
 $= 20\pi + 42(\text{cm}^2)$
 (부피) = $\left(\pi \times 3^2 \times \frac{120}{360}\right) \times 7 = 21\pi(\text{cm}^3)$

[11~12] 구멍이 뚫린 기둥의 부피
 (구멍이 뚫린 기둥의 부피) = (큰 기둥의 부피) - (작은 기둥의 부피)

11 (큰 사각기둥의 부피) = $(4 \times 4) \times 6 = 96(\text{cm}^3)$
 (작은 사각기둥의 부피) = $(2 \times 2) \times 6 = 24(\text{cm}^3)$
 \therefore (구멍이 뚫린 사각기둥의 부피)
 $=$ (큰 사각기둥의 부피) - (작은 사각기둥의 부피)
 $= 96 - 24$
 $= 72(\text{cm}^3)$

12 큰 원기둥의 밑면인 원의 반지름의 길이는
 $3 + 3 = 6(\text{cm})$ 이므로
 (큰 원기둥의 부피) = $(\pi \times 6^2) \times 10 = 360\pi(\text{cm}^3)$
 (작은 원기둥의 부피) = $(\pi \times 3^2) \times 10 = 90\pi(\text{cm}^3)$
 \therefore (구멍이 뚫린 원기둥의 부피)
 $=$ (큰 원기둥의 부피) - (작은 원기둥의 부피)
 $= 360\pi - 90\pi$
 $= 270\pi(\text{cm}^3)$

2 뿔의 겉넓이와 부피

유형 3 P. 92~93

- 1 12, (1) 64 cm^2 (2) 192 cm^2 (3) 256 cm^2
- 2 (1) 161 cm^2 (2) 95 cm^2
- 3 12, (1) $8\pi \text{ cm}$ (2) $16\pi \text{ cm}^2$ (3) $48\pi \text{ cm}^2$
 (4) $64\pi \text{ cm}^2$
- 4 (1) $96\pi \text{ cm}^2$ (2) $90\pi \text{ cm}^2$
- 5 (1) 9 (2) 25 (3) 16, 64 (4) 34, 64, 98
- 6 (1) 224 cm^2 (2) 120 cm^2
- 7 (1) 9π (2) 36π (3) $60\pi, 15\pi, 45\pi$
 (4) $45\pi, 45\pi, 90\pi$
- 8 (1) $38\pi \text{ cm}^2$ (2) $66\pi \text{ cm}^2$

1 (1) (밑넓이) = $8 \times 8 = 64(\text{cm}^2)$
 (2) (옆넓이) = $\left(\frac{1}{2} \times 8 \times 12\right) \times 4 = 192(\text{cm}^2)$
 (3) (겉넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)
 $= 64 + 192 = 256(\text{cm}^2)$

2 (1) (겉넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)
 $= 7 \times 7 + \left(\frac{1}{2} \times 7 \times 8\right) \times 4$
 $= 49 + 112$
 $= 161(\text{cm}^2)$
 (2) (겉넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)
 $= 5 \times 5 + \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 7\right) \times 4$
 $= 25 + 70$
 $= 95(\text{cm}^2)$

3 (1) 원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 호의 길이는 밑면인 원의 둘레의 길이와 같으므로
 (부채꼴의 호의 길이) = $2\pi \times 4 = 8\pi(\text{cm})$
 (2) (밑넓이) = (밑면인 원의 넓이)
 $= \pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$
 (3) (옆넓이) = (옆면인 부채꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times 12 \times 8\pi = 48\pi(\text{cm}^2)$
 (4) (겉넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)
 $= 16\pi + 48\pi = 64\pi(\text{cm}^2)$

4 (1) (겉넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)
 $= \pi \times 6^2 + \frac{1}{2} \times 10 \times (2\pi \times 6)$
 $= 36\pi + 60\pi$
 $= 96\pi(\text{cm}^2)$
 (2) (겉넓이) = (밑넓이) + (옆넓이)
 $= \pi \times 5^2 + \frac{1}{2} \times 13 \times (2\pi \times 5)$
 $= 25\pi + 65\pi$
 $= 90\pi(\text{cm}^2)$

5 (1) (작은 밑면의 넓이) = $3 \times 3 = \boxed{9}(\text{cm}^2)$
 (2) (큰 밑면의 넓이) = $5 \times 5 = \boxed{25}(\text{cm}^2)$
 (3) (옆넓이) = (사다리꼴의 넓이) $\times 4$
 $= \left\{ \frac{1}{2} \times (3 + 5) \times 4 \right\} \times 4$
 $= \boxed{16} \times 4$
 $= \boxed{64}(\text{cm}^2)$
 (4) (겉넓이) = (두 밑면의 넓이의 합) + (옆넓이)
 $= (9 + 25) + 64$
 $= \boxed{34} + \boxed{64}$
 $= \boxed{98}(\text{cm}^2)$

- 6** (1) (두 밑면의 넓이의 합) = $4 \times 4 + 8 \times 8 = 80(\text{cm}^2)$
 (옆넓이) = $\left\{ \frac{1}{2} \times (4+8) \times 6 \right\} \times 4 = 144(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) = $80 + 144 = 224(\text{cm}^2)$
- (2) (두 밑면의 넓이의 합) = $2 \times 2 + 6 \times 6 = 40(\text{cm}^2)$
 (옆넓이) = $\left\{ \frac{1}{2} \times (2+6) \times 5 \right\} \times 4 = 80(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) = $40 + 80 = 120(\text{cm}^2)$
- 7** (1) (작은 밑면의 넓이) = $\pi \times 3^2 = \boxed{9\pi}(\text{cm}^2)$
 (2) (큰 밑면의 넓이) = $\pi \times 6^2 = \boxed{36\pi}(\text{cm}^2)$
 (3) (옆넓이) = (큰 부채꼴의 넓이) - (작은 부채꼴의 넓이)
 $= \frac{1}{2} \times 10 \times (2\pi \times 6) - \frac{1}{2} \times 5 \times (2\pi \times 3)$
 $= \boxed{60\pi} - \boxed{15\pi}$
 $= \boxed{45\pi}(\text{cm}^2)$
 (4) (겉넓이) = (두 밑면의 넓이의 합) + (옆넓이)
 $= (9\pi + 36\pi) + 45\pi$
 $= \boxed{45\pi} + \boxed{45\pi}$
 $= \boxed{90\pi}(\text{cm}^2)$

- 8** (1) (두 밑면의 넓이의 합) = $\pi \times 2^2 + \pi \times 4^2$
 $= 4\pi + 16\pi = 20\pi(\text{cm}^2)$
 (옆넓이) = $\frac{1}{2} \times 6 \times (2\pi \times 4) - \frac{1}{2} \times 3 \times (2\pi \times 2)$
 $= 24\pi - 6\pi = 18\pi(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) = $20\pi + 18\pi = 38\pi(\text{cm}^2)$
- (2) (두 밑면의 넓이의 합) = $\pi \times 3^2 + \pi \times 5^2$
 $= 9\pi + 25\pi = 34\pi(\text{cm}^2)$
 (옆넓이) = $\frac{1}{2} \times 10 \times (2\pi \times 5) - \frac{1}{2} \times 6 \times (2\pi \times 3)$
 $= 50\pi - 18\pi = 32\pi(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) = $34\pi + 32\pi = 66\pi(\text{cm}^2)$

유형 4

P. 94

- 1** (1) 80 cm^3 (2) $70\pi \text{ cm}^3$
- 2** (1) 36 cm^2 , 7 cm , 84 cm^3
 (2) 10 cm^2 , 6 cm , 20 cm^3
 (3) $25\pi \text{ cm}^2$, 12 cm , $100\pi \text{ cm}^3$
 (4) $49\pi \text{ cm}^2$, 9 cm , $147\pi \text{ cm}^3$
- 3** (1) 72 , 9 , 63 (2) 96π , 12π , 84π
- 4** (1) 56 cm^3 (2) $105\pi \text{ cm}^3$

- 1** (1) (부피) = $\frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times 48 \times 5$
 $= 80(\text{cm}^3)$
- (2) (부피) = $\frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times 30\pi \times 7$
 $= 70\pi(\text{cm}^3)$
- 2** (1) (밑넓이) = $6 \times 6 = 36(\text{cm}^2)$
 (높이) = 7 cm
 \therefore (부피) = $\frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times 36 \times 7$
 $= 84(\text{cm}^3)$
- (2) (밑넓이) = $\frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10(\text{cm}^2)$
 (높이) = 6 cm
 \therefore (부피) = $\frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times 10 \times 6$
 $= 20(\text{cm}^3)$
- (3) (밑넓이) = $\pi \times 5^2 = 25\pi(\text{cm}^2)$
 (높이) = 12 cm
 \therefore (부피) = $\frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times 25\pi \times 12$
 $= 100\pi(\text{cm}^3)$
- (4) (밑넓이) = $\pi \times 7^2 = 49\pi(\text{cm}^2)$
 (높이) = 9 cm
 \therefore (부피) = $\frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times 49\pi \times 9$
 $= 147\pi(\text{cm}^3)$

- 3** (1) (큰 사각뿔의 부피) = $\frac{1}{3} \times (6 \times 6) \times 6 = 72(\text{cm}^3)$
 (작은 사각뿔의 부피) = $\frac{1}{3} \times (3 \times 3) \times 3 = 9(\text{cm}^3)$
 \therefore (부피) = (큰 사각뿔의 부피) - (작은 사각뿔의 부피)
 $= \boxed{72} - \boxed{9} = \boxed{63}(\text{cm}^3)$
- (2) (큰 원뿔의 부피) = $\frac{1}{3} \times (\pi \times 6^2) \times 8 = 96\pi(\text{cm}^3)$
 (작은 원뿔의 부피) = $\frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4 = 12\pi(\text{cm}^3)$
 \therefore (부피) = (큰 원뿔의 부피) - (작은 원뿔의 부피)
 $= \boxed{96\pi} - \boxed{12\pi} = \boxed{84\pi}(\text{cm}^3)$

- 4 (1) (부피)=(큰 사각뿔의 부피)-(작은 사각뿔의 부피)

$$= \frac{1}{3} \times (6 \times 4) \times 8 - \frac{1}{3} \times (3 \times 2) \times 4$$

$$= 64 - 8 = 56(\text{cm}^3)$$
 (2) (부피)=(큰 원뿔의 부피)-(작은 원뿔의 부피)

$$= \frac{1}{3} \times (\pi \times 6^2) \times 10 - \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 5$$

$$= 120\pi - 15\pi = 105\pi(\text{cm}^3)$$

- 3 (두 밑면의 넓이의 합) $= 3 \times 3 + 6 \times 6 = 45(\text{cm}^2)$
 (옆넓이) $= \left\{ \frac{1}{2} \times (3+6) \times 4 \right\} \times 4 = 72(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) $= 45 + 72 = 117(\text{cm}^2)$
- 4 (두 밑면의 넓이의 합) $= \pi \times 3^2 + \pi \times 6^2$
 $= 9\pi + 36\pi = 45\pi(\text{cm}^2)$
 (옆넓이) $= \frac{1}{2} \times 12 \times (2\pi \times 6) - \frac{1}{2} \times 6 \times (2\pi \times 3)$
 $= 72\pi - 18\pi = 54\pi(\text{cm}^2)$
 \therefore (겉넓이) $= 45\pi + 54\pi = 99\pi(\text{cm}^2)$

쌍둥이 기출문제

P. 95~96

- 1 ④ 2 $48\pi \text{ cm}^2$ 3 117 cm^2
 4 $99\pi \text{ cm}^2$ 5 (1) 75 cm^3 (2) 93 cm^3
 6 (1) $32\pi \text{ cm}^3$ (2) $416\pi \text{ cm}^3$
 7 (1) 풀이 참조 (2) $12\pi \text{ cm}^3$ 8 $96\pi \text{ cm}^3$
 9 (1) 10 cm^2 (2) 20 cm^3 10 $\frac{32}{3} \text{ cm}^3$
 11 21 cm^3 12 ①

[1~2] 뿔의 겉넓이

- (1) (각뿔의 겉넓이)=(밑넓이)+(옆넓이)
 (2) 원뿔의 겉넓이(S)
 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 모선의 길이를 l 이라고 하면

$$S = \pi r^2 + \pi r l$$

- 1 (겉넓이) $= 3 \times 3 + \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 5 \right) \times 4$
 $= 9 + 30 = 39(\text{cm}^2)$
- 2 (밑넓이) $= \pi \times 4^2 = 16\pi(\text{cm}^2)$... (i)
 (옆넓이) $= \frac{1}{2} \times 8 \times (2\pi \times 4) = 32\pi(\text{cm}^2)$... (ii)
 \therefore (겉넓이) $= 16\pi + 32\pi = 48\pi(\text{cm}^2)$... (iii)

채점 기준	비율
(i) 원뿔의 밑넓이 구하기	40%
(ii) 원뿔의 옆넓이 구하기	40%
(iii) 원뿔의 겉넓이 구하기	20%

[3~4] 뿔대의 겉넓이

- (뿔대의 겉넓이)=(두 밑면의 넓이의 합)+(옆넓이)
참고 (원뿔대의 옆넓이)=(큰 부채꼴의 넓이)-(작은 부채꼴의 넓이)

[5~8] 뿔과 뿔대의 부피

• 뿔의 부피

(1) 각뿔의 부피(V)

밑넓이를 S, 높이를 h 라고 하면 $V = \frac{1}{3}Sh$

(2) 원뿔의 부피(V)

밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라고 하면 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$


• 뿔대의 부피

(뿔대의 부피)=(큰 뿔의 부피)-(작은 뿔의 부피)

- 5 (1) (부피) $= \frac{1}{3} \times (5 \times 5) \times 9 = 75(\text{cm}^3)$
 (2) (큰 사각뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times (7 \times 7) \times 7 = \frac{343}{3}(\text{cm}^3)$
 (작은 사각뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times (4 \times 4) \times 4 = \frac{64}{3}(\text{cm}^3)$
 \therefore (부피) $= \frac{343}{3} - \frac{64}{3} = 93(\text{cm}^3)$

- 6 (1) (부피) $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 4^2) \times 6 = 32\pi(\text{cm}^3)$
 (2) (큰 원뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 12^2) \times 9 = 432\pi(\text{cm}^3)$
 (작은 원뿔의 부피) $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 4^2) \times 3 = 16\pi(\text{cm}^3)$
 \therefore (부피) $= 432\pi - 16\pi = 416\pi(\text{cm}^3)$

- 7 (1) 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겨냥도는 오른쪽 그림과 같다. ... (i)




- (2) (부피) $= \frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 4$
 $= 12\pi(\text{cm}^3)$... (ii)

채점 기준	비율
(i) 회전체의 겨냥도 그리기	40%
(ii) 회전체의 부피 구하기	60%


- 8 주어진 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 오른쪽 그림과 같으므로
(부피) = (원뿔의 부피) + (원기둥의 부피)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \times (\pi \times 4^2) \times 3 \\ &\quad + (\pi \times 4^2) \times 5 \\ &= 16\pi + 80\pi = 96\pi (\text{cm}^3) \end{aligned}$$



[9~10] 직육면체에서 잘라 낸 삼각뿔의 부피
(잘라 낸 삼각뿔 G-BCD의 부피)

$$= \frac{1}{3} \times (\triangle BCD \text{의 넓이}) \times \overline{CG}$$



- 9 (1) $(\triangle BCD \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{CD}$
 $= \frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10 (\text{cm}^2)$

(2) (삼각뿔 G-BCD의 부피)
 $= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times (\triangle BCD \text{의 넓이}) \times \overline{CG}$
 $= \frac{1}{3} \times 10 \times 6 = 20 (\text{cm}^3)$

- 10 (삼각뿔 G-BCD의 부피)
 $= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$
 $= \frac{1}{3} \times (\triangle BCD \text{의 넓이}) \times \overline{CG}$
 $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4\right) \times 4$
 $= \frac{32}{3} (\text{cm}^3)$

[11~12] 그릇에 담긴 물의 부피

직육면체 모양의 그릇에 담긴 물의 부피는 그릇을 기울였을 때 생기는 삼각뿔의 부피와 같다.

- 11 물의 부피는 삼각뿔의 부피와 같으므로
(물의 부피) $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 7\right) \times 3 = 21 (\text{cm}^3)$

- 12 물의 부피는 삼각뿔의 부피와 같으므로
(물의 부피) $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 50 \times 30\right) \times 10 = 2500 (\text{cm}^3)$

3 구의 겹넓이와 부피

유형 5

P. 97

- 1 (1) 10^2 (또는 100), 400π (2) $324\pi \text{ cm}^2$
2 (1) 72π , 36π , 108π (2) $192\pi \text{ cm}^2$
3 (1) $65\pi \text{ cm}^2$ (2) $50\pi \text{ cm}^2$ (3) $115\pi \text{ cm}^2$
4 (1) $12\pi \text{ cm}^2$ (2) $4\pi \text{ cm}^2$ (3) $16\pi \text{ cm}^2$

- 1 (1) (구의 겹넓이) $= 4\pi \times [10^2] = [400\pi] (\text{cm}^2)$
(2) (구의 겹넓이) $= 4\pi \times 9^2 = 324\pi (\text{cm}^2)$

- 2 (1) (반구의 겹넓이) $= \frac{1}{2} \times (\text{구의 겹넓이}) + (\text{원의 넓이})$
 $= \frac{1}{2} \times (4\pi \times 6^2) + \pi \times 6^2$
 $= [72\pi] + [36\pi] = [108\pi] (\text{cm}^2)$
(2) (반구의 겹넓이) $= \frac{1}{2} \times (\text{구의 겹넓이}) + (\text{원의 넓이})$
 $= \frac{1}{2} \times (4\pi \times 8^2) + \pi \times 8^2$
 $= 128\pi + 64\pi = 192\pi (\text{cm}^2)$

- 3 (1) (원뿔의 옆넓이) $= \frac{1}{2} \times 13 \times (2\pi \times 5) = 65\pi (\text{cm}^2)$
(2) (반구 부분의 겹넓이) $= \frac{1}{2} \times (4\pi \times 5^2) = 50\pi (\text{cm}^2)$
(3) (입체도형의 겹넓이) $= 65\pi + 50\pi = 115\pi (\text{cm}^2)$

- 4 (1) (구의 겹넓이의 $\frac{3}{4}$) $= \frac{3}{4} \times (4\pi \times 2^2) = 12\pi (\text{cm}^2)$
(2) (잘린 단면의 넓이의 합) $= \left\{ \frac{1}{2} \times (\pi \times 2^2) \right\} \times 2$
 $= 4\pi (\text{cm}^2)$
(3) (입체도형의 겹넓이) $= 12\pi + 4\pi = 16\pi (\text{cm}^2)$

유형 6

P. 98

- 1 (1) 9^3 (또는 729), 972π (2) $\frac{500}{3}\pi \text{ cm}^3$
2 (1) $\frac{16}{3}\pi$ (2) $\frac{686}{3}\pi \text{ cm}^3$
3 $\frac{63}{2}\pi \text{ cm}^3$
4 (1) $18\pi \text{ cm}^3$ (2) $36\pi \text{ cm}^3$ (3) $54\pi \text{ cm}^3$ (4) 1 : 2 : 3

- 1 (1) (구의 부피) $= \frac{4}{3}\pi \times [9^3] = [972\pi] (\text{cm}^3)$
(2) (구의 부피) $= \frac{4}{3}\pi \times 5^3 = \frac{500}{3}\pi (\text{cm}^3)$

2 (1) (반구의 부피) = $\frac{1}{2} \times (\text{구의 부피})$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 2^3 \right) = \frac{16}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

(2) (반구의 부피) = $\frac{1}{2} \times (\text{구의 부피})$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 7^3 \right) = \frac{686}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

3 (부피) = $\frac{7}{8} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 3^3 \right) = \frac{63}{2} \pi \text{ (cm}^3\text{)}$

4 (1) (원뿔의 부피) = $\frac{1}{3} \times (\pi \times 3^2) \times 6 = 18\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

(2) (구의 부피) = $\frac{4}{3} \pi \times 3^3 = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

(3) (원기둥의 부피) = $(\pi \times 3^2) \times 6 = 54\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

(4) $18\pi : 36\pi : 54\pi = 1 : 2 : 3$

쌍둥이 기출문제 P. 99

1 $144\pi \text{ cm}^2$	2 $300\pi \text{ cm}^2$	3 $132\pi \text{ cm}^2$
4 $68\pi \text{ cm}^2$	5 $216\pi \text{ cm}^3$	6 $\frac{560}{3} \pi \text{ cm}^3$
7 $2 : 3$	8 $16\pi \text{ cm}^3$	

[1~4] 구의 겹넓이
반지름의 길이가 r 인 구의 겹넓이를 S 라고 하면
 $S = 4\pi r^2$

1 구의 반지름의 길이는 $12 \times \frac{1}{2} = 6 \text{ (cm)}$ 이므로
(겹넓이) = $4\pi \times 6^2 = 144\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

2 (겹넓이) = $\frac{1}{2} \times (4\pi \times 10^2) + \pi \times 10^2$
 $= 200\pi + 100\pi = 300\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

3 (겹넓이) = $\frac{1}{2} \times 4\pi \times 6^2 + \frac{1}{2} \times 10 \times (2\pi \times 6)$
 $= 72\pi + 60\pi = 132\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

4 잘라 낸 부분은 구의 $\frac{1}{8}$ 이므로 남아 있는 부분은 구의 $\frac{7}{8}$ 이다.
 \therefore (겹넓이) = $\frac{7}{8} \times (4\pi \times 4^2) + \frac{3}{4} \times (\pi \times 4^2)$
 $= 56\pi + 12\pi = 68\pi \text{ (cm}^2\text{)}$

[5~6] 구의 부피
반지름의 길이가 r 인 구의 부피를 V 라고 하면
 $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

5 잘라 낸 부분은 구의 $\frac{1}{4}$ 이므로 남아 있는 부분은 구의 $\frac{3}{4}$ 이다.
 \therefore (부피) = $\frac{3}{4} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 6^3 \right) = 216\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

6 (입체도형의 부피) = (작은 반구의 부피) + (큰 반구의 부피)
 $= \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 4^3 \right) + \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 6^3 \right)$
 $= \frac{128}{3} \pi + 144\pi$
 $= \frac{560}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}$

[7~8] 원뿔, 구, 원기둥의 부피 사이의 관계
(원뿔의 부피) : (구의 부피) : (원기둥의 부피) = $1 : 2 : 3$

7 (구의 부피) = $\frac{4}{3} \pi \times 6^3 = 288\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
(원기둥의 부피) = $(\pi \times 6^2) \times 12 = 432\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
 \therefore (구의 부피) : (원기둥의 부피) = $288\pi : 432\pi = 2 : 3$

8 원뿔의 밑면인 원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라고 하면
원뿔의 높이는 $2r \text{ cm}$ 이고, 부피는 $\frac{16}{3} \pi \text{ cm}^3$ 이므로
 $\frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 2r = \frac{16}{3} \pi$
 $\frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{16}{3} \pi, r^3 = 8 = 2^3$
 $\therefore r = 2$
따라서 밑면인 원의 반지름의 길이가 2 cm 이므로
(원기둥의 부피) = $(\pi \times 2^2) \times 4$
 $= 16\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

다른 풀이
(원뿔의 부피) : (원기둥의 부피) = $1 : 3$ 이므로
 $\frac{16}{3} \pi : (\text{원기둥의 부피}) = 1 : 3$
 \therefore (원기둥의 부피) = $\frac{16}{3} \pi \times 3 = 16\pi \text{ (cm}^3\text{)}$

단원 마무리 P. 100~101

1 $100\pi \text{ cm}^2$	2 ③	3 $\frac{100}{3} \pi \text{ cm}^3$
4 15 cm	5 $\frac{485}{3} \text{ cm}^3$	6 6 cm
7 ③	8 ⑤	9 ②

$$\begin{aligned}
 1 \quad (\text{겉넓이}) &= (\pi \times 5^2) \times 2 + (2\pi \times 5) \times 5 \\
 &= 50\pi + 50\pi \\
 &= 100\pi (\text{cm}^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \quad (\text{밑넓이}) &= 4 \times 3 - \pi \times 1^2 \\
 &= 12 - \pi (\text{cm}^2) \\
 (\text{옆넓이}) &= (4+3+4+3) \times 5 + (2\pi \times 1) \times 5 \\
 &= 70 + 10\pi (\text{cm}^2) \\
 \therefore (\text{겉넓이}) &= (12 - \pi) \times 2 + 70 + 10\pi \\
 &= 94 + 8\pi (\text{cm}^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad (\text{부피}) &= \left(\pi \times 5^2 \times \frac{60}{360} \right) \times 8 \\
 &= \frac{100}{3} \pi (\text{cm}^3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad &\text{원뿔의 모선의 길이를 } l \text{ cm라고 하면} \\
 \pi \times 6^2 + \frac{1}{2} \times l \times (2\pi \times 6) &= 126\pi \\
 36\pi + 6\pi l &= 126\pi \\
 6\pi l &= 90\pi \quad \therefore l = 15 \\
 &\text{따라서 원뿔의 모선의 길이는 15 cm이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5 \quad (\text{부피}) &= (\text{큰 사각뿔의 부피}) - (\text{작은 사각뿔의 부피}) \\
 &= \frac{1}{3} \times (8 \times 8) \times 8 - \frac{1}{3} \times (3 \times 3) \times 3 \\
 &= \frac{512}{3} - 9 \\
 &= \frac{485}{3} (\text{cm}^3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6 \quad &\text{정육면체의 한 모서리의 길이를 } a \text{ cm라고 하면} \\
 &(\text{삼각뿔 } F-ABC \text{의 부피}) \\
 &= \frac{1}{3} \times (\triangle ABC \text{의 넓이}) \times \overline{BF} \\
 &= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times a \times a \right) \times a \\
 &= \frac{1}{6} a^3 (\text{cm}^3) \quad \dots (i)
 \end{aligned}$$

이때 삼각뿔 $F-ABC$ 의 부피가 36 cm^3 이므로

$$\frac{1}{6} a^3 = 36, \quad a^3 = 216 = 6^3$$

$$\therefore a = 6$$

따라서 정육면체의 한 모서리의 길이는 6 cm 이다. $\dots (ii)$

채점 기준	비율
(i) 삼각뿔 $F-ABC$ 의 부피를 a 를 사용하여 나타내기	50%
(ii) 정육면체의 한 모서리의 길이 구하기	50%

$$\begin{aligned}
 7 \quad (\text{겉넓이}) &= \pi \times 3^2 + \frac{1}{2} \times (4\pi \times 3^2) \\
 &= 9\pi + 18\pi \\
 &= 27\pi (\text{cm}^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8 \quad (\text{부피}) &= (\text{두 반구의 부피}) + (\text{원기둥의 부피}) \\
 &= \left\{ \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{3} \pi \times 3^3 \right) \right\} \times 2 + (\pi \times 3^2) \times 4 \\
 &= 36\pi + 36\pi \\
 &= 72\pi (\text{cm}^3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9 \quad &(\text{그릇에 남아 있는 물의 부피}) \\
 &= (\text{원기둥 모양의 그릇의 부피}) - (\text{구 모양의 공의 부피}) \\
 &= (\pi \times 5^2) \times 10 - \frac{4}{3} \pi \times 5^3 \\
 &= 250\pi - \frac{500}{3} \pi \\
 &= \frac{250}{3} \pi (\text{cm}^3)
 \end{aligned}$$

1 줄기와 잎 그림, 도수분포표

유형 1 P. 104

1 주민들의 나이 (110은 10세)

줄기	잎
1	0 1 3 5 6 7
2	1 3 4 4 9
3	3 5 6 7 7 8 8
4	0 1 2 4
5	2 7

- 2 (1) 십, 일 (2) 3, 4, 5, 24 (3) 3, 4, 4, 9
 3 2 4 20명 5 6명 6 34회

- 4 전체 학생 수는 전체 잎의 개수와 같으므로 $4+6+7+3=20$ (명)
 5 제기차기 기록이 10회 이상 20회 미만인 학생 수는 줄기 1에 해당하는 잎의 개수와 같은 6명이다.
 6 제기차기를 가장 많이 한 학생의 횟수는 35회, 제기차기를 가장 적게 한 학생의 횟수는 1회이므로 그 차는 $35-1=34$ (회)

유형 2 P. 105

1

봉사 활동 시간(시간)	학생 수(명)	
0 ^{이상} ~ 4 ^{미만}	/	1
4 ~ 8	///	8
8 ~ 12	/// // /	11
12 ~ 16	///	5
16 ~ 20	//	2
합계	27	

- 2 (1) 5 (2) 4 (3) 11, 8, 12
 3 6권 4 12권 이상 18권 미만
 5 18명 6 6권 이상 12권 미만
- 2 (1) 계급의 개수는 0^{이상}~4^{미만}, 4~8, 8~12, 12~16, 16~20의 5개이다.
 (2) (계급의 크기)= $4-0=8-4=\dots=20-16=4$ (시간)
 3 (계급의 크기)= $6-0=12-6=\dots=30-24=6$ (권)

- 4 대출한 책의 수가 13권인 학생이 속하는 계급은 12권 이상 18권 미만이다.
 5 대출한 책의 수가 18권 이상 24권 미만인 학생이 10명, 24권 이상 30권 미만인 학생이 8명이므로 대출한 책의 수가 18권 이상인 학생은 $10+8=18$ (명)
 6 대출한 책의 수가 적은 계급부터 학생 수를 차례로 나열하면 0권 이상 6권 미만: 4명
 6권 이상 12권 미만: 2명
 따라서 대출한 책의 수가 적은 쪽에서 6번째인 학생이 속하는 계급은 6권 이상 12권 미만이다.

쌍둥이 기출문제 P. 106~107

- 1 (1) 70점대 (2) 89점 (3) 10명
 2 ④ 3 ④ 4 ②, ④
 5 (1) 5개 (2) 0.5 kg (3) 2명
 (4) 3.0 kg 이상 3.5 kg 미만 (5) 20 %
 6 ③, ⑤ 7 (1) 7명 (2) 8명
 8 $A=9, B=8$

[1~2] 줄기와 잎 그림 (단위: 회) (110은 10회)

26 10 13 22	⇒	줄기	잎
21 22 17 30		1	0 3 7 9
28 35 19 36		2	1 2 2 6 8
		3	0 5 6

변량

- 1 (1) 잎이 가장 많은 줄기는 7이므로 학생 수가 가장 많은 점수대는 70점대이다.
 (2) 수학 성적이 높은 학생의 성적부터 차례로 나열하면 98점, 97점, 95점, 89점, ...이므로 수학 성적이 높은 쪽에서 4번째인 학생의 수학 성적은 89점이다.
 (3) 수학 성적이 77점 이상 84점 이하인 학생 수는 77점, 78점, 78점, 79점, 79점, 81점, 82점, 83점, 84점, 84점의 10명이다.

- 2 ① 앞이 가장 많은 줄기는 앞의 개수가 7개인 줄기 3이다.
 ② 전체 학생 수는 전체 앞의 개수와 같으므로
 $4+5+7+4=20$ (명)
 ③ 인터넷 사용 시간이 가장 긴 학생의 인터넷 사용 시간은 줄기가 4이고 앞이 8이므로 48분이다.
 ④ 인터넷 사용 시간이 34분 이상인 학생은 34분, 35분, 36분, 37분, 40분, 41분, 45분, 48분의 8명이므로 전체의 $\frac{8}{20} \times 100 = 40$ (%)이다.
 ⑤ 인터넷 사용 시간이 많은 학생의 인터넷 사용 시간부터 차례로 나열하면 48분, 45분, 41분, ...이므로 인터넷 사용 시간이 많은 쪽에서 3번째인 학생의 인터넷 사용 시간은 41분이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

[3~8] 도수분포표

	횟수(회)	학생 수(명)	
계급	10 ^{이상} ~20 ^{미만}	3	도수
	20 ~ 30	5	
	30 ~ 40	2	
	합계	10	

- (1) 계급의 개수: 10^{이상}~20^{미만}, 20~30, 30~40의 3개
 (2) 계급의 크기: $20-10=30-20=40-30=10$ (회)
 (3) (어떤 계급이 차지하는 비율) = $\frac{\text{그 계급의 도수}}{\text{도수의 총합}} \times 100$ (%)

- 4 ② 변량을 나눈 구간의 너비를 계급의 크기라고 한다.
 ④ 도수분포표에서 각 변량의 정확한 값을 알 수 없다.
- 5 (1) 계급의 개수는 2.0^{이상}~2.5^{미만}, 2.5~3.0, 3.0~3.5, 3.5~4.0, 4.0~4.5의 5개이다.
 (2) (계급의 크기) = $2.5-2.0=3.0-2.5=\dots=4.5-4.0=0.5$ (kg)
 (3) 몸무게가 2.5 kg 이상 3.0 kg 미만인 신생아 수는 $15-(1+5+4+3)=2$ (명)
 (4) 몸무게가 3.5 kg 이상인 신생아 수는 $4+3=7$ (명), 3.0 kg 이상인 신생아 수는 $5+7=12$ (명)이므로 몸무게가 무거운 쪽에서 8번째인 신생아가 속하는 계급은 3.0 kg 이상 3.5 kg 미만이다.
 (5) 몸무게가 3.0 kg 미만인 신생아는 $1+2=3$ (명)이므로 전체의 $\frac{3}{15} \times 100 = 20$ (%)이다.
- 6 ① (계급의 크기) = $20-10=30-20=\dots=70-60=10$ (개)
 ② $x=30-(2+3+9+6+3)=7$
 ③ 도수가 가장 큰 계급은 도수가 9회인 40개 이상 50개 미만이다.
 ④ 던진 공의 개수가 40개 미만인 경기 수는 $2+3+7=12$ (회)

- ⑤ 던진 공의 개수가 50개 이상인 경기는 $6+3=9$ (회)이므로 전체의 $\frac{9}{30} \times 100 = 30$ (%)이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ③, ⑤이다.

- 7 (1) 기록이 24m 이상 28m 미만인 학생이 전체의 20%이므로 그 수는 $35 \times \frac{20}{100} = 7$ (명)
 (2) 기록이 32m 이상 36m 미만인 학생 수는 $35-(2+7+14+4)=8$ (명)


- 8 대기 시간이 15분 이상인 방문객이 전체의 40%이므로 그 수는 $30 \times \frac{40}{100} = 12$ (명)
 $\therefore B=12-4=8 \dots (i)$
 $\therefore A=30-(3+6+8+4)=9 \dots (ii)$

채점 기준	비율
(i) B의 값 구하기	60%
(ii) A의 값 구하기	40%

2 히스토그램과 도수분포다각형

유형 3

P. 108




- 1 2 30분, 6개 3 150분 이상 180분 미만
 4 30명 5 10% 6 900

- 2 계급의 크기는 직사각형의 가로 길이를 같으므로 $30-0=60-30=\dots=180-150=30$ (분)이고, 계급의 개수는 직사각형의 개수와 같으므로 0^{이상}~30^{미만}, 30~60, 60~90, 90~120, 120~150, 150~180의 6개이다.

- 3 도수가 가장 작은 계급은 도수가 1명인 150분 이상 180분 미만이다.
- 4 반 전체 학생 수는
 $3+5+9+10+2+1=30$ (명)
- 5 컴퓨터 사용 시간이 120분 이상 180분 미만인 학생은
 $2+1=3$ (명)이므로
 전체의 $\frac{3}{30} \times 100=10$ (%)이다.
- 6 (모든 직사각형의 넓이의 합)
 $=$ (계급의 크기) \times (도수의 총합)
 $=30 \times 30=900$

유형 4 P. 109



- 1 (일)
 2 4만 원, 6개 3 16만 원 이상 20만 원 미만
 4 40명 5 30% 6 160

- 2 계급의 크기는 $8-4=12-8=\dots=28-24=4$ (만 원)이고, 계급의 개수는 $4^{\text{이상}} \sim 8^{\text{미만}}$, $8 \sim 12$, $12 \sim 16$, $16 \sim 20$, $20 \sim 24$, $24 \sim 28$ 의 6개이다.
- 3 도수가 가장 큰 계급은 도수가 11명인 16만 원 이상 20만 원 미만이다.
- 4 반 전체 학생 수는
 $3+4+10+11+7+5=40$ (명)
- 5 저축한 금액이 20만 원 이상 28만 원 미만인 학생은
 $7+5=12$ (명)이므로
 전체의 $\frac{12}{40} \times 100=30$ (%)이다.
- 6 (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이)
 $=$ (계급의 크기) \times (도수의 총합)
 $=(8-4) \times 40$
 $=4 \times 40=160$

한 번 더 연습 P. 110

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 8명 | 2 25명 | 3 40분 이상 50분 미만 |
| 4 36% | 5 ㄱ, ㄴ, ㄷ | 6 40명 |
| 7 70점 이상 80점 미만 | 8 45% | 9 400 |
| 10 ㄱ, ㄷ | | |

- 1 관람 시간이 35분인 관람객이 속하는 계급은 30분 이상 40분 미만이므로 이 계급의 도수는 8명이다.
- 2 전체 관람객 수는
 $3+6+8+7+1=25$ (명)
- 3 관람 시간이 50분 이상인 관람객은 1명, 40분 이상인 관람객은 $7+1=8$ (명)이므로 관람 시간이 많은 쪽에서 5번째인 관람객이 속하는 계급은 40분 이상 50분 미만이다.
- 4 관람 시간이 30분 미만인 관람객은 $3+6=9$ (명)이므로 전체의 $\frac{9}{25} \times 100=36$ (%)이다.
- 5 다. 히스토그램에서 각 계급에 속하는 변량의 정확한 값을 알 수 없으므로 우유를 가장 많이 마시는 학생이 마신 우유의 양은 알 수 없다.
- 6 반 전체 학생 수는
 $2+6+14+11+7=40$ (명)
- 7 영어 성적이 60점 미만인 학생은 2명, 70점 미만인 학생은 $2+6=8$ (명), 80점 미만인 학생은 $8+14=22$ (명)이므로 영어 성적이 낮은 쪽에서 9번째인 학생이 속하는 계급은 70점 이상 80점 미만이다.
- 8 영어 성적이 80점 이상인 학생은 $11+7=18$ (명)이므로 전체의 $\frac{18}{40} \times 100=45$ (%)이다.
- 9 (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이)
 $=$ (계급의 크기) \times (도수의 총합)
 $=(60-50) \times 40$
 $=10 \times 40$
 $=400$
- 10 ㄱ. 방문 횟수가 24회 이상인 학생 수는 $3+2=5$ (명)이다.
 ㄴ, ㄷ. 전체 학생 수는 $2+5+7+11+5+3+2=35$ (명)이고, 방문 횟수가 12회 미만인 학생은 $2+5=7$ (명)이므로 전체의 $\frac{7}{35} \times 100=20$ (%)이다.
 다. 방문 횟수가 13회인 학생이 속하는 계급은 12회 이상 16회 미만이므로 이 계급의 도수는 7명이다.
 따라서 옳지 않은 것은 ㄱ, ㄷ이다.


쌍둥이 기출문제

P. 111~112

- 1 (1) 32명 (2) 64 2 120
 3 (1) 9명 (2) 40% 4 25%
 5 (1) 20명 (2) 75회 이상 80회 미만 (3) 30%
 6 ④ 7 (1) 10명 (2) 15명
 8 12명

[1~4] 히스토그램


횟수(회)	학생 수(명)
10이상~20미만	3
20 ~ 30	5
30 ~ 40	2
합계	10



- 1 (1) $2+6+11+8+5=32$ (명)
 (2) (모든 직사각형의 넓이의 합)
 $=$ (계급의 크기) \times (도수의 총합)
 $=$ (4-2) \times 32
 $=$ 2 \times 32=64
- 2 도수가 가장 큰 계급은 도수가 12명인 70점 이상 80점 미만 이므로
 (구하는 직사각형의 넓이)
 $=$ (계급의 크기) \times (도수)
 $=$ (80-70) \times 12
 $=$ 10 \times 12=120
- 3 (1) $35-(3+8+10+5)=9$ (명)
 (2) 키가 160cm 이상 170cm 미만인 학생이 9명,
 170cm 이상 180cm 미만인 학생이 5명이다.
 따라서 키가 160cm 이상인 학생은 9+5=14(명)이므로
 전체의 $\frac{14}{35}\times 100=40$ (%)이다.
- 4 운동 시간이 7시간 이상 8시간 미만인 학생 수는
 $40-(5+3+7+9+6)=10$ (명) ... (i)
 따라서 운동 시간이 7시간 이상 8시간 미만인 학생은 전체의
 $\frac{10}{40}\times 100=25$ (%)이다. ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 운동 시간이 7시간 이상 8시간 미만인 학생 수 구하기	50%
(ii) 운동 시간이 7시간 이상 8시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하기	50%

[5~8] 히스토그램 \Rightarrow 도수분포다각형



- (1) 히스토그램의 각 직사각형의 윗변의 중앙에 점을 찍어 차례로 선분으로 연결 \Rightarrow 도수분포다각형
 (2) 히스토그램과 도수분포다각형에서는 같은 정보를 얻을 수 있다.

- 5 (1) $2+4+8+3+3=20$ (명)
 (2) 도수가 가장 큰 계급의 도수는 8명이고, 도수가 두 번째로 큰 계급의 도수는 4명이므로 구하는 계급은 75회 이상 80회 미만이다.
 (3) 1분당 맥박 수가 85회 이상인 학생은 3+3=6(명)이므로 전체의 $\frac{6}{20}\times 100=30$ (%)이다.
- 6 ① 계급의 개수는 20이상~30미만, 30~40, 40~50, 50~60, 60~70, 70~80의 6개이다.
 ② 전체 학생 수는
 $3+7+9+12+10+4=45$ (명)
 ③ 도수가 가장 큰 계급은 도수가 12명인 50분 이상 60분 미만이다.
 ④ (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이)
 $=$ (계급의 크기) \times (도수의 총합)
 $=$ (30-20) \times 45
 $=$ 10 \times 45
 $=$ 450
 ⑤ TV 시청 시간이 60분 이상인 학생 수는
 $10+4=14$ (명)
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.
- 7 (1) 여행을 다녀온 횟수가 8회 이상 10회 미만인 학생 수는
 $40\times\frac{25}{100}=10$ (명)
 (2) 여행을 다녀온 횟수가 6회 이상 8회 미만인 학생 수는
 $40-(3+6+10+4+2)=15$ (명)
- 8 미술 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수는
 $45\times\frac{20}{100}=9$ (명) ... (i)
 따라서 미술 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수는
 $45-(2+7+9+9+5+1)=12$ (명) ... (ii)

채점 기준	비율
(i) 미술 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수 구하기	50%
(ii) 미술 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수 구하기	50%

걸리는 시간(분)	A 중학교		B 중학교	
	학생 수(명)	상대도수	학생 수(명)	상대도수
10 ^{이상} ~20 ^{미만}	40	0,08	8	0,02
20 ~ 30	90	$\frac{90}{500}=0.18$	20	$\frac{20}{400}=0.05$
30 ~ 40	150	$\frac{150}{500}=0.3$	120	$\frac{120}{400}=0.3$
40 ~ 50	130	$\frac{130}{500}=0.26$	128	$\frac{128}{400}=0.32$
50 ~ 60	80	$\frac{80}{500}=0.16$	100	$\frac{100}{400}=0.25$
60 ~ 70	10	$\frac{10}{500}=0.02$	24	$\frac{24}{400}=0.06$
합계	500	1	400	1

- 3 등교하는 데 걸리는 시간이 40분 이상 50분 미만인 계급의 상대도수는
A 중학교: 0.26, B 중학교: 0.32
따라서 등교하는 데 걸리는 시간이 40분 이상 50분 미만인 학생의 비율은 B 중학교가 더 높다.
- 4 공부 시간이 7시간 미만인 계급들의 상대도수는 모두 A 모둠이 B 모둠보다 더 크므로 그 계급에 속하는 학생의 비율은 A 모둠이 B 모둠보다 더 높다.
- 6 B 모둠에 대한 그래프가 A 모둠에 대한 그래프보다 전체적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 공부 시간은 B 모둠이 A 모둠보다 대체적으로 더 많다고 할 수 있다.

- 1 (1) $2+5+9+12+8+4=40$ (명)
(2) 체육 실기 점수가 30점 이상 35점 미만인 계급의 도수는 8명이므로 이 계급의 상대도수는
 $\frac{8}{40}=0.2$
- 2 (1) $2+2+5+6+3+2=20$ (명)
(2) 버스를 기다린 시간이 14분인 승객이 속하는 계급은 12분 이상 15분 미만이고, 이 계급의 도수는 6명이다. 따라서 버스를 기다린 시간이 14분인 승객이 속하는 계급의 상대도수는
 $\frac{6}{20}=0.3$

[3~4] 상대도수의 분포표

상대도수의 분포표: 각 계급의 상대도수를 나타낸 표

계급	도수	상대도수
☆	☆	$\frac{\star}{S}$
△	△	$\frac{\triangle}{S}$
□	□	$\frac{\square}{S}$
합계	S	1

$(\text{도수의 총합}) \times (\text{상대도수})$ → ☆, △, □
 $(\text{도수}) / (\text{도수의 총합})$ → $\frac{\star}{S}, \frac{\triangle}{S}, \frac{\square}{S}$
 $\star + \triangle + \square = S$
 $\frac{\star}{S} + \frac{\triangle}{S} + \frac{\square}{S} = \frac{\star + \triangle + \square}{S} = \frac{S}{S} = 1$

- 3 (1) $A = \frac{4}{40} = 0.1$
 $B = 40 \times 0.3 = 12$
상대도수의 총합은 항상 1이므로
 $C = 1$
(2) 기록이 19초 이상 20초 미만인 계급의 도수는 2명이므로 이 계급의 상대도수는
 $\frac{2}{40} = 0.05$
기록이 18초 이상인 계급의 상대도수의 합은
 $0.15 + 0.05 = 0.2$ 이므로
전체의 $0.2 \times 100 = 20$ (%)이다.
- 4 (1) 윗몸일으키기 기록이 10회 이상 20회 미만인 계급의 도수는 12명이고, 이 계급의 상대도수는 0.24이므로
(전체 학생 수) = $\frac{12}{0.24} = 50$ (명)
(2) $A = \frac{5}{50} = 0.1$
 $B = 50 \times 0.3 = 15$
 $C = 1 - (0.1 + 0.24 + 0.3 + 0.16) = 0.2$
(3) 윗몸일으키기 기록이 30회 미만인 계급의 상대도수의 합은
 $0.1 + 0.24 + 0.3 = 0.64$ 이므로
전체의 $0.64 \times 100 = 64$ (%)이다.

쌍둥이 기출문제

P. 116~118

- 1 (1) 40명 (2) 0.2 2 (1) 20명 (2) 0.3
3 (1) $A=0.1, B=12, C=1$ (2) 20%
4 (1) 50명 (2) $A=0.1, B=15, C=0.2$ (3) 64%
5 (1) 7명 (2) 0.16 6 (1) 18그루 (2) 0.25
7 (1) 40명 (2) 14명 8 6명
9 (1) 1학년 (2) 2개 10 (1) A 중학교 (2) 3개
11 (1) 5명 (2) B반 12 르, 모

[1~2] 상대도수

- (1) (어떤 계급의 상대도수) = $\frac{(\text{그 계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$
(2) 상대도수의 총합은 항상 1이고, 상대도수는 0 이상이고 1 이하의 수이다.
(3) 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.

[5~8] 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

가로축에는 각 계급의 양 끝 값을, 세로축에는 상대도수를 차례로 표시하여 히스토그램이나 도수분포다각형과 같은 모양으로 나타낸 그래프

- 5** (1) 상대도수가 가장 큰 계급은 160 cm 이상 180 cm 미만
이므로 이 계급의 도수는
 $25 \times 0.28 = 7$ (명)
- (2) 기록이 240 cm 이상 260 cm 미만인 학생 수는
 $25 \times 0.04 = 1$ (명)
기록이 220 cm 이상 240 cm 미만인 학생 수는
 $25 \times 0.16 = 4$ (명)
따라서 기록이 좋은 쪽에서 5번째인 학생이 속하는 계급은 220 cm 이상 240 cm 미만이므로 이 계급의 상대도수는 0.16이다.

- 6** (1) 상대도수가 가장 큰 계급은 15년 이상 20년 미만이므로 이 계급의 도수는
 $60 \times 0.3 = 18$ (그루)
- (2) 나이가 30년 이상 35년 미만인 나무의 수는
 $60 \times 0.05 = 3$ (그루)
나이가 25년 이상 30년 미만인 나무의 수는
 $60 \times 0.2 = 12$ (그루)
나이가 20년 이상 25년 미만인 나무의 수는
 $60 \times 0.25 = 15$ (그루)
따라서 나이가 많은 쪽에서 16번째인 나무가 속하는 계급은 20년 이상 25년 미만이므로 이 계급의 상대도수는 0.25이다.

- 7** (1) 과학 성적이 70점 이상 80점 미만인 계급의 도수는 10명이고, 이 계급의 상대도수는 0.25이므로
(전체 학생 수) = $\frac{10}{0.25} = 40$ (명)
- (2) 과학 성적이 80점 이상 90점 미만인 계급의 상대도수는
 $1 - (0.05 + 0.2 + 0.25 + 0.15) = 0.35$
따라서 과학 성적이 80점 이상 90점 미만인 학생 수는
 $40 \times 0.35 = 14$ (명)

- 8** 독서 시간이 8시간 이상 10시간 미만인 계급의 도수는 4명이고, 이 계급의 상대도수는 0.2이므로
(전체 학생 수) = $\frac{4}{0.2} = 20$ (명) ... (i)
- 독서 시간이 6시간 이상 8시간 미만인 계급의 상대도수는
 $1 - (0.05 + 0.25 + 0.2 + 0.2) = 0.3$... (ii)
- 따라서 독서 시간이 6시간 이상 8시간 미만인 학생 수는
 $20 \times 0.3 = 6$ (명) ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 전체 학생 수 구하기	30 %
(ii) 독서 시간이 6시간 이상 8시간 미만인 계급의 상대도수 구하기	30 %
(iii) 독서 시간이 6시간 이상 8시간 미만인 학생 수 구하기	40 %

[9~12] 도수의 총합이 다른 두 집단의 분포 비교

- (1) 어떤 계급에 속하는 학생의 비율을 비교할 때는 상대도수를 비교한다.
- (2) 두 집단 중 변량이 대체적으로 큰(작은) 것을 찾을 때는 그래프가 전체적으로 어느 쪽으로 치우쳐 있는지를 확인한다.

9 각 계급의 상대도수를 구하면 다음 표와 같다.

책의 수(권)	상대도수	
	1학년	2학년
2 ^{이상} ~ 4 ^{미만}	$\frac{4}{40} = 0.1$	$\frac{6}{50} = 0.12$
4 ~ 6	$\frac{10}{40} = 0.25$	$\frac{8}{50} = 0.16$
6 ~ 8	$\frac{14}{40} = 0.35$	$\frac{17}{50} = 0.34$
8 ~ 10	$\frac{8}{40} = 0.2$	$\frac{10}{50} = 0.2$
10 ~ 12	$\frac{4}{40} = 0.1$	$\frac{9}{50} = 0.18$
합계	1	1

- (1) 두 학년에서 읽은 책의 수가 6권 이상 8권 미만인 계급의 상대도수는 각각 다음과 같다.
1학년: 0.35, 2학년: 0.34
따라서 이 계급의 상대도수는 1학년이 2학년보다 더 크므로 읽은 책의 수가 6권 이상 8권 미만인 회원의 비율은 1학년이 2학년보다 더 높다.
- (2) 읽은 책의 수에 대한 회원의 비율이 1학년보다 2학년이 더 높은 계급은 2권 이상 4권 미만, 10권 이상 12권 미만의 2개이다.

10 각 계급의 상대도수를 구하면 다음 표와 같다.

최고 기록(kg)	상대도수	
	A 중학교	B 중학교
100 ^{이상} ~ 120 ^{미만}	$\frac{2}{25} = 0.08$	$\frac{3}{20} = 0.15$
120 ~ 140	$\frac{11}{25} = 0.44$	$\frac{9}{20} = 0.45$
140 ~ 160	$\frac{5}{25} = 0.2$	$\frac{5}{20} = 0.25$
160 ~ 180	$\frac{4}{25} = 0.16$	$\frac{2}{20} = 0.1$
180 ~ 200	$\frac{3}{25} = 0.12$	$\frac{1}{20} = 0.05$
합계	1	1

- (1) 두 중학교에서 기록이 160 kg 이상 180 kg 미만인 계급의 상대도수는 각각 다음과 같다.
A 중학교: 0.16, B 중학교: 0.1
따라서 이 계급의 상대도수는 A 중학교가 B 중학교보다 더 크므로 기록이 160 kg 이상 180 kg 미만인 학생의 비율은 A 중학교가 B 중학교보다 더 높다.
- (2) 기록에 대한 학생의 비율이 A 중학교보다 B 중학교가 더 높은 계급은
100 kg 이상 120 kg 미만, 120 kg 이상 140 kg 미만, 140 kg 이상 160 kg 미만의 3개이다.

- 11 (1) A반에서 봉사 활동 시간이 16시간 이상인 계급의 상대도수는 0.2이므로
A반에서 봉사 활동 시간이 16시간 이상인 학생 수는 $25 \times 0.2 = 5$ (명)
- (2) B반에 대한 그래프가 A반에 대한 그래프보다 전체적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 봉사 활동 시간은 B반이 A반보다 더 길다고 할 수 있다.

- 12 가. 기록이 17초인 학생이 속하는 계급은 16초 이상 18초 미만이고, 여학생의 이 계급의 상대도수는 0.3이다.
따라서 기록이 17초인 학생이 속하는 계급의 여학생 수는 $50 \times 0.3 = 15$ (명)이다.
- 나. 남학생 중 기록이 16초 미만인 계급의 상대도수의 합은 $0.12 + 0.2 = 0.32$ 이므로 전체의 $0.32 \times 100 = 32$ (%)이다.
- 다. 상대도수의 분포를 나타낸 그래프만으로는 도수의 총합을 알 수 없으므로 전체 남학생 수와 전체 여학생 수는 알 수 없다.
- 라. 두 그래프에서 기록이 14초 이상 16초 미만인 계급의 상대도수는 각각 다음과 같다.
남학생: 0.2, 여학생: 0.1
따라서 이 계급의 상대도수는 남학생이 여학생보다 더 크므로 기록이 14초 이상 16초 미만인 학생의 비율은 남학생이 여학생보다 더 높다.
- 마. 계급의 크기가 같고, 상대도수의 총합이 같으므로 남학생과 여학생에 대한 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 같다.
따라서 옳은 것은 라, 마이다.

- ③ 나이가 가장 적은 회원은 17세이고,
가장 많은 회원은 42세이므로 두 회원의 나이의 차는 $42 - 17 = 25$ (세)
- ④ 나이가 적은 쪽에서부터 차례로 나열하면 17세, 18세, 19세, 20세, ...
이므로 나이가 적은 쪽에서 4번째인 회원의 나이는 20세이다.
- ⑤ 나이가 26세 미만인 회원은 8명이므로 전체의 $\frac{8}{20} \times 100 = 40$ (%)이다.
따라서 옳은 것은 ③이다.

- 2 대기 시간이 30분 미만인 관객이 전체의 75%이므로 $\frac{4+9+A}{40} \times 100 = 75$
 $4+9+A=30$
 $\therefore A=17$
 $\therefore B=40-(4+9+17+6)=4$

- 3 영화 관람 횟수가 9회 미만인 학생은 $5+7=12$ (명) ... (i)
이때 영화 관람 횟수가 9회 미만인 학생이 전체의 40%이므로
(전체 학생 수) $\times \frac{40}{100} = 12$
 \therefore (전체 학생 수) = 30(명) ... (ii)
따라서 영화 관람 횟수가 9회 이상 12회 미만인 학생 수는 $30 - (5+7+4+3+2) = 9$ (명) ... (iii)

채점 기준	비율
(i) 영화 관람 횟수가 9회 미만인 학생 수 구하기	20%
(ii) 전체 학생 수 구하기	50%
(iii) 영화 관람 횟수가 9회 이상 12회 미만인 학생 수 구하기	30%

- 4 ① 계급의 개수는 220^{이상} ~ 230^{미만}, 230 ~ 240, 240 ~ 250, 250 ~ 260, 260 ~ 270, 270 ~ 280의 6개이다.
- ② (계급의 크기) = $230 - 220 = 240 - 230 = \dots = 280 - 270 = 10$ (mm)
- ③ 도수가 10명인 계급은 260 mm 이상 270 mm 미만이다.
- ④ 신발 크기가 240 mm 이상 250 mm 미만인 학생은 15명이므로 전체의 $\frac{15}{50} \times 100 = 30$ (%)이다.
- ⑤ 신발 크기가 230 mm 미만인 학생은 2명, 240 mm 미만인 학생은 $2+5=7$ (명), 250 mm 미만인 학생은 $7+15=22$ (명)
이므로 신발 크기가 작은 쪽에서 9번째인 학생이 속하는 계급은 240 mm 이상 250 mm 미만이다.
따라서 옳은 것은 ②, ④이다.

단원 마무리

P. 119~120

- 1 ③ 2 $A=17, B=4$ 3 9명 4 ②, ④
5 (1) 64% (2) 4명 6 0.2 7 ④

- 1 ① 줄기가 3인 잎의 개수는 6개, 줄기가 4인 잎의 개수는 4개이므로 나이가 30세 이상인 회원 수는 10명이다.
② 잎이 가장 많은 줄기는 2이므로 회원 수가 가장 많은 줄기는 2이다.

- 5 (1) 통학 거리가 2 km 미만인 계급의 상대도수의 합은
 $0.36 + 0.28 = 0.64$ 이므로
 전체의 $0.64 \times 100 = 64(\%)$ 이다.
 (2) 통학 거리가 4 km 이상 5 km 미만인 계급의 상대도수는
 $1 - (0.36 + 0.28 + 0.23 + 0.11) = 0.02$
 따라서 통학 거리가 4 km 이상 5 km 미만인 학생 수는
 $200 \times 0.02 = 4(\text{명})$

- 6 무게가 150 g 이상 170 g 미만인 감자는
 $50 \times 0.16 = 8(\text{개})$
 무게가 130 g 이상 150 g 미만인 감자는
 $50 \times 0.2 = 10(\text{개})$
 따라서 무게가 무거운 쪽에서 10번째인 감자가 속하는 계급
 은 130 g 이상 150 g 미만이므로 이 계급의 상대도수는 0.2
 이다.

- 7 ① 전체 여학생 수는 알 수 없다.
 ② 기록이 160 cm 이상 180 cm 미만인 계급의 상대도수는
 남학생: 0.08, 여학생: 0.06
 즉, 이 계급의 학생의 비율은 남학생이 여학생보다 더 높
 다.
 ③ 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례하므로
 여학생 중에서 도수가 가장 큰 계급은 상대도수가 가장
 큰 계급인 80 cm 이상 100 cm 미만이다.
 ④ 남학생에 대한 그래프가 여학생에 대한 그래프보다 전체
 적으로 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 남학생이 여학생보
 다 기록이 더 좋은 편이다.
 ⑤ 계급의 크기가 같고, 상대도수의 총합이 같으므로 여학
 생과 남학생에 대한 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸
 인 부분의 넓이는 서로 같다.
 따라서 옳은 것은 ④이다.



memo

memo

memo